



Resultados SISVEA 2018 Jalisco



CECAJ
Consejo Estatal
Centro las Adicciones
en Jalisco



Salud



Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018

CONTENIDO

| | |
|---|------------|
| PRESENTACIÓN | 10 |
| JUSTIFICACIÓN | 12 |
| INDICADOR: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN | 29 |
| SEXO MASCULINO Y POR REGIÓN SANITARIA | 96 |
| SEXO FEMENINO Y POR REGIÓN SANITARIA | 156 |
| INDICADOR: PUESTO CENTINELA DE URGENCIAS | 217 |
| INDICADOR SERVICIO MÉDICO FORENSE | 249 |
| CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS ADICTIVAS..... | 322 |
| GLOSARIO DE TÉRMINOS | 338 |
| DIRECTORIO | 360 |



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Mensaje del Secretario Técnico:

Con el objetivo de conocer y monitorear de cerca el uso y abuso de drogas, en Jalisco continuamos aplicando el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, que como herramienta epidemiológica nos brinda información sobre los indicadores que tienen que ver de manera directa con su consumo.

Con el indicador del SISVEA, Tratamiento y Rehabilitación, conocemos el perfil sociodemográfico del paciente, patrón del consumo de drogas, droga de inicio, droga de mayor impacto y la de mayor consumo, detectamos los cambios en las vías de administración, nombres coloquiales y patrón de consumo, así como situaciones de riesgo, en cuanto al uso de drogas intravenosas.

En cuanto a menores de edad con problemas legales en este indicador asocia el uso y abuso de drogas en menores que comenten la infracción bajo el efecto de drogas, así como el antecedente de ser usuarios habituales de drogas.

En el indicador Puesto Centinela de Urgencias, nos informa la prevalencia de ingresos a servicios de urgencias médicas bajo el efecto de drogas o a consecuencia del uso de éstas, tanto para aquellos pacientes que llegan por lesión de causa externa o bien por alguna patología

En el indicador Forense, nos marca la prevalencia de personas mayores de 5 años que pierden la vida bajo el efecto de drogas, así como la causa de ésta.

Sin duda el consumo de sustancias afecta de manera negativa cualquier área del ser humano, tanto en su salud física, familiar y social. Las ventajas de este sistema es que ofrece información de manera continua nos permite contar con información por Región Sanitaria y un panorama de lo que sucede en Jalisco, lo que favorece el desarrollo de actividades en prevención, capacitación, tratamiento, rehabilitación y la reinserción social del usuario. Programas acordes a las necesidades y prioridades detectadas a través de este sistema.

Por lo anterior, exhorto a todos los establecimientos que atienden a pacientes con problemas uso y abuso de drogas, continúen participando de manera activa con el registro de cada uno de los casos que se atiendan en nuestro Estado.

Así mismo pongo a sus órdenes esta información para que la utilicen en el desarrollo de proyectos y programas que se expresen en acciones que beneficien a la población en Jalisco.

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Edición junio 2019.

Coordinación Editorial.

Dr. Luis Javier Robles Arellano.

Edición.

Dra. Gloria Gómez Sandoval.

L.T.S. María Patricia Carlín Sánchez.

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández.

Producción Software Interactivo.

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández.

D.R. Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

Lago Tequesquitengo 2600, Colonia Lagos del Country. Zapopan Jalisco México.

01 800 536 94 44, 01 33 38 23 20 20

Hecho en México.

Citación sugerida: Contreras Ramírez I, Robles-Arellano LJ, Gómez-Sandoval G, Carlín-Sánchez MP, Maury-Hernández HE. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco, Resultados 2018. Secretaría de Salud Jalisco.



Colaboradores del SISVEA por Región Sanitaria.

Región Sanitaria I Colotlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Colotlán.

Lic. Ana Hilda Luna López

Lic. TS. Maribel Vargas Franco.

Región Sanitaria II Lagos de Moreno.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Lagos de Moreno.

Lic. Norma Angélica Nava Neri.

Lic. Rocelia Huerta Martín

María Eugenia de la Cruz Vázquez.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de San Juan de los Lagos.

Mtra. Margarita González de la Torre.

Lic. TS. Guadalupe Liliana Murillo Mares.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Región Sanitaria III Tepatitlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tepatitlán de Morelos.

Lic. Víctor Daniel Sánchez Esqueda

Eduardo Javier Hernández Orozco.

Lic. María del Refugio Villaseñor Tavera

Lic. Yolanda Baltazar Cruz.

Lic. Norma Lilia Delgadillo Perales.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Arandas

Ing. Felipe de Jesús Hernández Orozco.

Región Sanitaria IV La Barca

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Ocotlán.

Lic. TS. Verónica Gallardo López.

Región Sanitaria V Tamazula.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tamazula de Gordiano.

Lic. Psic. Gilberto de Jesús García Medina.

Lic. TS. Marcela de Jesús Ávalos Hernández.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Región Sanitaria VI Zapotlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Zapotlán el Grande

Lic. Psicología. José Antonio Álvarez Moreno.

Lic. Erika Alejandra González Sastre.

Rocío Yolanda Aguilar Peralta.

Lic. Silvia Lorena Rodríguez Sandoval

Lic. Judith Marlene Romero Bocanegra.

Región Sanitaria VII Autlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Autlán de Navarro.

Mtro. Jorge Jiménez Aguilar

Lic. T.S. Griselda Bartolo Ramos.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de La Huerta.

Lic. Refugio Covarrubias Romero

Lic. José Octavio Guerrero Tejeda.



Región Sanitaria VIII Puerto Vallarta.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Puerto Vallarta.

Mtra. Lorena Tirado Fuentes.

Lic. TS. Xochiquetzal Pedro Gutiérrez.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Mascota.

Lic. José Benito González Garibaldi.

María de los Ángeles Ramírez Fuentes

Lic. Ana Genoveva Robles Gavilán

Región Sanitaria IX Ameca.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Ameca

Ing. Sergio Raúl Orozco Andalón

Lic. Carmen Dolores Becerra Ávila.

Lic. TS. Luz Marina Medina Nuño.

Lic. Francisco Javier Calata Padilla.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Región Sanitaria X Zapopan.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Zapopan I.

Dra. Laura Graciela Torres Rodríguez.

Brenda Martínez Prado.

María Magdalena Negrete Solorio.

José Francisco Pérez y Pérez

Centro de Atención Primaria en Adicciones Zapopan II.

Lic. Claudia Lara Sánchez

Lic. TS. Irma Aracely Almaral Rodríguez.

Lic. Judith Velazco Gibbens

Lic. Fernando Navarro Angulo

Katya Flores Olvera

Región Sanitaria XI San Pedro Tlaquepaque.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tlaquepaque

Lic. TS. Jeannie Oseguera Jiménez.

Lic. TS. Araceli Carrillo Ramírez.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tlajomulco.

Mtro. Raúl Rosete Ramírez.

Jorge Antonio Hernández García.

Región Sanitaria XII Tonalá.

Centro Nueva Vida de Tonalá I.

Lic. Sergio Martínez Arellano.

Lic. Constanza Moreno Torres

Lic. TS. Martha Leonor Hernández Orozco.

Centro Nueva Vida de Tonalá II.

Lic. Gustavo Guzmán Félix.

Lic. TS. Cindy Adriana Ríos Hernández.

Lic. TS. Sonia Karina Fregoso Flores.

Lic. Carlos Nabor Aguilera Romo



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Región Sanitaria XIII Guadalajara.

Centro de Atención Primaria en Adicciones Guadalajara

Lic. Adalberto Muñoz Márquez

Lic. María del Pilar Magaña Domínguez

Lic. TS. Araceli Ramos Corona

Secretariado Técnico

Dr. Luis Javier Robles Arellano.

Dra. Gloria Gómez Sandoval.

Lic. María Patricia Carlín Sánchez.

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández



PRESENTACIÓN

El uso y abuso de sustancias adictivas es un fenómeno que ha presentado comportamientos con incrementos en todo el país incluyendo en nuestro Estado, de acuerdo a la Encuesta del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017), donde se reporta que la incidencia acumulada en el consumo de drogas ilegales en población de 12 a 65 años a nivel nacional alcanzó el 9.9% y en Jalisco el 15.3%, en el uso de marihuana el 12.2%, cocaína el 6.9%, y los estimulantes de tipo anfetamínico el 2%, colocando a nuestro estado los primeros lugares de porcentaje en el consumo.

El uso de sustancias adictivas es un problema de salud pública que tiene cambios constantes y con características específicas en cada estado tanto en los tipos de drogas y patrón de consumo, vías de administración, así como los nombres, lugares donde se adquieren y consumen.

Ante este reto el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SISVEA) de las adicciones busca aportar datos relacionados con estas sustancias en personas que presentan problemas de consumo y necesitan atención para su consumo.

El SISVEA nace en el año de 1990 con el objetivo de contar con un diagnóstico actualizado, anual de los indicadores de salud relacionados con el uso y abuso de drogas.

En 1994 la NOM 017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica establece que este sistema es parte del SINAVE y la notificación adquiere un carácter obligatorio de los casos atendidos en las entidades federativas.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



En el año 2009 debido a las necesidades de contar con un nuevo sistema informático que estuviera acorde con un nuevo sistema informático se integra el Instituto Nacional de Salud Pública en la generación y modificación del Sistema de tecnología de captura y análisis, herramienta que nos permite realizar análisis específico en cada una de las áreas que coordinan los registros y captura de información.

El programa ha evolucionado en la información como la fusión de cédulas de Hospitales Psiquiátricos, Alcohol y Tabaco en el Indicador de Tratamiento y Rehabilitación en el año 2010 así como el Sistema de Captura, en el año 2017 también se modifican la cédula de los 4 indicadores que lo conforman.

En 2017 la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informa que solo se deberá contar con información de los Centros de Tratamiento no Gubernamentales, lo cual limita a este programa para contar con información de las 13 Regiones Sanitarias

El SISVEA, cuenta con la información de cuatro indicadores de los cuales dos se aplican en las 13 Regiones Sanitarias del Estado. Nos permite identificar el perfil sociodemográfico del usuario, las tendencias de consumo y vías de administración, el patrón de consumo por sexo, escolaridad y grupo de edad.

El SISVEA es un fuente de información para los tomadores de decisiones y desarrolladores de programas preventivos en localidades, municipios así como para el Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas (OMEXTAD) que tiene como objetivo contar con un diagnóstico epidemiológico oportuno y confiable en el ámbito de las adicciones, desde municipio, región sanitaria y estado y a nivel nacional.

El SISVEA continúa siendo un referente en información en materia de adicciones ya que ninguna otra fuente de información tiene acceso a población tan específica como los usuarios de drogas con adicciones severas.



JUSTIFICACIÓN

El consumo de sustancias adictivas se tiene repercusiones en la salud física y mental, además se asocia a problemas sociales como violencia familiar, violencia social, además se asocia a la morbilidad y mortalidad en la población y sobre todo en la juventud y adolescencia.

En las tendencias en la incidencia acumulada reportadas en la ENCODAT 2016 – 2017, Jalisco se encuentra ubicado dentro de los primeros 5 lugares en consumo de drogas ilegales, cualquier droga y marihuana. Sin embargo, en el uso de estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) es de observar que las tendencias tienden a reducirse, e incluso en los menores de 17 años no se reportaron consumo en el patrón de consumo último año.

En las tendencias entre las encuestas 2008, 2011 y 2016-2017 se aprecian cambios significativos en estas sustancias, sin embargo, la información se genera cada 5 años en promedio desde que se inició con la Encuesta Nacional Contra las Adicciones. (ENA)

Como se mencionó anteriormente el fenómeno adictivo es un problema de salud pública en movimiento constante en los tipos de drogas, formas de presentación, vías de administración, mezclas y situaciones de riesgo, enfermedades situaciones de urgencias y mortalidad especialmente por accidentes, homicidios y suicidios.

Para intervenir de manera más eficaz a este complejo fenómeno es necesaria información actualizada sobre el problema y así direccionar o redirigir las estrategias de intervención tanto en prevención, tratamiento, rehabilitación, pero también sobre capacitación.

El SISVEA se desarrolla en la Dirección General de Epidemiología en el año 1991, integrado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE. Los datos registrados aportan información además de conocer lo que sucede en Jalisco y sus Regiones a conocer el comportamiento a nivel nacional, e internacional.

Los resultados que se dan a conocer a los a todos los sectores de la población a través de información electrónica para el desarrollo de programas que dirigidos a prevenir el uso y abuso de sustancias adictivas acordes a las necesidades de cada una de las regiones del estado de Jalisco.

La importancia de la permanencia del sistema estriba en que ha generado información desde el año de 1994, por lo que contamos con información epidemiológica desde hace ya 20 años y publicado en el portal del CEEAJ desde el año 2002.

Hasta el momento se cuenta con la participación de 119 Instituciones y Organismos Civiles que colaboran con el SISVEA; 103 en el Indicador de Tratamiento y Rehabilitación, 32 en el indicador de Puesto Centinela de Urgencias, el Centro de Observación y Clasificación de Menores Infractores y el Servicio Médico Forense de Zona Metropolitana de Guadalajara.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Es importante mantener este Programa funcionado de manera permanente para lograr una vigilancia epidemiológica del Estado sobre el comportamiento del fenómeno adictivo. Asimismo, mantener capacitado a nuestros recursos humanos para que tengan mejores oportunidades de tratar el problema de manera profesional tanto en el ámbito preventivo, curativo y de reinserción social.

Este sistema se apega al **Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030**, el cual tiene el propósito de mejorar la salud de los Jaliscienses con servicios basados en la equidad, calidad, calidez y humanismo y con plena participación de la sociedad civil organizada.

El Secretariado Técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, coordina y opera este Sistema, lo cual garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados y promueve la continuidad, ya que es un procedimiento de concentración de información que tiene como premisa la actualización de los datos; nos queda claro que no basta contar con la información científica, sino saber qué hacer con ella para que ésta cumpla su cometido primordial para la planeación de programas de prevención y la toma de decisiones en Jalisco y en nuestro país.



MÉTODO

El SISVEA es un Programa bien establecido que se aplica en todo el País, en Jalisco este se aplica desde hace años, aplica el indicador de consumo de drogas en las 13 Regiones Sanitarias que conforman el Estado, dándonos así un panorama epidemiológico, Estatal, Regional y Local de la dimensión del problema.

Estas Regiones son estudiadas a través de los **Centros de Atención Primaria en Adicciones**, quienes tienen la coordinación de los establecimientos que brindan atención en adicciones en la Región Sanitaria donde se encuentran ubicados.

El SISVEA cuenta con cuatro indicadores que buscan información de tipo socio demográfico como son: el patrón de consumo, sustancia y edades de inicio y la morbilidad relacionada con las sustancias de abuso.

Las cédulas se aplican por personal capacitado, exclusivamente en Centros de Tratamiento para enfermos de Alcoholismo, Tabaquismo y Farmacodependencia, en el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico de Menores Infractores, Hospitales Psiquiátricos, Servicio Médico Forense y para el indicador "Puesto Centinela de Urgencias" se aplican en Hospitales que cuenten con servicios de urgencias médico-quirúrgicas; para cada uno de ellos se cuenta con una cédula específica.

Las cédulas en este 2017 se actualizaron a nivel nacional y se han estado aplicando desde marzo 2017 a la fecha en los cuatro indicadores, así mismo el programa de captura a CT_SISVEA, la información que se envía a la Dirección General de Epidemiología se excluye la información de los Centros de Atención Primaria en Adicciones y los Centros de Integración Juvenil sin embargo se incluyen en esta edición para continuar contando con información que represente a la mayor parte del estado y a sus regiones sanitarias.

Una vez capturadas se revisa la base de datos la cual es enviada a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien almacena y procesa el SISVEA con resultados nacionales.



OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Contar con un diagnóstico actualizado, periódico, oportuno y confiable, que nos permita conocer las situaciones asociadas directa o indirectamente con el uso y abuso del consumo de sustancias que causan adicción en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en las Regiones del Estado para contar con un panorama general en Jalisco y contribuir con información a nivel nacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Mantener un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, como un sistema único y de información continua para contar con un diagnóstico actualizado de las adicciones en Jalisco u sus Regiones.
- Generar información periódica y ágil sobre la prevalencia, incidencia y características del consumo de alcohol, tabaco, drogas médicas e ilícitas.
- Detectar con oportunidad los cambios en los patrones de consumo de alcohol, tabaco y drogas tanto médicas como ilegales.
- Identificar los patrones de riesgo de morbimortalidad asociados al uso y abuso en el consumo de alcohol, tabaco y drogas médicas e ilícitas.
- Registrar el consumo de drogas o mezclas nuevas.
- Generar hipótesis y proponer protocolos de investigación epidemiológica asociados al consumo de sustancias adictivas.



ESTRATEGIAS

- Para todos los indicadores y estrategias desarrolladas se aplica la siguiente metodología:
- Se asesoró y capacitó a todas las Instituciones y Organismos que nutren este Sistema.
- Los Centros de Atención Primaria en Adicciones, recaban información de los centros de tratamiento que se encuentran ubicados dentro del área de competencia, quienes capacitan y recaban las cédulas generadas por cada establecimiento, entregando acuse de recibo.
- Las cédulas específicas para cada indicador son llenadas por personal capacitado de las Instituciones y Organismos no Gubernamentales y se aplican a los pacientes que acuden de los diferentes Establecimientos que colaboran con el SISVEA.
- Para el caso del indicador de mortalidad, la cédula se llena por un médico capacitado y se obtiene la información de los registros del Servicio Médico Forense.
- El proceso de los fluidos corporales para detectar sustancias adictivas lo realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de donde se toman los resultados.
- Las cédulas se recaban en forma mensual en las oficinas del CECAJ y CAPA's quienes revisan que esté llena de manera completa y correcta.
- Las cédulas se codifican de acuerdo al manual del SISVEA 2017, el cual es utilizado en toda la República y la información se captura en el equipo de cómputo utilizando el programa Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones y con tablas dinámicas del programa de Excel.
- La información se revisa y corrige, para tener una base de datos correcta y confiable.
- La información capturada se envía mensualmente por vía electrónica a la Dirección General de Epidemiología en la Ciudad de México.
- Se informa por escrito de los avances en forma mensual al Secretario Técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.
- Se realiza el informe por escrito de los resultados arrojados al finalizar el año de estudio.
- Se retroalimenta con el análisis de resultados arrojados por el SISVEA a las autoridades del Estado, las Instituciones y Organismos que nutren el Sistema.
- Los resultados se difunden a nivel Regional, Estatal y Nacional en forma anual.
- El proceso se evalúa de acuerdo a los criterios del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Programa "Caminando a la Excelencia" en forma mensual.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



INDICADORES DEL SISVEA

Los objetivos estratégicos se logran a través de los siguientes indicadores.

- Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales (alcohol, tabaco y drogas médicas e ilícitas).
- Enfermedades y lesiones de causa externa. (Puesto Centinela de Urgencias Médicas)
- Mortalidad en individuos usuarios de drogas. (Forense)
- Consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilícitas en Menores Infractores.



ACCIONES

Indicador:

Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales.

Se captó la población que acude a los diferentes Establecimientos que brindan Tratamiento y Rehabilitación por consumo de sustancias adictivas, permitiendo así conocer el perfil socio demográfico de los usuarios de drogas, el patrón de consumo, edad de inicio, tipo de droga utilizada y droga de mayor impacto, situaciones de consumo de riesgo, como compartir jeringas, lugares donde las consiguen y consumen con mayor frecuencia.

La información fue obtenida a través de la aplicación de la cédula específica a los pacientes que ingresan a los Establecimientos de Tratamiento que están en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM 028 para el Control de las Adicciones (NOM 028-SSA2-1999) por presentar problemas con el uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, por el personal de cada Centro, éstos a su vez han sido capacitados y asesorados en forma permanente por el personal del SISVEA y de Centros de Atención Primaria de Adicciones.

Las cédulas se recabaron en forma mensual por personal del CECAJ a través de visitas y/o citas mensuales, para el caso de los Establecimientos que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los recaban los Centros de Atención Primaria en Adicciones ubicados en la Región Sanitaria según le corresponda.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Indicador:

Puesto Centinela de Urgencias: enfermedades y lesiones de causa externa.

Este indicador se realizó dos veces durante el año, con una periodicidad semestral.

Se aplicó durante una semana tipo. (Semana donde no contenga algún día festivo o puente).

Se incluyeron las Unidades Médicas que cuenten con un servicio urgencias.

Se captaron a todos los pacientes que ingresaron a las Unidades de Urgencias entre el rango de edad de 5 años o mayores, conociendo así, la relación existente entre el uso y abuso de sustancias adictivas y las lesiones de causa externa y enfermedades asociadas, captadas en los Centros de Urgencias Médicas de las 13 Regiones Sanitarias.



INSTITUCIONES Y ORGANISMOS CIVILES QUE PARTICIPAN EN EL SISVEA POR INDICADOR

Indicador “Tratamiento y Rehabilitación”

1. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Ameca.
2. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Arandas
3. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Autlán
4. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Colotlán
5. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Lagos de Moreno
6. Centro de Atención Primaria en Adicciones de La Huerta
7. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Mascota
8. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Ocotlán
9. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Puerto Vallarta
10. Centro de Atención Primaria en Adicciones de San Juan de los Lagos
11. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tamazula
12. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tepatitlán
13. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tlajomulco
14. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tonalá I
15. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tonalá II
16. Centro de Atención Primaria en Adicciones de San Pedro Tlaquepaque
17. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Zapopan I
18. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Zapopan II
19. Centro de Atención Primaria en Adicciones de Zapotlán el Grande
20. Centro de Atención Primaria en Adicciones Guadalajara.
21. Centro de Tratamiento y Rehabilitación la Perla de Occidente Femenil
22. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 16
23. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 4
24. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 13
25. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 9
26. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 8
27. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 3
28. Centro de Tratamiento y Rehabilitación “Hacienda del Lago” A.C.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



29. Instituto de formación Integral Barrios Unidos A. C.
30. Centro de Tratamiento y Rehabilitación “Camino Nuevo”
31. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Sol, Amor y Esperanza. A.C.
32. Centro de Tratamiento y Rehabilitación “Integración en Recuperación para Alcohólicos y Drogadictos de Jalisco, (IRA) A. C.
33. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Nueva Fuerza de Vida. A. C.
34. Centro de Tratamiento y Rehabilitación “Drogadictos Anónimos, A. C. (Grupo Providencia)
35. Centro de Desarrollo para Jóvenes “Señor de la Misericordia A. C.
36. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Para Enfermos Alcohólicos y Drogadictos A. C.
37. Centro de Integración Juvenil Zapotlán el Grande. A. C.
38. Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas A. C. Comunidad Terapéutica.
39. Grupo Unido Interesado en Adicciones A.C. GUIA
40. Comunidad Terapéutica Las Hojas A. C.
41. Centro de Integración Juvenil Guadalajara Sur. A.C.
42. Centro de Integración Juvenil Guadalajara Centro A.C.
43. Centro de Integración Juvenil Tlaquepaque. A.C.
44. Centro de Integración Juvenil Puerto Vallarta. A.C.
45. Centro de Integración Juvenil A.C. Kena Moreno.
46. Centro de Tratamiento y Rehabilitación “Clínica Minnesota” A.C.
47. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Casa Nazareth.
48. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Juventud sin Adicciones. A. C.
49. CREAD República Mexicana. A. C.
50. Centro de Tratamiento y Rehabilitación. Agua Viva A. C.
51. Centro de Tratamiento y Rehabilitación La Próxima Frontera A. C. unidades: Agua Blanca, Ahualulco del Mercado y Tonalá.
52. Centro de Tratamiento “Guerra Cristiana” A. C.
53. Centro de Tratamiento La Casa de mi padre A. C.
54. Casa Hogar Hombres en Victoria A. C.
55. Grupo MIDRASH. A. C. Unidades Femenil y Varonil.
56. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Majonica Samael. A.C.
57. Grupo Jóvenes Vida Nueva A. C.
58. CREAD Zona 1 A. C. de Cuitzeo.
59. CREAD Zona 1 A. C. Chapala.
60. CREAD Zona 1 A. C. Atotonilco.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



61. CREAD A. C. de Poncitlán.
62. CRREAD de Michoacán A. C.
63. Grupo Jóvenes Alcohólicos y Adictos Guadalajara A. C.
64. Grupo Fortaleza de Vida A. C. Varonil
65. Grupo Fortaleza de Vida A. C. Femenil
66. Centro de Tratamiento Volver a Nacer A. C.
67. Cristo Esperanza de Vida Nueva A. C.
68. Camina hacia una vida nueva con Cristo A. C.
69. CREAD Polariss A.C. Varonil
70. CREAD Polariss A.C. Femenil.
71. Nacer en una Fuente de Amor. A.C.
72. Grupo Bendita Libertad A. C.
73. Grupo Jalisco sin Adicciones A.C.
74. Grupo Nuevo Amanecer A. C.
75. Comunidad Terapéutica Tlakati A.C.
76. Comunidad Terapéutica Guerreros de la Luz A. C.
77. Grupo Gama y Zafiro A. C. Unidad Tlaquepaque
78. Grupo Gama y Zafiro A. C. Unidad Zapopan
79. Infinita Necesidad de Amor A. C. Unidad Cuitláhuac
80. Infinita Necesidad de Amor A. C. Unidad Obregón
81. Tepatitlán Empezado a Vivir A. C.
82. Grupo Jóvenes de Tepatitlán A. C
83. CRREAD de Tepatitlán.
84. Grupo Fortaleza de Vida A. C. Unidades Varonil y Femenil
85. El Sendero, Fuente de Amor y Servicio A. C. Matriz y Sucursal
86. Centro de Desarrollo para las Mujeres “Nuestra Señora de la Luz. A. C.
87. Misión y vida A. C.
88. CAPP, Centro de Apoyo a Personas con Problemas de Adicción A. C.
89. Regresando a Dios A. C.
90. Obra Social Hacienda de la Esperanza. A. C.
91. Quinta Sobriedad Emocional A. C.
92. Centro de Tratamiento Under The Tree de Jocotepec.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



93. Comunidad Terapéutica GAMAN A.C.
94. Grupo Jóvenes Progreso A.C.
95. Nueva Gente San Juan. A. C.
96. Centro de Tratamiento “México me necesita” A. C.
97. Grupo Reto a la Esperanza A.C.
98. CREAD del Pacífico A.C. Matriz y Sucursal
99. CREAD de Tonalá San Benito de Abad. A. C.
100. Campo Renacimiento A. C.
101. Albergue Zapopan Femenil. A. C.
102. Comunidad Terapéutica Regresando a la Luz A. C.
103. Módulo de Tratamiento para las Adicciones Comisaría de Prisión Preventiva.
104. Clínica Samaria S. A. de C. V.
105. Grupo Generando Familias A. C.
106. Centro de Tratamiento Agua Viva. A. C.
107. Comunidad Terapéutica Ser Libre encontrando el Camino A. C.
108. CAIJE Comunidad Juvenil Terapéutica Libertad y Sentido A. C.
109. Centro de Tratamiento Esperanza de Vivir Libre A. C.
110. Comunidad Terapéutica GAMAN de Ocotlán. A. C.
111. Centro de Tratamiento Libertad para la Libertad A.C.
112. Movimiento Metropolitano de Alcohólicos y Drogadictos A. C.
113. Clínica de Salvación para Alcohólicos y Drogadictos de Occiania A.C.
114. Generaciones en Victoria A. C.
115. Comunidad Terapéutica “La Visión del Mañana” A. C.
116. Comunidad Terapéutica Bettaniia A. C.



Indicador “Puesto Centinela de Urgencias”.

Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cruz Roja Mexicana Delegación Guadalajara.

Cruz Roja Mexicana Unidad Toluquilla.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Ruiz Sánchez”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Rivas Souza”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Delgadillo Araujo”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Leonardo Oliva”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Ernesto Arias”.

Servicios de Salud de El Salto y Majadas.

Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco de Zúñiga.

Servicios Médicos Municipales de San Pedro Tlaquepaque.

Servicios Médicos Municipales de Tonalá.

Servicios de Salud de Zapopan Unidad Norte.

Servicios de Salud de Zapopan Unidad Sur.

Servicios de Salud de Zapopan Unidad Villas de Guadalupe.

Servicios de Salud de Zapopan, Unidad Federalismo.



Colotlán.

Hospital de Primer Contacto de Colotlán

Hospital de Primer Contacto de Huejuquilla

Lagos de Moreno.

Cruz Roja Delegación Lagos de Moreno.

Clínica No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social

San Juan de los Lagos.

Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan de los Lagos.

Hospital Comunitario de San Juan de los Lagos

Tepatitlán de Morelos.

Hospital Sagrado Corazón de Arandas

Tamazula de Gordiano.

Hospital Comunitario de Tamazula

Unidad IMSS No 15



Zapotlán el Grande.

Cruz Roja Mexicana

Hospital Regional Zapotlán el Grande.

Hospital Regional de Zona No. 9 del IMSS

Autlán de Navarro.

Hospital de Primer Contacto la Huerta.

Hospital de Primer Contacto de Casimiro Castillo.

Puerto Vallarta.

Hospital de Primer Contacto Mascota

Cruz Roja Mexicana Vallarta

Hospital Regional de la Secretaria de Salud

Servicios Médicos Municipales

Ameca.

Hospital Regional de Ameca

Cruz Roja de Ameca



Indicador “Consejo de Menores”

Centro de Observación y Clasificación de Menores Infractores del Estado de Jalisco.

Indicador “Forense”

Servicio Médico Forense.

El proceso de la información se captura y analiza utilizando el Programa del SISVEA, el cual nos permite la impresión de tablas y con el programa de Excel para obtener frecuencias y hacer el cruce de una o más variables.

Indicador: Mortalidad en individuos usuarios de drogas.

La información se obtuvo de los registros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de la ciudad de Guadalajara.

La muestra para el proceso del tamiz toxicológico se obtuvo por el médico forense y fue procesado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Se capturaron todos los cadáveres que al momento de fallecer tuvieran como edad mínima 5 años de edad, independientemente de la causa de muerte y que presentaron algún nivel de sustancias adictivas en fluidos corporales. Se buscan niveles de alcohol, cocaína, anfetaminas, cannabinoides, opio y derivados, solventes volátiles y tranquilizantes.

La información se recabó por personal del Secretariado Técnico del CECAJ, en forma semanal.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Indicador: Consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilícitas en grupos de riesgo.

Se define como grupo de riesgo a los menores infractores.

Se recabó la información de los menores que ingresaron al Centro de Observación de Menores Infractores, este indicador nos permite conocer cuántas y el tipo de infracciones que fueron relacionadas con el uso y abuso de sustancias adictivas, así como el perfil socio demográfico y psicológico.

Durante el año 2018 se ve restringida la información por la Ley de Protección a los menores de edad por lo que en el 2018 no contamos con información suficiente para realizar análisis del indicador.



INDICADOR: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

Durante el año 2018 se registraron un total de 7,703 pacientes atendidos por establecimientos especializados en adicciones que se encuentran en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 028 SSA2-1999, quienes son asesorados y guiados para dicho cumplimiento.

Los datos referidos en este documento representan a pacientes con problema de consumo con el alcohol, tabaco y otras drogas, que acuden a recibir tratamiento y no representa a la población general.

Dada la extensión de la información se hará descripción en cuadros la información obtenida a través de las cédulas específicas por cada uno de los indicadores en número los casos atendidos y las proporciones porcentuales de la siguiente información

Perfil Sociodemográfico

Información sobre el estado y municipio de residencia, la edad, sexo, embarazo, actividad principal que desempeña, estado civil, escolaridad en su grado máximo de estudios y centro de tratamiento en el cual se ingresa.

En antecedentes de búsqueda de apoyo

Se pregunta el número de tratamientos que ha recibido durante los últimos 12 meses y durante toda su vida, así como la forma en que acude al tratamiento si es de manera voluntaria, por indicación médica no psiquiátrica y por indicación psiquiátrica, por amigos o familiares, por indicación legal, por indicación de la escuela o trabajo y otros motivos.



Patrón de Consumo

Se busca saber la droga de inicio y droga de impacto, así como su historial del consumo de drogas durante toda su vida, así como el consumo durante el último año, edad en que la usó por primera vez, formas y vías de administración de la droga, forma de consumo actual.

La droga de impacto

Es la sustancia por la que el paciente acude a solicitar o a recibir tratamiento, buscando además edad de inicio, vía de administración, entidad y municipio de consumo.

Conductas de Riesgo

Sobre el consumo de drogas por vía parenteral, el riesgo de compartir jeringas para el uso de éstas, así como el uso de jeringa nueva durante último consumo, la combinación de sustancias adictivas, conducción de algún vehículo de motor bajo el influjo de alcohol o drogas y padecimientos médicos relacionados con el uso de drogas.

Disponibilidad de sustancias o drogas preguntamos los lugares que con mayor frecuencia consigue las sustancias adictivas como en su propia casa, se la llevan a su casa, en casa de algún amigo o familiar, en la calle, en antros y bares, en fiestas y reuniones, en la escuela, en el trabajo, en tiendas cercanas a su domicilio, en parques, picaderos y otros sitios.

Lugares donde acostumbra a consumir la droga de impacto como en su propia casa, en casa de algún amigo o familiar, en la vía pública (calles, parques, etc.), en antros/bares, en fiestas o reuniones, en la escuela, en el trabajo, en picaderos y en pocos casos el que no sepa o no pueda responder.

Evaluación de la dependencia a la droga de impacto, en la cual se evalúan durante los últimos 12 meses de consumo con los siguientes criterios diagnósticos, tolerancia, compulsión, control de consumo, abstinencia, reducción progresiva y uso persistente con los siguientes ítems:

Tolerancia

Uso de mayor cantidad de droga para lograr el efecto deseado.

Menor efecto con la misma dosis que antes.

Si se dio cuenta que necesita mayor cantidad de droga para sentir el mismo efecto.



Consumo compulsivo

- Deseo fuerte de consumir la droga y no puede evitar hacerlo.
- Deseo fuerte de consumo que no puede pensar en otra cosa.

Dificultad para controlar el consumo

- Quiere o ha intentado dejar de consumir o disminuir la cantidad y si ha logrado hacerlo por lo menos durante un mes.
- Periodos en que usó la droga en mayor cantidad y tiempo de lo que se proponía y se le hizo difícil suspender el consumo antes de estar intoxicado

Abstinencia

- Horas o días siguientes de suspender o reducir el consumo se presentaron síntomas abstinencia.
- Uso de otras sustancias para reducir o curar los síntomas de abstinencia.

Reducción Progresiva

- Ha habido ocasiones que dedica mucho tiempo en conseguir la droga.
- Ha pasado mucho tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos de la droga.
- Reducción de actividades importantes sea sociales, familiares o compromisos por el uso de drogas.

Uso Persistente

- Ha tenido problemas de salud como sobredosis accidental, tos persistente, convulsiones, infecciones como hepatitis, SIDA, problemas cardiacos relacionados con el consumo de drogas.
- Continuación el uso a pesar de presentar estos problemas de salud.
- Ha tenido problema psicológicos o sociales asociados al consumo de drogas como depresión, paranoia, fracasos laborales o escolares, conflictos familiares, actos de violencia y accidentes.
- Continúa consumiendo a pesar de los problemas antes descritos.

Los resultados se presentan en Tablas, con números y porcentajes con información general y por Región Sanitaria, en tablas con datos generales y distribuidos por Región Sanitaria y se presentarán por separado por sexo.

El personal del SISVEA y de los Centros de Atención Primaria de Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.



Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones Sanitarias.

Región Sanitaria I de Colotlán: (RS-I)

Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero.

Región Sanitaria II de Lagos de Moreno: (RS-II)

Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo.

Región Sanitaria III de Tepatitlán: (RS-III)

Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.

Región Sanitaria IV La Barca: (RS-IV)

Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán y Zapotlán del Rey.

Región Sanitaria V Tamazula: (RS-V)

Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán y Valle de Juárez.

Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán: (RS-VI)

Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic y Zapotlán de Vadillo.

Región Sanitaria VII de Autlán: (RS-VII)

Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco y Unión de Tula.

Región Sanitaria VIII Puerto Vallarta: (RS-VIII)

Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Tomatlán.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Región Sanitaria IX Ameca: (RS-IX)

Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, el Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila y Teuchitlán.

Región Sanitaria X Zapopan: (RS-X)

San Cristóbal de la Barranca y Zapopan.

Región Sanitaria XI Tonalá: (RS-XI)

Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, el Salto, Tonalá y Zapotlanejo.

Región Sanitaria XII San Pedro Tlaquepaque: (RS-XII)

Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y Villa Corona.

Región Sanitaria XIII Guadalajara: (RS-XIII)

Guadalajara



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 1 NÚMERO DE PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN EL ESTADO DE JALISCO SEGÚN REGIÓN SANITARIA Y GÉNERO | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| Región Sanitaria | General | Masculino | Femenino |
| RS-I Colotlán | 174 | 131 | 43 |
| RS-II Lagos de Moreno | 157 | 112 | 45 |
| RS-III Tepatlán | 781 | 634 | 147 |
| RS-IV La Barca | 854 | 787 | 67 |
| RS-V Tamazula | 143 | 129 | 14 |
| RS-VI Zapotlán el Grande | 464 | 432 | 32 |
| RS-VII Autlán de Navarro | 196 | 171 | 25 |
| RS-VIII Puerto Vallarta | 175 | 146 | 29 |
| RS-IX Ameca | 400 | 293 | 107 |
| RS-X Zapopan | 1272 | 1123 | 149 |
| RS-XI Tonalá | 493 | 398 | 95 |
| RS-XII San Pedro Tlaquepaque | 1,222 | 1,120 | 102 |
| RS-XIII Guadalajara | 1,372 | 1,158 | 214 |
| Total | 7,703 | 6,634 | 1,069 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 2 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ANONIMATO SEGÚN REGIÓN SANITARIA**

| Anónimo | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Número | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Si | 12.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0 | 9.4% | 0.0 | 46.3% | 21.9% |
| No | 87.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.4% | 100% | 90.6% | 100% | 53.7% | 78.1% |

**Cuadro No. 3 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN REGIÓN SANITARIA Y GÉNERO**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Número | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Masculino | 86.1% | 75.3% | 71.3% | 81.2% | 92.2% | 90.2% | 93.1% | 87.2% | 83.4% | 73.3% | 88.3% | 80.7% | 91.7% | 84.4% |
| Femenino | 13.9% | 24.7% | 28.7% | 18.8% | 7.8% | 9.8% | 6.9% | 12.8% | 16.6% | 26.8% | 11.7% | 19.3% | 8.3% | 15.6% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 4 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN GRUPO DE EDAD EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO POR REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Edad | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| 5 a 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 a 14 | 7.0% | 18.4% | 28.7% | 12.9% | 0.5% | 7.7% | 0.9% | 10.7% | 26.3% | 8.8% | 6.3% | 3.2% | 5.8% | 5.3% |
| 15 a 19 | 22.7% | 28.7% | 27.4% | 23.4% | 17.3% | 18.9% | 10.1% | 15.8% | 42.3% | 29.8% | 23.6% | 28.6% | 26.4% | 19.2% |
| 20 a 24 | 19.4% | 14.4% | 10.2% | 15.1% | 26.9% | 16.8% | 21.1% | 13.8% | 12.0% | 16.8% | 19.7% | 17.2% | 21.6% | 19.4% |
| 25 a 29 | 14.0% | 12.1% | 8.9% | 14.5% | 15.9% | 13.3% | 18.5% | 13.8% | 5.7% | 14.0% | 14.2% | 14.8% | 13.0% | 13.6% |
| 30 a 34 | 10.5% | 3.4% | 7.6% | 7.8% | 13.9% | 13.3% | 17.5% | 13.3% | 3.4% | 10.3% | 10.0% | 11.0% | 9.5% | 10.1% |
| 35 a 39 | 8.5% | 8.0% | 7.6% | 6.9% | 8.5% | 9.1% | 11.0% | 11.7% | 3.4% | 9.0% | 7.9% | 8.3% | 7.8% | 9.6% |
| 40 a 44 | 6.0% | 6.9% | 4.5% | 6.7% | 5.9% | 7.7% | 5.2% | 6.6% | 2.3% | 3.5% | 5.6% | 6.1% | 6.7% | 6.8% |
| 45 a 49 | 5.2% | 1.7% | 1.3% | 4.6% | 5.6% | 3.5% | 8.6% | 5.6% | 3.4% | 4.0% | 5.5% | 4.9% | 4.1% | 6.3% |
| 50 a 54 | 3.2% | 2.9% | 1.9% | 4.4% | 2.9% | 2.8% | 3.9% | 4.6% | 0.0% | 2.8% | 2.7% | 3.7% | 2.3% | 4.3% |
| 55 a 59 | 1.8% | 0.6% | 0.0% | 2.4% | 1.9% | 2.8% | 1.7% | 2.6% | 0.0% | 0.8% | 2.0% | 0.8% | 1.9% | 2.3% |
| 60 a 64 | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.2% | 1.4% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 1.4% | 0.6% | 0.6% | 1.5% |
| 65 a > | 0.9% | 2.3% | 1.3% | 0.4% | 0.4% | 2.8% | 0.9% | 1.0% | 0.6% | 0.0% | 1.0% | 0.8% | 0.4% | 1.6% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 5 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Número | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colima | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chihuahua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalisco | 7,675 | 167 | 157 | 779 | 854 | 138 | 464 | 196 | 175 | 393 | 1,266 | 493 | 1,221 | 1,372 |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michoacán | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nayarit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 5 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Número | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veracruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacatecas | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro País | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 6.1 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| Municipio de Residencia | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Número | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Acatic | 42 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Acatlán de Juárez | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Ahualulco del Mercado | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Amacueca | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Amatitán | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| Ameca | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 144 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| San Juanito de Escobedo | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Arandas | 250 | 0 | 0 | 224 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Arenal | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Atemajac de Brizuela | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Atengo | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Atenguillo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Atotonilco el Alto | 40 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Atoyac | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Autlán de Navarro | 171 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 29 | 128 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Ayotlán | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 6.2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| Municipio de Residencia | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Ayutla | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Barca | 31 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bolaños | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cabo Corrientes | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Casimiro Castillo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cihuatlán | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Zapotlán El Grande | 226 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 161 | 0 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Cocula | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Colotlán | 128 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Concepción de Buenos Aires | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cuautitlán de García Barragán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cuautla | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cuquío | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chapala | 165 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| Chimaltitlán | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chiquilistlán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 6.3 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| Municipio de Residencia | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Degollado | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ejutla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Encarnación de Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Etzatlán | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grullo | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Guachinango | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 1,476 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 20 | 2 | 10 | 27 | 157 | 84 | 233 | 895 |
| Huejúcar | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejuquilla el Alto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Huerta | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 40 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Ixtlahuacán del Río | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jalostotitlán | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jamay | 36 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jesús María | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jilotlán de los Dolores | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jocotepec | 36 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 6.4 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| Municipio de Residencia | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Juanacatlán | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juchitlán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lagos de Moreno | 67 | 0 | 37 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Limón | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magdalena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Santa María del Oro | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Manzanilla de la Paz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mascota | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mazamitla | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexticacán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mezquitic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mixtlán | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ocotlán | 290 | 0 | 0 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Pihuamo | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poncitlán | 69 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Puerto Vallarta | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62 | 0 | 3 | 2 |
| Villa Purificación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 6.5 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| Municipio de Residencia | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Quitupan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Salto | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 40 | 16 |
| San Diego de Alejandría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan de los Lagos | 158 | 0 | 120 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| San Julián | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marcos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| San Martín de Bolaños | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Hidalgo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Miguel el Alto | 22 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Gómez Farías | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa María de los Ángeles | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sayula | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tala | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Talpa de Allende | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 6.6 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| Municipio de Residencia | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Tamazula de Gordiano | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tapalpa | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tecalitlán | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tecolotlán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Techaluta de Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenamaxtlán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Teocaltiche | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teocuitatlán de Corona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tepatitlán de Morelos | 408 | 0 | 0 | 368 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| Tequila | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Teuchitlán | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tizapán el Alto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 286 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | 10 | 178 | 65 |
| San Pedro Tlaquepaque | 588 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | 19 | 460 | 70 |
| Tolimán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomatlán | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 6.7 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| Municipio de Residencia | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Tonalá | 486 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 268 | 119 | 69 |
| Tonaya | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tonila | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totatiche | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tototlán | 42 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuxcacuesco | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tuxcueca | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxpan | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 31 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Unión de San Antonio | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unión de Tula | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle de Guadalupe | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| San Gabriel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Villa Corona | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Villa Guerrero | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Villa Hidalgo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañadas de Obregón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahualica de González Gallo | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 6.8 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| Municipio de Residencia | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Zacoalco de Torres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Zapopan | 1,158 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 915 | 18 | 74 | 124 |
| Zapotiltic | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotlán del Rey | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zapotlanejo | 32 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipios de Otros Estados | 30 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 7.1 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Ocupación Principal | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Estudiante tiempo completo | 14.3% | 34.5% | 33.8% | 15.7% | 3.4% | 15.4% | 3.4% | 21.4% | 33.1% | 21.5% | 18.4% | 13.0% | 11.5% | 12.6% |
| Estudiante con actividad laboral | 5.7% | 11.5% | 12.7% | 9.5% | 0.7% | 7.0% | 4.1% | 3.6% | 16.0% | 9.3% | 5.4% | 6.7% | 5.2% | 3.8% |
| Tiene empleo estable > 6 meses | 38.3% | 27.6% | 28.0% | 45.7% | 63.7% | 38.5% | 53.0% | 35.2% | 16.6% | 29.5% | 35.7% | 28.8% | 30.5% | 34.2% |
| Tiene menos de 6 meses | 15.1% | 6.9% | 9.6% | 7.3% | 18.5% | 23.1% | 9.3% | 17.3% | 15.4% | 16.3% | 14.1% | 11.0% | 23.3% | 14.9% |
| Desempleado (busca empleo) | 12.2% | 6.3% | 7.0% | 11.1% | 4.3% | 8.4% | 17.2% | 11.2% | 2.3% | 9.8% | 12.2% | 16.6% | 13.9% | 16.6% |
| Desocupado (no busca empleo) | 9.0% | 9.2% | 3.8% | 6.5% | 2.0% | 5.6% | 5.2% | 8.2% | 11.4% | 8.5% | 10.0% | 11.4% | 12.7% | 12.0% |
| Hogar | 2.4% | 1.7% | 3.8% | 2.8% | 1.2% | 0.0% | 2.6% | 1.0% | 2.9% | 3.0% | 2.0% | 4.7% | 1.6% | 3.2% |
| Pensionado | 0.7% | 2.3% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.3% | 1.3% | 0.0% | 0.7% | 0.9% |
| No aplica | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.4% | 6.9% | 0.0% | 0.0% |
| Otra | 1.6% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 5.7% | 1.4% | 3.7% | 1.5% | 0.6% | 2.0% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 1.7% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% |
| No responde | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 8.1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Grado Máximo de Estudios | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Primaria | 24.5% | 13.2% | 26.8% | 28.2% | 39.0% | 28.0% | 19.2% | 19.9% | 19.4% | 12.8% | 19.3% | 19.7% | 28.3% | 23.8% |
| Secundaria | 45.4 % | 47.7% | 56.7% | 46.1% | 42.0% | 39.2% | 40.7% | 43.9% | 47.4% | 42.8% | 44.8 % | 47.9% | 45.5% | 48.3% |
| Escolaridad Técnica | 2.8% | 1.1% | 1.9% | 0.8% | 1.1% | 2.8% | 2.4% | 1.0% | 0.6% | 1.8% | 4.0% | 5.9% | 2.7% | 3.9% |
| Bachillerato | 20.2% | 22.4% | 12.7% | 20.0 % | 13.3% | 23.1% | 29.1% | 26.0% | 28.0% | 35.8% | 21.2% | 20.5% | 16.8% | 17.3% |
| Licenciatura | 4.5% | 13.2% | 1.9% | 2.8% | 1.6% | 0.0% | 6.0% | 6.6% | 2.3% | 4.5% | 8.6% | 2.4% | 2.9% | 4.6% |
| Maestría | | | | | | | | | | | | | | |
| Doctorado | 0.4% | 0.6% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.9% | 0.2% | 0.5% | 0.2% |
| Especialidad | | | | | | | | | | | | | | |
| No sabe leer ni escribir | 1.0% | 1.1% | 0.0% | 1.3% | 0.8% | 4.2% | 0.9% | 1.0% | 1.7% | 1.0% | 0.5% | 1.8% | 1.2% | 0.5% |
| Sabe leer y escribir | 1.0% | 0.6% | 0.0% | 0.5% | 0.8% | 2.8% | 0.9% | 1.0% | 0.6% | 1.0% | 0.4% | 1.4% | 2.0% | 1.2% |
| No aplica | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| No responde | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.8% | 0.0% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 9 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO CIVIL Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Estado Civil | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Soltero | 61.8% | 69.0% | 68.2% | 62.4% | 56.9% | 59.4% | 51.5% | 59.7% | 81.7% | 69.5% | 61.4% | 62.7% | 63.7% | 60.8% |
| Casado | 16.6% | 16.1% | 17.8% | 19.3% | 24.5% | 12.6% | 19.0% | 17.3% | 8.0% | 16.0% | 15.8% | 15.4% | 12.3% | 15.9% |
| Unión Libre | 13.1% | 11.5% | 7.0% | 11.0% | 12.9% | 14.7% | 18.5% | 13.3% | 8.6% | 9.5% | 12.6% | 14.4% | 14.4% | 14.0% |
| Separado | 5.4% | 2.9% | 5.7% | 6.1% | 1.5% | 8.4% | 4.5% | 7.7% | 1.1% | 3.3% | 6.9% | 3.7% | 7.3% | 6.0% |
| Divorciado | 1.9% | 0.6% | 0.0% | 0.9% | 1.8% | 4.2% | 4.5% | 1.0% | 0.0% | 1.8% | 2.0% | 2.4% | 1.4% | 2.1% |
| Viudo | 0.6% | 0.0% | 1.3% | 0.1% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.0% | 0.4% | 1.2% |
| No aplica | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
| No sabe | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.9% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 10 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ANTECEDENTE DE TRATAMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Búsqueda de Apoyo | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Primera vez en el año | 87.1% | 99.4% | 89.2% | 93.1% | 84.4% | 92.3% | 79.7% | 85.7% | 85.1% | 96.5% | 91.0% | 85.0% | 83.2% | 83.7% |
| Ya había acudido en este año | 12.9% | 0.6% | 10.8% | 6.9% | 15.6% | 7.7% | 20.3% | 14.3% | 14.9% | 3.5% | 9.0% | 15.0% | 16.8% | 16.3% |

**Cuadro No. 11 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE HA RECIBIDO TRATAMIENTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Número de veces | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Primera Vez | 65.6% | 88.5% | 72.6% | 67.6% | 76.3% | 69.2% | 65.7% | 63.3% | 71.4% | 66.0% | 63.9% | 66.3% | 64.3% | 55.8% |
| De 2 a 4 | 27.7% | 11.5% | 27.4% | 27.0% | 20.7% | 25.2% | 28.4% | 30.6% | 25.1% | 28.8% | 28.5% | 26.0% | 26.5% | 35.3% |
| De 5 a > | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 2.9% | 5.6% | 5.8% | 6.1% | 3.4% | 5.3% | 7.6% | 7.7% | 9.2% | 8.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 12 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN FORMA EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forma que acude al centro | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Voluntariamente | 49.5% | 48.3% | 28.7% | 38.3% | 40.3% | 37.8% | 54.7% | 77.0% | 42.9% | 28.3% | 59.7% | 53.8% | 45.6% | 59.3% |
| Indicación médica no psiquiátrica | 3.5% | 5.2% | 8.9% | 2.2% | 5.7% | 0.0% | 0.9% | 3.6% | 3.4% | 8.0% | 1.3% | 1.0% | 1.9% | 6.0% |
| Indicación médica psiquiátrica | 0.6% | 1.7% | 1.9% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.7% | 0.7% |
| Lo llevaron amigos o familiares | 33.3% | 5.7% | 7.6% | 34.6% | 51.5% | 42.0% | 39.0% | 1.0% | 21.7% | 37.8% | 27.7% | 33.1% | 41.7% | 27.6% |
| Indicación Legal | 2.5% | 5.2% | 7.0% | 0.4% | 0.5% | 1.4% | 1.3% | 4.1% | 3.4% | 2.3% | 2.4% | 3.0% | 3.9% | 2.7% |
| Escuela o trabajo | 10.2% | 33.9% | 45.9% | 24.3% | 0.8% | 18.2% | 2.8% | 14.3% | 27.4% | 23.8% | 7.2% | 8.9% | 5.3% | 3.6% |
| Otra (s) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
| No sabe | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| No responde | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 13 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN DROGA DE INICIO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Total | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Alcohol | 40.1% | 72.4% | 45.9% | 49.9% | 30% | 57.3% | 34.5% | 67.3% | 48.0% | 57.5% | 43.6% | 39.6% | 25.8% | 35.7% |
| Marihuana | 15.4% | 6.9% | 14.6% | 8.2% | 26.1% | 7.7% | 22.4% | 4.6% | 11.4% | 7.8% | 13.2% | 11.4% | 19.3% | 16.7% |
| Inhalantes | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.4% | 0.0% | 1.3% | 0.5% | 2.3% | 1.0% | 1.5% | 1.6% | 4.4% | 2.7% |
| Alucinógenos | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 3.1% |
| Heroína | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Opio/Morfina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Cocaína | 2.3% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 2.2% | 0.7% | 4.3% | 0.0% | 1.7% | 2.8% | 1.8% | 2.4% | 2.5% | 2.7% |
| Tranquilizantes | 0.4% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 1.0% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | 0.5% |
| Barbitúricos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anfetaminas | 0.4% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
| Tabaco | 32.5% | 18.4% | 35.0% | 34.8% | 13.5% | 30.8% | 25.4% | 22.4% | 34.3% | 28.0% | 34.2% | 42.2% | 44.2% | 34.3% |
| Antidepresivos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Psicotrópicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Pasta Base | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| Metanfetamina / Cristal | 5.8% | 1.1% | 0.6% | 3.8% | 27.3% | 3.5% | 2.4% | 3.6% | 2.3% | 2.3% | 4.6% | 0.8% | 2.9% | 3.7% |
| Flunitracepam | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Crack | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| Refractil ofteno | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 14 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Edad de Inicio | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| 5 a 9 | 7.4% | 5.2% | 8.9% | 8.2% | 2.1% | 7.0% | 6.5% | 9.7% | 13.7% | 8.3% | 8.3% | 10.1% | 7.5% | 7.4% |
| 10 a 14 | 50.5% | 59.2% | 68.2% | 57.1% | 23.3% | 49.7% | 40.1% | 52.0% | 58.9% | 59.8% | 51.7% | 55.6% | 58.4% | 50.1% |
| 15 a 19 | 33.4% | 32.2% | 20.4% | 31.0% | 47.9% | 35.7% | 41.4% | 34.7% | 25.1% | 27.0% | 32.9% | 28.6% | 28.2% | 34.0% |
| 20 a 24 | 5.1% | 2.3% | 2.5% | 2.6% | 15.7% | 2.8% | 6.7% | 2.6% | 1.7% | 3.8% | 4.0% | 3.0% | 3.6% | 4.8% |
| 25 a 29 | 1.8% | 1.1% | 0.0% | 0.6% | 4.4% | 2.8% | 3.0% | 0.0% | 0.6% | 1.0% | 1.8% | 0.8% | 1.5% | 1.9% |
| 30 a 34 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 3.6% | 1.4% | 1.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.8% | 0.2% | 1.0% |
| 35 a 39 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| 40 a 44 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
| 45 a 49 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 50 a 54 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.1% |
| 55 a 59 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 60 a 64 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65 y > | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 15 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Drogas de impacto | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Alcohol | 25.3% | 54.0% | 27.4% | 44.0% | 17.2% | 42.0% | 16.4% | 48.5% | 32.0% | 32.8% | 23.2% | 23.1% | 15.1% | 22.6% |
| Marihuana | 12.8% | 10.3% | 19.1% | 7.9% | 4.9% | 13.3% | 11.2% | 5.1% | 17.7% | 13.5% | 16.5% | 16.0% | 15.6% | 13.7% |
| Inhalantes | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 3.4% | 0.3% | 1.2% | 1.0% | 3.4% | 2.2% |
| Alucinógenos | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.2% | 16.3% |
| Heroína | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 2.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| Opio/Morfina | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Cocaína | 2.9% | 0.6% | 0.6% | 2.4% | 1.4% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 2.9% | 2.8% | 4.4% | 3.0% | 3.2% | 3.6% |
| Tranquilizantes | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.0% | 0.9% | 0.5% | 0.6% | 1.3% | 0.8% | 0.4% | 1.5% | 1.2% |
| Barbitúricos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anfetaminas | 2.2% | 0.6% | 10.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 20.3% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 1.3% | 5.5% | 0.2% | 0.3% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tabaco | 3.9% | 9.2% | 20.4% | 3.3% | 0.6% | 0.0% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 1.0% | 3.0% | 5.7% | 4.5% | 5.5% |
| Antidepresivos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Otros Psicotrópicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| Pasta Base | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 1.5% |
| Metanfetamin a/Cristal | 44.3% | 24.7% | 22.3% | 40.6% | 75.2% | 42.0% | 19.6% | 43.4% | 36.0% | 48.0% | 47.2% | 37.7% | 54.2% | 31.9% |
| Flunitracepam | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Crack | 2.5% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 23.9% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.7% | 5.3% | 1.5% | 0.9% |
| Refractil ofteno | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 16.1 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DONDE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Estado | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Aguascalientes | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Baja California | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Baja California Sur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coahuila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colima | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Chiapas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chihuahua | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ciudad de México | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | 5 |
| Durango | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Guanajuato | 38 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jalisco | 7,260 | 166 | 157 | 767 | 760 | 131 | 411 | 194 | 168 | 327 | 1,236 | 455 | 1,172 | 1,316 |
| México | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Michoacán | 101 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 11 |
| Morelos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 16.2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DONDE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Nayarit | 37 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Nuevo León | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oaxaca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Puebla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Querétaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quintana Roo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis Potosí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sinaloa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Sonora | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Tabasco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamaulipas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tlaxcala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veracruz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yucatán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zacatecas | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Otro País | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 17.1 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Municipio | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Acatic | 21 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Acatlán de Juárez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Ahualulco del Mercado | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amacueca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amatitán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ameca | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| San Juanito de Escobedo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arandas | 239 | 0 | 0 | 217 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Arenal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Atemajac de Brizuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atengo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenguillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atotonilco el Alto | 38 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Atoyac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autlán de Navarro | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 17.2 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Municipio | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Ayotlán | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayutla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barca | 28 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bolaños | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cabo Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casimiro Castillo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cihuatlán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zapotlán El Grande | 226 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 161 | 0 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Cocula | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Colotlán | 128 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Concepción de Buenos Aires | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cuautitlán de García Barragán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cuautla | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cuquío | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chapala | 165 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 17.3 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Municipio | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Chimaltitlán | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chiquilistlán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Degollado | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ejutla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Encarnación de Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Etzatlán | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grullo | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Guachinango | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 1,476 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 20 | 2 | 10 | 27 | 157 | 84 | 233 | 895 |
| Hostotipaquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejúcar | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejuquilla el Alto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Huerta | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 40 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Ixtlahuacán del Río | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jalostotitlán | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 17.4 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Municipio | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Jamay | 35 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús María | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jilotlán de los Dolores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jocotepec | 34 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Juanacatlán | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juchitlán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagos de Moreno | 61 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Limón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Santa María del Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzanilla de la Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mascota | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mazamitla | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexticacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezquitic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mixtlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ocotlán | 283 | 0 | 0 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 17.5 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Municipio | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Ojuelos de Jalisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pihuamo | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poncitlán | 77 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Puerto Vallarta | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 3 | 2 |
| Villa Purificación | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Quitupan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 40 | 10 |
| San Cristóbal de la Barranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego de Alejandría | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan de los Lagos | 154 | 0 | 117 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| San Julián | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marcos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Bolaños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 17.6 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Municipio | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| San Martín de Hidalgo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Miguel el Alto | 20 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gómez Farías | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Sebastián del Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa María de los Ángeles | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayula | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tala | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Talpa de Allende | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tamazula de Gordiano | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tapalpa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tecalitlán | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tecolotlán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Techaluta de Montenegro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 17.7 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Municipio | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Tenamaxtlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teocaltiche | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teocuitatlán de Corona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tepatitlán de Morelos | 409 | 0 | 0 | 375 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Tequila | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Teuchitlán | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tizapán el Alto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 289 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 10 | 185 | 62 |
| San Pedro Tlaquepaque | 558 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | 24 | 427 | 68 |
| Tolimán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tomatlán | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonalá | 462 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 249 | 125 | 58 |
| Tonaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totatiche | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tototlán | 38 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuxcacuesco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 17.8 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Municipio | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Tuxcueca | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxpan | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unión de San Antonio | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unión de Tula | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle de Guadalupe | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Valle de Juárez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Gabriel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Villa Corona | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Villa Guerrero | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Villa Hidalgo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañadas de Obregón | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yahualica de González Gallo | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zacoalco de Torres | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Zapopan | 1,189 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 938 | 26 | 78 | 116 |
| Zapotiltic | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 17.9 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Municipio | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Zapotitlán de Vadillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zapotlán del Rey | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zapotlanejo | 34 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipios de Otros Estados | 443 | 8 | 0 | 14 | 94 | 12 | 53 | 2 | 7 | 73 | 36 | 38 | 50 | 56 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 18 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN USO DE DROGAS INYECTADAS GENERAL Y REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Uso de drogas inyectadas | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Si | 3.1% | 0.0% | 1.3% | 1.4% | 2.0% | 6.3% | 5.4% | 1.5% | 1.1% | 5.3% | 2.3% | 4.1% | 4.0% | 3.6% |
| No | 96.9% | 100% | 98.7% | 98.6% | 98% | 93.7% | 94.6% | 98.5% | 98.9% | 94.8% | 97.7% | 95.9% | 96.0% | 96.4% |

**Cuadro No. 19 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS INYECTADAS
 QUE COMPARTEN JERINGAS Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ha compartido jeringas | 237 | 0 | 2 | 11 | 17 | 9 | 25 | 3 | 2 | 21 | 29 | 20 | 49 | 49 |
| Si | 76.8% | | 50.0% | 100% | 64.7% | 88.9% | 72.0% | 100% | 50.0% | 66.7% | 75.9% | 85.0% | 77.6% | 77.6% |
| No | 23.2% | | 50.0% | 0.0% | 35.3% | 11.1% | 28.0% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 24.1% | 15.0% | 22.4% | 22.4% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 20 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS INYECTADAS
 CON JERINGA SIN USO PREVIO Y REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uso de jeringa nueva en la última dosis | 237 | 0 | 2 | 11 | 17 | 9 | 25 | 3 | 2 | 21 | 29 | 20 | 49 | 49 |
| Si | 32.5% | | 0.0% | 54.5% | 35.3% | 77.8% | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 17.2% | 35.0% | 28.6% | 30.6% |
| No | 67.5% | | 100% | 45.5% | 64.7% | 22.2% | 68.0% | 100% | 100% | 57.1% | 82.8% | 65.0% | 71.4% | 69.4% |

**Cuadro No. 21 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 USAN EN FORMA COMBINADA GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Combina Drogas | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Si | 46.8% | 40.8% | 53.5% | 50.8% | 30.0% | 10.5% | 41.2% | 43.9% | 41.7% | 61.0% | 34.6% | 67.1% | 56.4% | 52.8% |
| No | 53.2% | 59.2% | 46.5% | 49.2% | 70% | 89.5% | 58.8% | 56.1% | 58.3% | 39.0% | 65.4% | 32.9% | 43.6% | 47.2% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 22 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE REPORTAN CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO DE MOTOR BAJO EFECTO DE DROGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Conducción bajo efecto de drogas | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Si | 40.4% | 13.8% | 32.5% | 57.4% | 57.1% | 51.7% | 43.1% | 52.6% | 34.9% | 49.0% | 25.4% | 42.0% | 33.7% | 38.0% |
| No | 59.6% | 86.2% | 67.5% | 42.6% | 42.9% | 48.3% | 56.9% | 47.4% | 65.1% | 51.0% | 74.6% | 58.0% | 66.3% | 62.0% |

Cuadro No. 23 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE PADECER ALGUNA ENFERMEDAD ASOCIADA AL CONSUMO EN GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Padece alguna enfermedad | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Si | 16.5% | 90.8% | 2.5% | 13.1% | 2.8% | 10.5% | 50.9% | 13.8% | 29.1% | 6.5% | 28.0% | 14.4% | 9.2% | 6.5% |
| No | 83.5% | 9.2% | 97.5% | 86.9% | 97.2% | 89.5% | 49.1% | 86.2% | 70.9% | 93.5% | 72.0% | 85.6% | 90.8% | 93.5% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 24 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 LUGAR DONDE CONSIGUE LA DROGA DE MAYOR IMPACTO EN GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| En su propia casa | 12.2% | 10.9% | 3.8% | 12.8% | 25.5% | 11.9% | 6.9% | 9.7% | 8.6% | 11.0% | 11.2% | 7.3% | 11.2% | 11.1% |
| Se la llevan a su casa | 6.2% | 4.0% | 1.9% | 4.7% | 3.7% | 5.6% | 9.9% | 8.2% | 5.7% | 10.0% | 6.9% | 6.9% | 3.9% | 7.9% |
| En casa de un amigo o familiar | 8.9% | 13.8% | 15.3% | 7.0% | 8.8% | 7.7% | 7.5% | 4.6% | 9.1% | 12.8% | 9.5% | 9.1% | 10.1% | 6.9% |
| En la calle | 41.0% | 33.9% | 14.6% | 35.5% | 54.2% | 37.8% | 33.0% | 29.1% | 29.7% | 23.0% | 44.6% | 36.9% | 51.8% | 39.9% |
| En antros y bares | 2.3% | 0.6% | 0.0% | 2.9% | 4.1% | 5.6% | 2.6% | 3.1% | 2.3% | 2.0% | 1.4% | 2.4% | 1.1% | 2.6% |
| En fiestas y reuniones | 6.2% | 24.1% | 5.7% | 14.6% | 0.6% | 1.4% | 3.0% | 6.1% | 10.9% | 18.0% | 5.3% | 5.7% | 4.3% | 2.8% |
| En la escuela | 0.6% | 0.6% | 1.3% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 3.4% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 1.0% | 0.9% |
| En el trabajo | 1.7% | 1.7% | 1.3% | 2.0% | 0.5% | 1.4% | 1.7% | 6.1% | 0.6% | 1.3% | 1.7% | 3.4% | 1.1% | 1.8% |
| En tiendas cercanas a mi casa | 15.6% | 10.3% | 54.1% | 17.3% | 1.5% | 25.2% | 19.2% | 13.8% | 13.1% | 16.8% | 16.2% | 20.1% | 11.0% | 19.4% |
| Parques | 0.4% | 0.0% | 0.6% | 0.4% | 0.0% | 1.4% | 0.9% | 0.0% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| Picaderos | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.6% | 2.1% | 12.7% | 18.9% | 15.4% | 3.8% | 2.1% | 6.7% | 3.8% | 6.0% |
| Otro | 0.4% | 0.0% | 1.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.5% | 0.6% | 1.0% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 25 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 LUGAR DONDE CONSUME LA DROGA DE MAYOR IMPACTO EN GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Donde la consume | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| La tiene en su casa | 35.8% | 27.6% | 36.3% | 60.9% | 26.9% | 39.9% | 29.3% | 34.7% | 21.7% | 30.0% | 35.8% | 33.5% | 29.2% | 39.9% |
| En casa de un amigo o familiar | 16.5% | 14.9% | 15.3% | 9.6% | 14.3% | 15.4% | 18.5% | 6.6% | 24.0% | 18.3% | 20.8% | 13.4% | 20.7% | 15.2% |
| En la vía pública (calles, parques) | 28.4% | 29.9% | 29.9% | 6.7% | 49.1% | 23.8% | 21.3% | 24.5% | 28.6% | 18.3% | 24.4% | 30.0% | 39.6% | 27.2% |
| En antros y bares | 3.5% | 0.0% | 2.5% | 2.9% | 6.1% | 4.9% | 5.0% | 3.1% | 1.1% | 3.8% | 4.2% | 3.7% | 1.4% | 3.9% |
| En fiestas y reuniones | 7.6% | 24.7% | 7.0% | 15.5% | 1.3% | 5.6% | 3.0% | 15.3% | 12.0% | 19.3% | 7.1% | 7.7% | 4.5% | 4.9% |
| En la escuela | 0.9% | 1.1% | 1.9% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 1.0% | 4.0% | 0.8% | 1.3% | 0.6% | 0.9% | 1.1% |
| En el trabajo | 3.8% | 0.6% | 5.1% | 2.9% | 1.4% | 5.6% | 8.0% | 8.7% | 2.9% | 4.3% | 3.9% | 6.5% | 2.1% | 3.9% |
| En picaderos | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 4.2% | 8.2% | 6.1% | 5.7% | 4.0% | 1.8% | 4.1% | 1.5% | 3.1% |
| Otro | 0.8% | 1.1% | 1.9% | 0.4% | 0.0% | 0.7% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.9% | 0.6% | 0.1% | 0.9% |
| No sabe | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 26 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN DROGAS DE MAYOR CONSUMO EN GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Droga de mayor consumo | 7,703 | 174 | 157 | 781 | 854 | 143 | 464 | 196 | 175 | 400 | 1,272 | 493 | 1,222 | 1,372 |
| Alcohol | 72.0% | 0.0% | 90.4% | 87.8% | 42.3% | 86.7% | 62.3% | 91.3% | 86.3% | 90.0% | 80.8% | 87.8% | 64.7% | 73.0% |
| Marihuana | 56.4% | 53.4% | 63.7% | 45.2% | 39.5% | 49.0% | 53.9% | 51.0% | 64.6% | 55.5% | 63.3% | 66.7% | 65.5% | 56.4% |
| Inhalantes | 12.1% | 5.2% | 5.1% | 3.8% | 2.2% | 2.1% | 7.1% | 4.6% | 19.4% | 10.3% | 14.4% | 18.7% | 21.4% | 15.2% |
| Alucinógenos | 6.7% | 2.3% | 2.5% | 2.0% | 0.9% | 0.7% | 1.3% | 3.1% | 6.3% | 6.8% | 1.3% | 8.7% | 4.1% | 23.5% |
| Heroína | 0.8% | 0.0% | 1.9% | 0.8% | 0.6% | 2.8% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 1.2% | 0.9% | 1.0% |
| Opio/Morfina | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.8% | 1.0% | 0.0% | 0.3% |
| Cocaína | 28.1% | 28.2% | 25.5% | 23.3% | 8.2% | 16.1% | 28.2% | 24.5% | 21.1% | 34.5% | 35.8% | 43.2% | 27.1% | 32.7% |
| Tranquilizantes | 7.6% | 1.7% | 7.6% | 6.0% | 1.3% | 1.4% | 4.3% | 5.6% | 13.1% | 9.8% | 6.6% | 14.8% | 9.2% | 10.7% |
| Barbitúricos | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Anfetaminas | 3.5% | 1.1% | 14.0% | 1.5% | 0.0% | 1.4% | 23.7% | 0.0% | 4.6% | 0.3% | 2.1% | 7.5% | 1.9% | 1.7% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
| Tabaco | 61.7% | 71.3% | 83.4% | 69.1% | 21.1% | 59.4% | 46.8% | 71.9% | 74.3% | 72.0% | 67.3% | 79.9% | 68.9% | 60.1% |
| Antidepresivos | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| Otros Psicotrópicos | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 2.8% | 0.1% | 1.6% | 0.7% | 2.0% |
| Pasta Base | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 3.7% | 1.6% | 5.8% |
| Metanfetamina/ Cristal | 54.3% | 40.8% | 28.7% | 53.4% | 78.0% | 58.7% | 25.0% | 57.7% | 46.3% | 60.8% | 61.5% | 51.9% | 63.4% | 38.8% |
| Flunitracepam | 0.4% | 0.6% | 3.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 1.0% | 0.1% |
| Crack | 7.6% | 2.3% | 1.9% | 1.7% | 0.9% | 0.7% | 29.5% | 1.5% | 2.3% | 5.3% | 9.0% | 15.8% | 6.1% | 8.9% |
| Refractil ofténo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 27.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL ALCOHOL ES LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALCOHOL | 1,950 | 94 | 43 | 344 | 147 | 60 | 76 | 95 | 56 | 131 | 295 | 114 | 185 | 310 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 81.3% | 100% | 95.3% | 64.8% | 93.2% | 83.3% | 81.6% | 78.9% | 76.8% | 62.6% | 88.8% | 68.4% | 86.5% | 90.0% |
| Menor efecto que antes | 64.7% | 81.9% | 48.8% | 44.8% | 83.0% | 61.7% | 63.2% | 63.2% | 42.9% | 19.1% | 74.6% | 65.8% | 78.4% | 81.9% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 65.3% | 86.2% | 46.5% | 58.4% | 82.3% | 58.3% | 53.9% | 58.9% | 42.9% | 21.4% | 73.2% | 60.5% | 72.4% | 80.0% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 68.1% | 70.2% | 88.4% | 61.6% | 92.5% | 60.0% | 64.5% | 54.7% | 51.8% | 29.8% | 77.3% | 63.2% | 67.6% | 79.4% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 53.2% | 79.8% | 44.2% | 38.4% | 79.6% | 38.3% | 53.9% | 46.3% | 17.9% | 7.6% | 60.3% | 49.1% | 59.5% | 71.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 27.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL ALCOHOL ES LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALCOHOL | 1,950 | 94 | 43 | 344 | 147 | 60 | 76 | 95 | 56 | 131 | 295 | 114 | 185 | 310 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 78.8% | 91.5% | 90.7% | 77.6% | 96.6% | 71.7% | 81.6% | 62.1% | 85.7% | 45.0% | 85.8% | 80.7% | 76.8% | 79.0% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 62.2% | 78.7% | 44.2% | 50.0% | 84.4% | 61.7% | 69.7% | 51.6% | 46.4% | 20.6% | 71.9% | 63.2% | 65.4% | 73.2% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 68.1% | 69.1% | 93.0% | 59.9% | 93.2% | 55.0% | 67.1% | 50.5% | 57.1% | 30.5% | 73.9% | 60.5% | 73.0% | 81.6% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 57.3% | 61.7% | 48.8% | 44.2% | 80.3% | 66.7% | 63.2% | 60.0% | 17.9% | 13.0% | 65.4% | 47.4% | 63.8% | 74.5% |



**Cuadro No. 27.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL ALCOHOL ES LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALCOHOL | 1,950 | 94 | 43 | 344 | 147 | 60 | 76 | 95 | 56 | 131 | 295 | 114 | 185 | 310 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 59.2% | 91.5% | 88.4% | 44.8% | 91.2% | 48.3% | 65.8% | 32.6% | 50.0% | 27.5% | 66.8% | 48.2% | 57.3% | 67.7% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 64.6% | 92.6% | 46.5% | 63.7% | 81.6% | 58.3% | 51.3% | 45.3% | 48.2% | 16.8% | 74.9% | 58.8% | 60.5% | 79.7% |
| Descuido de actividades | 67.5% | 92.6% | 48.8% | 66.0% | 85.7% | 63.3% | 57.9% | 51.6% | 39.3% | 16.8% | 80.7% | 57.0% | 67.6% | 81.3% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 58.4% | 90.4% | 81.4% | 61.0% | 51.7% | 56.7% | 44.7% | 46.3% | 33.9% | 29.0% | 71.2% | 50.9% | 54.1% | 62.9% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 58.2% | 92.6% | 79.1% | 58.7% | 40.1% | 41.7% | 44.7% | 42.1% | 39.3% | 25.2% | 73.2% | 59.6% | 58.9% | 66.5% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 72.2% | 92.6% | 95.3% | 77.3% | 52.4% | 65.0% | 65.8% | 57.9% | 66.1% | 31.3% | 86.1% | 70.2% | 68.6% | 81.6% |
| Continua usando a pesar de esos problemas | 71.4% | 92.6% | 90.7% | 76.7% | 42.9% | 68.3% | 65.8% | 58.9% | 60.7% | 32.8% | 86.8% | 72.8% | 65.9% | 81.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 28 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CUANDO LA *DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL* GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Edad de Inicio | 1,950 | 94 | 43 | 344 | 147 | 60 | 76 | 95 | 56 | 131 | 295 | 114 | 185 | 310 |
| 5 a 9 | 4.7% | 6.4% | 4.7% | 4.9% | 2.0% | 5.0% | 2.6% | 7.4% | 5.4% | 5.3% | 4.1% | 6.1% | 4.9% | 4.2% |
| 10 a 14 | 44.4% | 58.5% | 69.8% | 56.4% | 16.3% | 35.0% | 19.7% | 46.3% | 57.1% | 59.5% | 42.0% | 41.2% | 37.8% | 42.3% |
| 15 a 19 | 37.9% | 33.0% | 16.3% | 32.6% | 38.1% | 45.0% | 53.9% | 43.2% | 33.9% | 25.2% | 40.3% | 44.7% | 40.0% | 41.6% |
| 20 a 24 | 7.3% | 1.1% | 4.7% | 3.8% | 23.8% | 3.3% | 11.8% | 2.1% | 1.8% | 6.1% | 8.5% | 4.4% | 10.8% | 6.5% |
| 25 a 29 | 3.2% | 1.1% | | 1.2% | 10.2% | 5.0% | 6.6% | | | 2.3% | 3.7% | 1.8% | 4.9% | 3.2% |
| 30 a 34 | 1.3% | | | 0.3% | 6.1% | 1.7% | 3.9% | 1.1% | 1.8% | 0.8% | 0.3% | 0.9% | 0.5% | 1.6% |
| 35 a 39 | 0.5% | | 4.7% | | 0.7% | 3.3% | | | | | 0.7% | | 0.5% | 0.3% |
| 40 a 44 | 0.3% | | | 0.6% | 1.4% | 1.7% | | | | | 0.3% | | | |
| 45 a 49 | 0.2% | | | | 0.7% | | 1.3% | | | 0.8% | | | | 0.3% |
| 50 a 54 | 0.2% | | | 0.3% | 0.7% | | | | | | | 0.9% | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | 0.1% | | | | | | | | | | | | 0.5% | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 29.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA MARIHUANA ES LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| MARIHUANA | 986 | 18 | 30 | 62 | 42 | 19 | 52 | 10 | 31 | 54 | 210 | 79 | 191 | 188 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 75.3% | 88.9% | 80.0% | 46.8% | 81.0% | 73.7% | 63.5% | 60.0% | 71.0% | 64.8% | 84.3% | 78.5% | 71.7% | 81.4% |
| Menor efecto que antes | 67.1% | 83.3% | 53.3% | 46.8% | 69.0% | 63.2% | 59.6% | 30.0% | 58.1% | 33.3% | 74.3% | 68.4% | 65.4% | 83.0% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 65.0% | 88.9% | 56.7% | 56.5% | 61.9% | 47.4% | 55.8% | 30.0% | 51.6% | 31.5% | 71.9% | 67.1% | 63.9% | 78.2% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 65.4% | 77.8% | 80.0% | 58.1% | 76.2% | 36.8% | 51.9% | 20.0% | 67.7% | 44.4% | 77.1% | 62.0% | 57.1% | 73.4% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 52.3% | 77.8% | 43.3% | 32.3% | 59.5% | 26.3% | 53.8% | 20.0% | 41.9% | 22.2% | 61.0% | 49.4% | 48.2% | 66.5% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 29.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA MARIHUANA ES LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| MARIHUANA | 986 | 18 | 30 | 62 | 42 | 19 | 52 | 10 | 31 | 54 | 210 | 79 | 191 | 188 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 78.5% | 83.3% | 90.0% | 62.9% | 78.6% | 52.6% | 76.9% | 70.0% | 87.1% | 59.3% | 87.1% | 77.2% | 75.4% | 83.0% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 63.5% | 94.4% | 60.0% | 45.2% | 66.7% | 26.3% | 75.0% | 50.0% | 54.8% | 25.9% | 72.4% | 50.6% | 62.8% | 76.1% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 61.3% | 72.2% | 76.7% | 33.9% | 76.2% | 26.3% | 63.5% | 20.0% | 61.3% | 44.4% | 69.0% | 57.0% | 54.5% | 73.4% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 55.5% | 77.8% | 46.7% | 30.6% | 59.5% | 31.6% | 40.4% | 30.0% | 54.8% | 27.8% | 65.7% | 54.4% | 51.8% | 70.7% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 29.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA MARIHUANA ES LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| MARIHUANA | 986 | 18 | 30 | 62 | 42 | 19 | 52 | 10 | 31 | 54 | 210 | 79 | 191 | 188 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 56.3% | 88.9% | 76.7% | 29.0% | 73.8% | 15.8% | 51.9% | 30.0% | 54.8% | 37.0% | 64.3% | 50.6% | 49.7% | 67.6% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 54.7% | 83.3% | 46.7% | 43.5% | 59.5% | 15.8% | 57.7% | 20.0% | 48.4% | 20.4% | 64.8% | 53.2% | 51.3% | 64.4% |
| Descuido de actividades | 63.9% | 83.3% | 63.3% | 48.4% | 59.5% | 26.3% | 61.5% | 30.0% | 54.8% | 27.8% | 72.4% | 69.6% | 61.3% | 77.1% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 47.9% | 83.3% | 66.7% | 29.0% | 52.4% | 36.8% | 42.3% | 40.0% | 35.5% | 25.9% | 59.5% | 45.6% | 42.4% | 51.6% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 50.4% | 77.8% | 66.7% | 29.0% | 42.9% | 10.5% | 44.2% | 40.0% | 35.5% | 24.1% | 61.4% | 60.8% | 42.9% | 61.2% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 69.0% | 77.8% | 83.3% | 64.5% | 59.5% | 26.3% | 61.5% | 70.0% | 61.3% | 42.6% | 82.4% | 74.7% | 60.2% | 76.1% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 69.0% | 77.8% | 86.7% | 62.9% | 50.0% | 31.6% | 57.7% | 70.0% | 58.1% | 40.7% | 82.4% | 74.7% | 60.7% | 79.3% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 30 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Edad de Inicio | 986 | 18 | 30 | 62 | 42 | 19 | 52 | 10 | 31 | 54 | 210 | 79 | 191 | 188 |
| 5 a 9 | 1.3% | | 3.3% | 4.8% | 2.4% | | | | 6.5% | 1.9% | | | 1.0% | 1.6% |
| 10 a 14 | 51.1% | 44.4% | 53.3% | 48.4% | 33.3% | 57.9% | 53.8% | 50.0% | 67.7% | 55.6% | 45.7% | 44.3% | 53.9% | 56.9% |
| 15 a 19 | 41.2% | 38.9% | 36.7% | 38.7% | 54.8% | 36.8% | 34.6% | 50.0% | 22.6% | 40.7% | 48.1% | 46.8% | 38.7% | 37.2% |
| 20 a 24 | 4.1% | 11.1% | 6.7% | 4.8% | 2.4% | | 11.5% | | 3.2% | | 3.3% | 1.3% | 4.7% | 4.3% |
| 25 a 29 | 0.9% | | | 1.6% | 2.4% | 5.3% | | | | | 1.0% | 2.5% | 1.0% | |
| 30 a 34 | 0.7% | 5.6% | | | 2.4% | | | | | 1.9% | 1.4% | 1.3% | | |
| 35 a 39 | 0.1% | | | | 2.4% | | | | | | | | | |
| 40 a 44 | 0.2% | | | | | | | | | | 0.5% | | 0.5% | |
| 45 a 49 | 0.3% | | | | | | | | | | | 3.8% | | |
| 50 a 54 | 0.1% | | | 1.6% | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 31.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LOS INHALANTES SON LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGION SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| INHALANTES | 107 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 15 | 5 | 42 | 30 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 76.6% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 66.7% | | 73.3% | 100% | 83.3% | 73.3% |
| Menor efecto que antes | 71.0% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 33.3% | | 60.0% | 80.0% | 81.0% | 73.3% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 73.8% | | | 50.0% | | | 83.3% | | 50.0% | | 73.3% | 80.0% | 83.3% | 66.7% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 69.2% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 66.7% | 100% | 60.0% | 40.0% | 71.4% | 76.7% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 60.7% | | | | | | 66.7% | | 33.3% | | 53.3% | 40.0% | 66.7% | 70.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 31.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LOS INHALANTES SON LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGION SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| INHALANTES | 107 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 15 | 5 | 42 | 30 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 75.7% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 66.7% | 100% | 53.3% | 60.0% | 83.3% | 83.3% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 66.4% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 33.3% | | 46.7% | 40.0% | 78.6% | 73.3% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 76.6% | | | 100% | | | 66.7% | | 66.7% | 100% | 60.0% | 80.0% | 76.2% | 86.7% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 64.5% | | | | | | 66.7% | | 50.0% | | 40.0% | 80.0% | 71.4% | 73.3% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 31.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LOS INHALANTES SON LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| INHALANTES | 107 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 15 | 5 | 42 | 30 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 53.3% | | | | | | 50.0% | | 66.7% | | 33.3% | 40.0% | 61.9% | 56.7% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 58.9% | | | | | | 66.7% | | 33.3% | 100% | 73.3% | 40.0% | 64.3% | 53.3% |
| Descuido de actividades | 72.0% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 50.0% | | 66.7% | 80.0% | 76.2% | 76.7% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 54.2% | | | | | | 50.0% | | 50.0% | 100% | 53.3% | 40.0% | 64.3% | 46.7% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 61.7% | | | | | | 66.7% | | 33.3% | 100% | 60.0% | 40.0% | 73.8% | 56.7% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 79.4% | | | 50.0% | | | 50.0% | | 83.3% | 100% | 73.3% | 80.0% | 85.7% | 80.0% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 80.4% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 83.3% | 100% | 73.3% | 80.0% | 85.7% | 80.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 32 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|---------|
| Edad de Inicio | 107 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 15 | 5 | 42 | 30 |
| 5 a 9 | 37% | | | | | | | | 50.0% | | | | | 3.3% |
| 10 a 14 | 36.4% | | | 50.0% | | | 16.7% | | 50.0% | | 46.7% | 20.0% | 38.1% | 33.3% |
| 15 a 19 | 43.0% | | | 50.0% | | | 50.0% | | | 100.0% | 40.0% | 80.0% | 42.9% | 43.3% |
| 20 a 24 | 10.3% | | | | | | 16.7% | | | | 13.3% | | 11.9% | 10.0% |
| 25 a 29 | 0.9% | | | | | | | | | | | | 2.4% | |
| 30 a 34 | 2.8% | | | | | | 16.7% | | | | | | 2.4% | 3.3% |
| 35 a 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 a 44 | 1.9% | | | | | | | | | | | | 2.4% | 3.3% |
| 45 a 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 a 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | 0.9% | | | | | | | | | | | | | 3.3% |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 33.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA COCAÍNA ES LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| COCAÍNA | 225 | 1 | 1 | 19 | 12 | - | 17 | - | 5 | 11 | 56 | 15 | 39 | 49 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 76.9% | 100% | 100% | 63.2% | 83.3% | | 52.9% | | 100% | 81.8% | 78.6% | 66.7% | 74.4% | 87.8% |
| Menor efecto que antes | 74.7% | 100% | | 63.2% | 75.0% | | 47.1% | | 80.0% | 63.6% | 76.8% | 73.3% | 89.7% | 77.6% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 71.6% | 100% | | 57.9% | 75.0% | | 47.1% | | 80.0% | 54.5% | 76.8% | 73.3% | 74.4% | 79.6% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 72.4% | 100% | 100% | 68.4% | 75.0% | | 58.8% | | 100% | 72.7% | 69.6% | 73.3% | 69.2% | 79.6% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 60.4% | 100% | | 42.1% | 66.7% | | 47.1% | | 20% | 36.4% | 73.2% | 66.7% | 53.8% | 69.4% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 33.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO *LA COCAÍNA ES LA DROGA DE IMPACTO*
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| COCAÍNA | 225 | 1 | 1 | 19 | 12 | - | 17 | - | 5 | 11 | 56 | 15 | 39 | 49 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 83.1% | 100% | 100% | 78.9% | 91.7% | | 76.5% | | 100% | 90.9% | 85.7% | 86.7% | 71.8% | 85.7% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 67.1% | 100% | | 57.9% | 75.0% | | 47.1% | | 20.0% | 45.5% | 75.0% | 73.3% | 51.3% | 87.8% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 73.3% | 100% | 100% | 57.9% | 83.3% | | 52.9% | | 80.0% | 72.7% | 76.8% | 66.7% | 66.7% | 85.7% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 63.1% | 100% | | 47.4% | 75.0% | | 64.7% | | 80.0% | 36.4% | 78.6% | 53.3% | 46.2% | 69.4% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 33.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA COCAÍNA ES LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| COCAÍNA | 225 | 1 | 1 | 19 | 12 | - | 17 | - | 5 | 11 | 56 | 15 | 39 | 49 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 57.8% | 100% | 100% | 42.1% | 75.0% | | 47.1% | | 40.0% | 63.6% | 60.7% | 46.7% | 51.3% | 67.3% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 61.8% | 100% | | 52.6% | 66.7% | | 47.1% | | 80.0% | 45.5% | 69.6% | 53.3% | 51.3% | 73.5% |
| Descuido de actividades | 70.2% | 100% | | 47.4% | 75.0% | | 47.1% | | 80.0% | 54.5% | 82.1% | 80.0% | 59.0% | 81.6% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 59.1% | 100% | 100% | 52.6% | 75.0% | | 29.4% | | 40.0% | 72.7% | 73.2% | 60.0% | 43.6% | 61.2% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 58.7% | 100% | 100% | 63.2% | 66.7% | | 23.5% | | 40.0% | 72.7% | 66.1% | 73.3% | 48.7% | 59.2% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 73.8% | 100% | 100% | 73.7% | 83.3% | | 52.9% | | 40.0% | 90.9% | 89.3% | 80.0% | 61.5% | 67.3% |
| Continua usando a pesar de esos problemas | 72.4% | 100% | 100% | 68.4% | 66.7% | | 58.8% | | 60.0% | 81.8% | 83.9% | 80.0% | 69.2% | 65.3% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 34 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Edad de Inicio | 225 | 1 | 1 | 19 | 12 | - | 17 | - | 5 | 11 | 56 | 15 | 39 | 49 |
| 5 a 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 a 14 | 16.0% | | 100% | 10.5% | 8.3% | | 17.6% | | 60.0% | 18.2% | 19.6% | 26.7% | 10.3% | 10.2% |
| 15 a 19 | 48.9% | 100% | | 73.7% | 58.3% | | 41.2% | | 40.0% | 45.5% | 46.4% | 46.7% | 53.8% | 40.8% |
| 20 a 24 | 17.3% | | | 10.5% | 16.7% | | 29.4% | | | 9.1% | 19.6% | 6.7% | 15.4% | 22.4% |
| 25 a 29 | 8.9% | | | | 16.7% | | 5.9% | | | | 8.9% | 13.3% | 5.1% | 16.3% |
| 30 a 34 | 4.0% | | | 5.3% | | | | | | | 3.6% | | 7.7% | 6.1% |
| 35 a 39 | 1.3% | | | | | | | | | 9.1% | 1.8% | | 2.6% | |
| 40 a 44 | 2.2% | | | | | | 5.9% | | | 9.1% | | 6.7% | | 4.1% |
| 45 a 49 | 1.3% | | | | | | | | | 9.1% | | | 5.1% | |
| 50 a 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 35.1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL TABACO ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| TABACO | 299 | 16 | 32 | 26 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 4 | 38 | 28 | 55 | 75 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 83.3% | 93.8% | 93.8% | 80.8% | 20.0% | | 100% | 80.0% | 80.0% | 50.0% | 81.6% | 75.0% | 83.6% | 85.3% |
| Menor efecto que antes | 72.9% | 100% | 43.8% | 69.2% | 20.0% | | 100% | 80.0% | 20.0% | | 65.8% | 71.4% | 80.0% | 86.7% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 71.6% | 100% | 43.8% | 65.4% | 20.0% | | 90.0% | 80.0% | 20.0% | | 65.8% | 71.4% | 81.8% | 82.7% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 76.3% | 100% | 96.9% | 65.4% | 60.0% | | 90.0% | 80.0% | 60.0% | 75.0% | 71.1% | 67.9% | 56.4% | 86.7% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 57.9% | 93.8% | 43.8% | 46.2% | 20.0% | | 80.0% | 80.0% | | | 47.4% | 42.9% | 50.9% | 81.3% |



Cuadro No. 35.2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL TABACO ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| TABACO | 299 | 16 | 32 | 26 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 4 | 38 | 28 | 55 | 75 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 78.6% | 93.8% | 93.8% | 65.4% | 20.0% | | 90.0% | 80.0% | 80.0% | 50.0% | 81.6% | 57.1% | 69.1% | 90.7% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 62.5% | 93.8% | 43.8% | 57.7% | | | 90.0% | 80.0% | 20.0% | 25.0% | 76.3% | 39.3% | 56.4% | 76.0% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 67.2% | 93.8% | 93.8% | 50.0% | 20.0% | | 80.0% | 80.0% | 60.0% | 50.0% | 60.5% | 32.1% | 63.6% | 77.3% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 56.2% | 100% | 43.8% | 46.2% | 20.0% | | 80.0% | 80.0% | | | 50.0% | 28.6% | 56.4% | 73.3% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 35.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL TABACO ES LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TABACO | 299 | 16 | 32 | 26 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 4 | 38 | 28 | 55 | 75 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 59.2% | 93.8% | 93.8% | 42.3% | 20.0% | | 50.0% | 80.0% | 20.0% | 50.0% | 47.4% | 28.6% | 50.9% | 72.0% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 53.5% | 93.8% | 40.6% | 50.0% | 20.0% | | 80.0% | 80.0% | 20.0% | | 47.4% | 28.6% | 45.5% | 72.0% |
| Descuido de actividades | 53.2% | 93.8% | 40.6% | 42.3% | | | 70.0% | 80.0% | | | 57.9% | 32.1% | 45.5% | 70.7% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 59.2% | 87.5% | 87.5% | 42.3% | 20.0% | | 50.0% | 80.0% | 40.0% | 50.0% | 52.6% | 32.1% | 43.6% | 76.0% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 64.2% | 93.8% | 87.5% | 50.0% | 20.0% | | 70.0% | 80.0% | 40.0% | 50.0% | 52.6% | 50.0% | 47.3% | 80.0% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 65.2% | 93.8% | 96.9% | 50.0% | 40.0% | | 70.0% | 80.0% | 60.0% | 50.0% | 60.5% | 35.7% | 47.3% | 78.7% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 69.9% | 93.8% | 96.9% | 50.0% | 40.0% | | 90.0% | 80.0% | 60.0% | 50.0% | 71.1% | 42.9% | 54.5% | 81.3% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 36 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Edad de Inicio | 299 | 16 | 32 | 26 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 4 | 38 | 28 | 55 | 75 |
| 5 a 9 | 6.7% | 6.3% | 6.3% | 7.7% | 20.0% | | 30.0% | | | | 5.3% | | 5.5% | 8.0% |
| 10 a 14 | 53.5% | 56.3% | 65.6% | 69.2% | 60.0% | | 30.0% | 60.0% | 60.0% | 25.0% | 47.4% | 75.0% | 45.5% | 46.7% |
| 15 a 19 | 27.1% | 31.3% | 21.9% | 15.4% | 20.0% | | 30.0% | 40.0% | 20.0% | 25.0% | 31.6% | 17.9% | 29.1% | 32.0% |
| 20 a 24 | 7.0% | 6.3% | 6.3% | 3.8% | | | | | 20.0% | 25.0% | 2.6% | 3.6% | 12.7% | 8.0% |
| 25 a 29 | 1.3% | | | | | | | | | | 2.6% | | 3.6% | 1.3% |
| 30 a 34 | 1.3% | | | 3.8% | | | 10.0% | | | | | 3.6% | | 1.3% |
| 35 a 39 | 1.3% | | | | | | | | | | 5.3% | | 1.8% | 1.3% |
| 40 a 44 | 0.3% | | | | | | | | | | 2.6% | | | |
| 45 a 49 | 1.0% | | | | | | | | | 25.0% | 2.6% | | | 1.3% |
| 50 a 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | 0.3% | | | | | | | | | | | | 1.8% | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 37.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LAS METANFETAMINAS SON LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| METANFETAMINAS | 3,413 | 43 | 35 | 317 | 642 | 60 | 91 | 85 | 63 | 192 | 600 | 186 | 662 | 437 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 84.0% | 95.3% | 74.3% | 59.9% | 96.9% | 90.0% | 72.5% | 85.9% | 76.2% | 90.1% | 85.7% | 80.1% | 82.2% | 84.2% |
| Menor efecto que antes | 74.0% | 97.7% | 34.3% | 43.2% | 84.1% | 63.3% | 45.1% | 70.6% | 38.1% | 54.7% | 78.8% | 80.6% | 79.5% | 86.3% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 73.5% | 93.0% | 28.6% | 52.7% | 84.4% | 61.7% | 38.5% | 71.8% | 31.7% | 57.3% | 76.8% | 76.3% | 79.0% | 82.8% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 79.5% | 95.3% | 74.3% | 79.2% | 93.5% | 70.0% | 64.8% | 77.6% | 79.4% | 85.4% | 77.5% | 66.7% | 73.1% | 78.0% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 62.2% | 93.0% | 28.6% | 34.4% | 80.4% | 45.0% | 44.0% | 69.4% | 20.6% | 41.1% | 67.5% | 55.4% | 63.6% | 69.1% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 37.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LAS METANFETAMINAS SON LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| METANFETAMINAS | 3,413 | 43 | 35 | 317 | 642 | 60 | 91 | 85 | 63 | 192 | 600 | 186 | 662 | 437 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 84.7% | 97.7% | 88.6% | 83.3% | 96.3% | 53.3% | 82.4% | 81.2% | 82.5% | 90.1% | 84.3% | 82.3% | 77.9% | 82.6% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 70.1% | 93.0% | 37.1% | 37.5% | 82.9% | 45.0% | 72.5% | 67.1% | 30.2% | 48.4% | 76.5% | 70.4% | 74.2% | 79.4% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 82.2% | 95.3% | 82.9% | 77.0% | 95.3% | 53.3% | 51.6% | 65.9% | 63.5% | 86.5% | 82.3% | 79.0% | 81.3% | 82.4% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 72.0% | 93.0% | 31.4% | 59.9% | 81.3% | 75.0% | 73.6% | 78.8% | 36.5% | 47.4% | 71.8% | 64.0% | 76.0% | 79.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 37.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LAS METANFETAMINAS SON LA DROGA DE IMPACTO
 GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| METANFETAMINAS | 3,413 | 43 | 35 | 317 | 642 | 60 | 91 | 85 | 63 | 192 | 600 | 186 | 662 | 437 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 65.6% | 93.0% | 65.7% | 27.8% | 91.9% | 53.3% | 42.9% | 47.1% | 60.3% | 66.1% | 70.2% | 51.1% | 63.0% | 65.9% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 67.7% | 97.7% | 22.9% | 56.8% | 81.8% | 58.3% | 50.5% | 58.8% | 34.9% | 45.3% | 69.8% | 59.7% | 68.6% | 75.7% |
| Descuido de actividades | 73.6% | 93.0% | 42.9% | 55.5% | 84.7% | 55.0% | 51.6% | 63.5% | 23.8% | 57.3% | 78.7% | 71.0% | 74.5% | 87.0% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 55.3% | 90.7% | 74.3% | 42.3% | 72.7% | 28.3% | 37.4% | 49.4% | 41.3% | 57.8% | 60.2% | 48.4% | 45.2% | 55.6% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 59.4% | 88.4% | 74.3% | 52.7% | 62.3% | 23.3% | 45.1% | 51.8% | 30.2% | 59.4% | 62.0% | 54.3% | 63.9% | 61.8% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 80.6% | 83.7% | 91.4% | 83.9% | 78.0% | 73.3% | 64.8% | 84.7% | 81.0% | 92.2% | 78.5% | 84.4% | 78.5% | 83.3% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 79.2% | 83.7% | 91.4% | 84.5% | 68.1% | 75.0% | 75.8% | 84.7% | 79.4% | 89.1% | 81.2% | 83.3% | 77.2% | 84.4% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 38 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Edad de Inicio | 3,413 | 43 | 35 | 317 | 642 | 60 | 91 | 85 | 63 | 192 | 600 | 186 | 662 | 437 |
| 5 a 9 | 0.1% | | | | 0.2% | | | | | 0.5% | 0.5% | | | |
| 10 a 14 | 11.4% | 14.0% | 8.6% | 12.9% | 6.7% | 10.0% | 15.4% | 14.1% | 36.5% | 8.3% | 13.0% | 11.8% | 12.5% | 9.6% |
| 15 a 19 | 45.7% | 44.2% | 42.9% | 45.1% | 55.5% | 46.7% | 45.1% | 47.1% | 44.4% | 41.1% | 42.3% | 38.7% | 46.2% | 41.0% |
| 20 a 24 | 19.2% | 18.6% | 25.7% | 19.6% | 20.9% | 26.7% | 14.3% | 9.4% | 11.1% | 21.4% | 18.3% | 19.4% | 18.4% | 20.4% |
| 25 a 29 | 9.9% | 7.0% | 5.7% | 11.0% | 6.4% | 11.7% | 8.8% | 12.9% | 6.3% | 14.6% | 10.3% | 14.5% | 9.8% | 10.5% |
| 30 a 34 | 5.9% | 4.7% | 8.6% | 5.7% | 5.1% | 3.3% | 6.6% | 8.2% | | 7.3% | 7.2% | 5.9% | 4.8% | 7.3% |
| 35 a 39 | 3.5% | 9.3% | 2.9% | 2.5% | 1.9% | | 5.5% | 2.4% | 1.6% | 3.6% | 4.3% | 3.8% | 4.1% | 4.8% |
| 40 a 44 | 2.6% | | 5.7% | 2.2% | 2.3% | 1.7% | 1.1% | 4.7% | | 2.1% | 2.8% | 3.8% | 2.4% | 3.4% |
| 45 a 49 | 1.0% | 2.3% | | 0.9% | 0.5% | | 2.2% | 1.2% | | | 0.5% | 1.6% | 1.2% | 2.1% |
| 50 a 54 | 0.4% | | | | 0.3% | | 1.1% | | | 1.0% | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 0.7% |
| 55 a 59 | 0.1% | | | | 0.2% | | | | | | 0.2% | | | 0.2% |
| 60 a 64 | 0.0% | | | | | | | | | | | | 0.2% | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SEXO MASCULINO Y POR REGIÓN SANITARIA

Cuadro número 39: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR USO DE DROGAS SEGÚN ANONIMATO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Anónimo | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Si | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 10.1% | 0.0% | 44.8% | 21.2% |
| No | 87.0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.3% | 100% | 89.9% | 100% | 55.2% | 78.8% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 40: PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR USO DE DROGAS
 SEGÚN EDAD EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGION SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Edad Actual | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| 5 a 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 a 14 | 5.6% | 16.0% | 25.0% | 10.3% | 0.3% | 3.1% | 0.7% | 7.6% | 25.3% | 7.2% | 6.3% | 2.0% | 4.5% | 4.1% |
| 15 a 19 | 20.3% | 23.7% | 25.0% | 20.3% | 16.3% | 16.3% | 9.3% | 14.0% | 41.1% | 25.3% | 22.1% | 24.1% | 24.8% | 16.6% |
| 20 a 24 | 19.7% | 13.7% | 11.6% | 15.5% | 27.1% | 17.8% | 21.1% | 14.6% | 13.0% | 16.0% | 19.1% | 17.3% | 22.3% | 19.8% |
| 25 a 29 | 15.0% | 14.5% | 10.7% | 15.8% | 15.9% | 14.7% | 18.8% | 15.8% | 5.5% | 15.0% | 14.7% | 16.1% | 13.9% | 14.9% |
| 30 a 34 | 11.1% | 3.8% | 8.0% | 8.7% | 13.9% | 14.7% | 17.8% | 12.3% | 3.4% | 11.9% | 10.5% | 12.6% | 10.0% | 10.4% |
| 35 a 39 | 9.3% | 9.2% | 8.9% | 8.4% | 9.0% | 10.1% | 10.9% | 12.3% | 3.4% | 10.6% | 8.5% | 9.5% | 8.3% | 10.9% |
| 40 a 44 | 6.4% | 9.2% | 5.4% | 7.1% | 6.0% | 8.5% | 5.3% | 7.0% | 2.7% | 4.1% | 5.4% | 6.8% | 7.1% | 7.1% |
| 45 a 49 | 5.5% | 2.3% | 0.9% | 4.9% | 5.8% | 3.9% | 8.6% | 6.4% | 4.1% | 5.1% | 5.6% | 4.8% | 4.3% | 6.9% |
| 50 a 54 | 3.5% | 3.8% | 2.7% | 5.0% | 3.2% | 3.1% | 4.2% | 5.3% | 0.0% | 3.8% | 2.9% | 4.0% | 2.1% | 4.5% |
| 55 a 59 | 1.8% | 0.8% | 0.0% | 2.5% | 2.0% | 3.1% | 1.9% | 2.9% | 0.0% | 0.7% | 2.0% | 1.0% | 1.6% | 2.1% |
| 60 a 64 | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 0.3% | 1.6% | 0.7% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 1.4% | 0.8% | 0.5% | 1.5% |
| 65 a > | 0.9% | 2.3% | 0.9% | 0.5% | 0.4% | 3.1% | 0.9% | 1.2% | 0.7% | 0.0% | 1.1% | 1.0% | 0.4% | 1.4% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 41.1: DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Estado. | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colima | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chihuahua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalisco | 6,609 | 125 | 112 | 632 | 787 | 124 | 432 | 171 | 146 | 288 | 1,117 | 398 | 1,119 | 1,158 |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michoacán | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nayarit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 41.2: DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veracruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacatecas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro País | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 42.1: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Residencia Municipio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Acatic | 39 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Acatlán de Juárez | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Ahualulco del Mercado | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Amacueca | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Amatitán | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| Ameca | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 86 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| San Juanito de Escobedo | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Arandas | 167 | 0 | 0 | 148 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Arenal | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Atemajac de Brizuela | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Atengo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Atenguillo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Atotonilco el Alto | 34 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Atoyac | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Autlán de Navarro | 151 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 109 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Ayotlán | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayutla | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Barca | 26 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 42.2: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Bolaños | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cabo Corrientes | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Casimiro Castillo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cihuatlán | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zapotlán El Grande | 211 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 149 | 0 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Cocula | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Colotlán | 97 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Concepción de Buenos Aires | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cuautitlán de García Barragán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cuautla | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cuquío | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chapala | 160 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 |
| Chimaltitlán | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chiquilistlán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Degollado | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ejutla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Encarnación de Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Etzatlán | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 42.3: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Grullo | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Guachinango | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 1,266 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 19 | 2 | 10 | 21 | 115 | 70 | 215 | 770 |
| Hostotipaquillo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejúcar | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejuquilla el Alto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Huerta | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 37 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| Ixtlahuacán del Río | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jalostotitlán | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jamay | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jesús María | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jilotlán de los Dolores | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jocotepec | 32 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Juanacatlán | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juchitlán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lagos de Moreno | 47 | 0 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Limón | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 42.4: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Magdalena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa María del Oro | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Manzanilla de la Paz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mascota | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mazamitla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexticacán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mezquitic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mixtlán | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ocotlán | 258 | 0 | 0 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Ojuelos de Jalisco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pihuamo | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poncitlán | 62 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Puerto Vallarta | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60 | 0 | 3 | 1 |
| Villa Purificación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quitupan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Salto | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 39 | 13 |
| San Cristóbal de la Barranca | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 42.5: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| San Diego de Alejandría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan de los Lagos | 122 | 0 | 87 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| San Julián | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marcos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| San Martín de Bolaños | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Hidalgo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Miguel el Alto | 19 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Gómez Farías | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Sebastián del Oeste | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa María de los Ángeles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sayula | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tala | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Talpa de Allende | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamazula de Gordiano | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapalpa | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 42.6: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Tecalitlán | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tecolotlán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Techaluta de Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenamaxtlán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Teocaltiche | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teocuitatlán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tepatitlán de Morelos | 368 | 0 | 0 | 330 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Tequila | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Teuchitlán | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tizapán el Alto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 238 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 6 | 155 | 48 |
| San Pedro Tlaquepaque | 527 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 17 | 425 | 52 |
| Tolimán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomatlán | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonalá | 399 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 206 | 105 | 60 |
| Tonaya | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tonila | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totatiche | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tototlán | 34 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuxcacuesco | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tuxcueca | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 42.7: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Tuxpan | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 30 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Unión de San Antonio | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unión de Tula | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle de Guadalupe | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Valle de Juárez | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Gabriel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Villa Corona | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Villa Guerrero | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Villa Hidalgo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañadas de Obregón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahualica de González Gallo | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacoalco de Torres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Zapopan | 1,037 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 831 | 13 | 71 | 100 |
| Zapotiltic | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotitlán de Vadillo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 42.8: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Zapotlán del Rey | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotlanejo | 32 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipios de Otros Estados | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 43 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Ocupación Principal | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Estudiante de tiempo completo | 11.3% | 21.4% | 31.3% | 11.4% | 2.9% | 9.3% | 3.0% | 17.5% | 28.8% | 15.4% | 17.0% | 9.3% | 9.6% | 9.7% |
| Estudiante con actividad laboral | 5.4% | 13.0% | 8.9% | 8.4% | 0.6% | 7.0% | 4.2% | 4.1% | 15.1% | 8.9% | 5.3% | 6.8% | 5.2% | 4.0% |
| Tiene empleo estable > 6 meses | 41.8% | 35.9% | 33.9% | 53.2% | 63.5% | 42.6% | 54.2% | 38.6% | 17.8% | 35.5% | 38.9% | 32.2% | 32.3% | 37.7% |
| Tiene menos de 6 meses | 16.2% | 8.4% | 12.5% | 8.4% | 19.3% | 24.0% | 9.7% | 17.0% | 17.8% | 18.8% | 14.6% | 11.8% | 24.6% | 15.2% |
| Desempleado (busca empleo) | 13.1% | 7.6% | 8.0% | 13.7% | 4.7% | 9.3% | 18.3% | 12.9% | 2.7% | 12.3% | 11.4% | 18.3% | 14.6% | 18.3% |
| Desocupado (no busca empleo) | 8.5% | 10.7% | 4.5% | 3.3% | 1.9% | 5.4% | 4.9% | 7.6% | 13.7% | 6.5% | 10.2% | 11.6% | 11.9% | 11.7% |
| Hogar | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.7% | 1.0% | 0.6% | 0.5% |
| Pensionado | 0.7% | 3.1% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.7% | 0.9% |
| No aplica | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
| Otra | 1.8% | 0.0% | 0.9% | 0.8% | 6.2% | 1.6% | 3.9% | 1.8% | 0.7% | 2.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 1.9% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| No responde | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 44 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|--------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Grado Máximo de Estudios | 6,634 | 0 | 56 | 254 | 816 | 11 | 138 | 96 | 0 | 84 | 971 | 350 | 873 | 840 |
| Primaria | 25.5% | 16.0% | 29.5% | 31.9% | 39.0% | 31.0% | 19.9% | 21.1% | 21.9% | 14.3% | 19.5% | 20.1% | 28.4% | 24.0% |
| Secundaria | 44.8% | 48.1% | 55.4% | 45.4% | 42.1% | 37.2% | 41.2% | 42.1% | 47.9% | 42.7% | 44.0% | 46.7% | 45.3% | 47.2% |
| Escolaridad Técnica | 2.7% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 1.1% | 3.1% | 2.5% | 1.2% | 0.7% | 1.4% | 3.7% | 5.8% | 2.8% | 4.2% |
| Bachillerato | 19.6% | 20.6% | 11.6% | 17.0% | 13.0% | 20.9% | 28.0% | 25.7% | 24.7% | 34.1% | 21.7% | 20.4% | 16.8% | 17.9% |
| Licenciatura | 4.5% | 11.5% | 2.7% | 3.0% | 1.8% | 0.0% | 5.6% | 7.0% | 2.7% | 4.1% | 8.6% | 2.8% | 2.8% | 4.7% |
| Maestría/doc torado/ Especialidad | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.1% | 0.3% | 0.5% | 0.3% |
| No sabe leer ni escribir | 1.1% | 1.5% | 0.0% | 1.3% | 0.9% | 4.7% | 0.9% | 1.2% | 2.1% | 1.4% | 0.5% | 2.0% | 1.3% | 0.6% |
| Sabe leer y escribir | 1.1% | 0.8% | 0.0% | 0.5% | 0.9% | 3.1% | 0.9% | 1.2% | 0.0% | 1.4% | 0.4% | 1.8% | 2.1% | 1.0% |
| No aplica | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| No responde | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.9% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |



**Cuadro No. 45 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Estado Civil | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Soltero | 59.8% | 65.6% | 63.4% | 59.1% | 56.2% | 55.8% | 50.7% | 56.7% | 80.1% | 65.5% | 59.8% | 59.5% | 62.6% | 59.2% |
| Casado | 17.7% | 18.3% | 20.5% | 21.8% | 24.8% | 14.0% | 20.1% | 19.9% | 8.9% | 18.8% | 16.9% | 17.8% | 12.7% | 16.1% |
| Unión Libre | 13.7% | 11.5% | 8.9% | 11.5% | 13.2% | 16.3% | 17.6% | 13.5% | 8.9% | 10.2% | 12.9% | 14.6% | 15.3% | 14.9% |
| Separado | 5.7% | 3.8% | 5.4% | 6.6% | 1.7% | 8.5% | 4.9% | 7.6% | 1.4% | 3.4% | 7.3% | 4.0% | 7.3% | 6.4% |
| Divorciado | 2.0% | 0.8% | 0.0% | 0.8% | 1.7% | 4.7% | 4.9% | 1.2% | 0.0% | 2.0% | 2.0% | 2.8% | 1.3% | 2.5% |
| Viudo | 0.5% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.5% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.8% | 0.3% | 0.9% |
| No aplica | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
| No sabe | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 2.0% | 0.0% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |

**Cuadro No. 46 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN ANTECEDENTE DE BÚSQUEDA DE APOYO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Búsqueda de Apoyo | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Primera vez en el año | 86.4% | 99.2% | 86.6% | 92.0% | 85.0% | 92.2% | 79.4% | 83.6% | 82.9% | 95.2% | 91.1% | 85.4% | 82.5% | 82.6% |
| Ya había acudido en este año | 13.6% | 0.8% | 13.4% | 8.0% | 14.6% | 7.8% | 20.6% | 16.4% | 17.1% | 4.8% | 8.9% | 14.6% | 17.5% | 17.4% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 47 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE A RECIBIDO TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Número de veces | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Primera Vez | 63.5% | 86.3% | 68.8% | 63.9% | 76.5% | 66.7% | 64.4% | 58.5% | 69.2% | 62.5% | 62.9% | 63.3% | 62.5% | 52.5% |
| 2 a 4 | 29.2% | 13.7% | 31.3% | 30.0% | 20.5% | 27.1% | 29.4% | 34.5% | 27.4% | 32.4% | 29.0% | 27.4% | 27.7% | 37.2% |
| 5 a > | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 3.0% | 6.2% | 6.3% | 7.0% | 3.4% | 5.1% | 8.1% | 9.3% | 9.8% | 10.3% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 48 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN LA FORMA EN QUE ACUDE A TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Forma que acude | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Voluntariamente | 50.1% | 50.4% | 29.5% | 36.1% | 42.4% | 41.1% | 53.0% | 78.9% | 47.3% | 31.4% | 59.3% | 51.5% | 45.9% | 60.4% |
| Indicación médica no psiquiátrica | 3.4% | 6.1% | 10.7% | 2.2% | 6.2% | 0.0% | 0.9% | 3.5% | 2.7% | 10.6% | 1.4% | 0.8% | 1.6% | 5.2% |
| Indicación médica psiquiátrica | 0.6% | 2.3% | 1.8% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.7% | 0.8% |
| Lo llevaron amigos o familiares | 34.6% | 7.6% | 8.0% | 41.5% | 48.8% | 45.0% | 40.5% | 1.2% | 24.7% | 37.2% | 27.4% | 37.2% | 42.7% | 27.3% |
| Indicación Legal | 2.5% | 6.9% | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 1.4% | 4.7% | 4.1% | 3.1% | 2.2% | 3.5% | 4.0% | 2.5% |
| Escuela o trabajo | 8.2% | 26.7% | 42.0% | 19.4% | 0.8% | 12.4% | 2.8% | 11.7% | 19.9% | 17.7% | 7.7% | 6.8% | 4.2% | 3.7% |
| Otra (s) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No sabe | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
| No responde | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 49 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN DROGA DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Estatad | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Drogas de inicio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Alcohol | 37.9% | 66.4% | 38.4% | 46.2% | 30.0% | 52.7% | 32.9% | 62.6% | 43.2% | 53.6% | 44.2% | 40.2% | 24.6% | 33.2% |
| Marihuana | 16.4% | 8.4% | 18.8% | 9.1% | 27.2% | 8.5% | 23.1% | 5.3% | 12.3% | 9.2% | 12.5% | 12.6% | 20.4% | 17.5% |
| Inhalantes | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.4% | 0.0% | 1.4% | 0.6% | 2.1% | 1.4% | 1.5% | 1.8% | 4.6% | 2.9% |
| Alucinógenos | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 3.5% |
| Heroína | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Opio/Morfina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Cocaína | 2.5% | 1.5% | 1.8% | 1.7% | 2.4% | 0.8% | 4.6% | 0.0% | 1.4% | 3.8% | 2.0% | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| Tranquilizantes | 0.4% | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 1.2% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.8% | 0.4% | 0.5% |
| Barbitúricos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anfetaminas | 0.4% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
| Tabaco | 33.0% | 22.1% | 36.6% | 37.1% | 11.8% | 34.1% | 26.4% | 25.7% | 38.4% | 29.4% | 35.4% | 39.7% | 43.8% | 34.5% |
| Antidepresivos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Psicotrópicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Pasta Base | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| Metanfetamina/Cristal | 6.1% | 1.5% | 0.9% | 4.4% | 27.6% | 3.9% | 2.5% | 4.1% | 2.7% | 1.7% | 3.7% | 0.8% | 2.9% | 4.1% |
| Flunitracepam | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Crack | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.3% |
| Refractil oftento | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 50 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN EDAD DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Edad de Inicio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| 5 a 9 | 7.7% | 6.9% | 10.7% | 8.0% | 2.2% | 7.0% | 6.9% | 9.4% | 15.1% | 9.6% | 8.9% | 10.6% | 7.5% | 7.9% |
| 10 a 14 | 49.1% | 57.3% | 66.1% | 55.7% | 22.6% | 45.7% | 40.7% | 53.8% | 59.6% | 54.3% | 51.1% | 54.8% | 57.8% | 48.5% |
| 15 a 19 | 34.5% | 33.6% | 21.4% | 33.0% | 48.7% | 38.8% | 41.2% | 33.3% | 23.3% | 30.4% | 33.2% | 29.6% | 28.8% | 35.1% |
| 20 a 24 | 5.2% | 1.5% | 1.8% | 2.5% | 15.2% | 3.1% | 6.9% | 2.3% | 1.4% | 4.8% | 4.1% | 2.5% | 3.7% | 4.8% |
| 25 a 29 | 1.8% | 0.8% | 0.0% | 0.6% | 4.6% | 3.1% | 2.1% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 1.6% | 0.8% | 1.6% | 1.9% |
| 30 a 34 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 3.7% | 1.6% | 1.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.8% | 0.2% | 1.1% |
| 35 a 39 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 40 a 44 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.8% | 0.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
| 45 a 49 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| 50 a 54 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 55 a 59 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 60 a 64 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65 a > | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 51 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Estatal | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Drogas de impacto | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Alcohol | 23.8% | 50.4% | 23.2% | 41.8% | 17.5% | 41.9% | 15.0% | 45.0% | 24.0% | 29.0% | 24.2% | 22.4% | 14.1% | 21.8% |
| Marihuana | 12.9% | 8.4% | 21.4% | 8.4% | 5.0% | 10.1% | 10.9% | 5.3% | 19.9% | 14.0% | 17.0% | 17.1% | 15.4% | 13.4% |
| Inhalantes | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 4.1% | 0.3% | 1.3% | 1.0% | 3.7% | 2.3% |
| Alucinógenos | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.3% | 16.7% |
| Heroína | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.5% | 3.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| Opio/Morfina | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Cocaína | 3.1% | 0.8% | 0.9% | 2.4% | 1.5% | 0.0% | 3.9% | 0.0% | 2.7% | 3.4% | 4.6% | 3.0% | 3.4% | 4.0% |
| Tranquilizantes | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.9% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | 0.0% | 1.3% | 1.3% |
| Barbitúricos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anfetaminas | 2.2% | 0.8% | 13.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 19.2% | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 1.3% | 5.3% | 0.3% | 0.3% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tabaco | 3.1% | 9.2% | 17.0% | 2.8% | 0.4% | 0.0% | 2.3% | 2.9% | 3.4% | 1.0% | 2.6% | 4.0% | 3.7% | 4.0% |
| Antidepresivos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Otros Psicotrópicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| Pasta Base | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 1.7% |
| Metanfetamina/Cristal | 45.8% | 29.8% | 24.1% | 43.2% | 74.8% | 45.0% | 21.1% | 46.2% | 40.4% | 50.5% | 45.8% | 39.2% | 55.7% | 33.1% |
| Flunitracepam | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Crack | 2.7% | 0.8% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 24.5% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.5% | 5.8% | 1.6% | 1.0% |
| Refractilofeno | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 52.1 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN ESTADO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Estado | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Aguascalientes | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Baja California | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Baja California Sur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coahuila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colima | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Chiapas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chihuahua | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | 5 |
| Durango | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guanajuato | 36 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jalisco | 6,232 | 123 | 112 | 622 | 699 | 117 | 383 | 169 | 139 | 236 | 1,094 | 362 | 1,070 | 1,106 |
| México | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Michoacán | 93 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 11 |
| Morelos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nayarit | 33 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Nuevo León | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 52.2 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN ESTADO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Estado | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Oaxaca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Puebla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Querétaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quintana Roo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis Potosí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sinaloa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Sonora | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Tamaulipas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tlaxcala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veracruz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yucatán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zacatecas | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Otro País | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 53.1 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Municipio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Acatic | 20 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Acatlán de Juárez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ahualulco del Mercado | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amacueca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amatitán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ameca | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| San Juanito de Escobedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arandas | 159 | 0 | 0 | 144 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Arenal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Atemajac de Brizuela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atengo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenguillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atotonilco el Alto | 32 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Atoyac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autlán de Navarro | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayotlán | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayutla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barca | 23 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bolaños | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 53.2 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Municipio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Cabo Corrientes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casimiro Castillo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cihuatlán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zapotlán El Grande | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 161 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Cocula | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Colotlán | 95 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Concepción de Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuautitlán de García Barragán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cuautla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuquío | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chapala | 144 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| Chimaltitlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiquilistlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Degollado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ejutla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Encarnación de Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 53.3 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Municipio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Etzatlán | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grullo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Guachinango | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 1,293 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 21 | 2 | 9 | 16 | 108 | 70 | 224 | 798 |
| Hostotipaquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejúcar | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejuquilla el Alto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Huerta | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 37 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| Ixtlahuacán del Río | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jalostotitlán | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jamay | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús María | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jilotlán de los Dolores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jocotepec | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Juanacatlán | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juchitlán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagos de Moreno | 40 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 53.4 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Municipio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Limón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Santa María del Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzanilla de la Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mascota | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mazamitla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexicacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezquitic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mixtlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ocotlán | 251 | 0 | 0 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Ojuelos de Jalisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pihuamo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poncitlán | 71 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Puerto Vallarta | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1 |
| Villa Purificación | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Quitupan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 39 | 8 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 53.5 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Municipio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| San Cristóbal de la Barranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego de Alejandría | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan de los Lagos | 118 | 0 | 84 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| San Julián | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marcos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Bolaños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Hidalgo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Miguel el Alto | 17 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gómez Farías | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Sebastián del Oeste | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa María de los Ángeles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayula | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tala | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Talpa de Allende | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 53.6 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Municipio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Tamazula de Gordiano | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tapalpa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tecalitlán | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tecolotlán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Techaluta de Montenegro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenamaxtlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teocaltiche | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teocuitatlán de Corona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tepatitlán de Morelos | 368 | 0 | 0 | 336 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Tequila | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Teuchitlán | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tizapán el Alto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 243 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 7 | 161 | 48 |
| San Pedro Tlaquepaque | 492 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | 22 | 392 | 45 |
| Tolimán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tomatlán | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonalá | 377 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 188 | 111 | 50 |
| Tonaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 53.7 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Municipio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Unión de San Antonio | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unión de Tula | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle de Guadalupe | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Valle de Juárez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Gabriel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Villa Corona | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Villa Guerrero | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Villa Hidalgo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañadas de Obregón | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yahualica de González Gallo | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zacoalco de Torres | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Zapopan | 1,056 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 847 | 16 | 75 | 92 |
| Zapotiltic | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zapotitlán de Vadillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zapotlán del Rey | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotlanejo | 33 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 53.8 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Municipio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Tonila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totatiche | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tototlán | 31 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuxcacuesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxcueca | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxpan | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipios de Otros Estados | 402 | 8 | 0 | 12 | 88 | 12 | 49 | 2 | 7 | 57 | 29 | 36 | 50 | 52 |

**Cuadro No. 54 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
POR USO DE DROGAS INYECTADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Uso de drogas inyectadas | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Si | 3.3% | 0.0% | 1.8% | 1.3% | 2.2% | 7.0% | 5.6% | 1.2% | 1.4% | 5.8% | 2.3% | 4.5% | 3.9% | 4.2% |
| No | 96.7% | 100% | 98.2% | 98.7% | 97.8% | 93.0% | 94.4% | 98.8% | 98.6% | 94.2% | 97.7% | 95.5% | 96.1% | 95.8% |
| No sabe | | | | | | | | | | | | | | |
| No responde | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 55 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
QUE COMPARTE JERINGAS CON EL USO DE DROGAS INYECTADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------|---------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Comparte jeringas | 218 | 0 | 2 | 8 | 17 | 9 | 24 | 2 | 2 | 17 | 26 | 18 | 44 | 49 |
| Si | 77.5% | | 50.0% | 100% | 64.7% | 88.9% | 70.8% | 100% | 50% | 70.6% | 73.1% | 94.4% | 79.5% | 77.6% |
| No | 22.5% | | 50.0% | 0.0% | 35.3% | 11.1% | 29.2% | 0.0% | 50% | 29.4% | 26.9% | 5.6% | 20.5% | 22.4% |
| No sabe | | | | | | | | | | | | | | |
| No responde | | | | | | | | | | | | | | |

**Cuadro No. 56 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
QUE USARON DROGAS INTAVENOSAS CON JERINGA NUEVA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------------|---------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Usó jeringa sin uso previo | 218 | 0 | 2 | 8 | 17 | 9 | 24 | 2 | 2 | 17 | 26 | 18 | 44 | 49 |
| Si | 34.4% | | 0.0% | 75.0% | 35.3% | 77.8% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 41.2% | 19.2% | 38.9% | 31.8% | 30.6% |
| No | 65.6% | | 100% | 25.0% | 64.7% | 22.2% | 66.7% | 100% | 100% | 58.8% | 80.8% | 61.1% | 68.2% | 69.4% |
| No sabe | 0.0% | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.0% | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 57 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 CONSUMO DE DROGAS EN FORMA COMBINADA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Combina Drogas | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Si | 47.2% | 47.3% | 61.6% | 53.6% | 29.9% | 10.1% | 43.1% | 45.6% | 43.2% | 64.5% | 31.6% | 68.8% | 58.2% | 53.2% |
| No | 52.8% | 52.7% | 38.4% | 46.4% | 70.1% | 89.9% | 56.9% | 54.4% | 56.8% | 35.5% | 68.4% | 31.2% | 41.8% | 46.8% |

**Cuadro No. 58 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 QUE CONDUCEN BAJO EL EFECTO DE DROGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Conducción bajo efecto de drogas | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Si | 44.0% | 17.6% | 39.3% | 66.9% | 58.8% | 55.8% | 45.8% | 57.3% | 37.0% | 54.9% | 25.6% | 47.5% | 36.1% | 43.1% |
| No | 56.0% | 82.4% | 60.7% | 33.1% | 41.2% | 44.2% | 54.2% | 42.7% | 63.0% | 45.1% | 74.4% | 52.5% | 63.9% | 56.9% |
| No sabe | 0.0% |
| No responde | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 59 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 REFIEREN APDECER UNA ENFERMEDAD ASOCIADA AL CONSUMO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Padece alguna enfermedad | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| Si | 15.7% | 90.8% | 2.7% | 13.6% | 2.9% | 10.1% | 49.3% | 14.6% | 33.6% | 7.5% | 24.5% | 14.1% | 8.2% | 5.8% |
| No | 84.3% | 9.2% | 97.3% | 86.4% | 97.1% | 89.9% | 50.7% | 85.4% | 66.4% | 92.5% | 75.5% | 85.9% | 91.8% | 94.2% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 60 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN LUGAR DONDE CONSIGUE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Donde consigue la droga de impacto | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| En su propia casa | 11.6% | 12.2% | 4.5% | 10.6% | 24.9% | 10.9% | 6.3% | 7.6% | 9.6% | 11.9% | 10.7% | 7.0% | 10.4% | 10.2% |
| Se la llevan a su casa | 6.2% | 5.3% | 2.7% | 3.6% | 3.8% | 6.2% | 9.5% | 9.4% | 6.2% | 10.6% | 6.9% | 7.3% | 4.1% | 7.9% |
| En casa de un amigo o familiar | 7.9% | 13.7% | 8.0% | 4.9% | 9.1% | 7.0% | 7.2% | 4.7% | 6.8% | 12.3% | 8.6% | 8.3% | 9.3% | 5.8% |
| En la calle | 43.9% | 38.2% | 18.8% | 42.0% | 54.5% | 38.8% | 35.2% | 28.7% | 32.2% | 25.6% | 45.9% | 39.2% | 54.6% | 42.5% |
| En antros y bares | 2.1% | 0.8% | 0.0% | 2.4% | 3.8% | 5.4% | 2.1% | 2.9% | 2.7% | 1.4% | 1.4% | 2.3% | 0.9% | 2.5% |
| En fiestas y reuniones | 4.6% | 16.8% | 3.6% | 12.6% | 0.6% | 1.6% | 2.8% | 4.7% | 7.5% | 13.0% | 3.9% | 5.0% | 3.0% | 2.0% |
| En la escuela | 0.6% | 0.0% | 1.8% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% |
| En el trabajo | 1.9% | 2.3% | 0.9% | 2.5% | 0.5% | 1.6% | 1.9% | 7.0% | 0.7% | 1.7% | 2.0% | 3.8% | 1.1% | 2.2% |
| En tiendas cercanas a mi casa | 15.6% | 10.7% | 57.1% | 18.0% | 1.5% | 24.8% | 18.1% | 14.0% | 12.3% | 18.4% | 17.2% | 20.1% | 10.9% | 19.6% |
| Parques | 0.4% | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 0.0% | 1.6% | 0.9% | 0.0% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.3% |
| Picaderos | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.6% | 2.3% | 13.7% | 20.5% | 17.1% | 3.4% | 2.1% | 6.0% | 3.8% | 5.8% |
| Otro | 0.5% | 0.0% | 1.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.6% | 0.7% | 1.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 61 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 LUGAR DONDE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Donde consume la droga de impacto | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| La tiene en su casa | 36.6% | 29.8% | 38.4% | 65.8% | 26.4% | 41.9% | 30.1% | 35.7% | 21.9% | 32.1% | 36.4% | 35.4% | 29.5% | 40.3% |
| En casa de un amigo o familiar | 15.7% | 13.7% | 11.6% | 6.8% | 14.7% | 14.7% | 16.4% | 7.0% | 25.3% | 16.7% | 19.6% | 12.1% | 20.6% | 14.2% |
| En la vía pública (calles, parques) | 29.8% | 33.6% | 33.9% | 6.8% | 49.9% | 22.5% | 22.2% | 26.3% | 28.8% | 23.2% | 25.5% | 30.4% | 40.4% | 27.9% |
| En antros y bares | 3.4% | 0.0% | 0.9% | 2.2% | 6.0% | 4.7% | 3.9% | 2.3% | 1.4% | 3.8% | 4.4% | 3.3% | 1.3% | 4.1% |
| En fiestas y reuniones | 6.1% | 19.8% | 4.5% | 13.7% | 1.3% | 4.7% | 3.0% | 11.1% | 8.9% | 14.0% | 5.9% | 7.0% | 3.6% | 4.2% |
| En la escuela | 0.8% | 0.8% | 1.8% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 1.2% | 4.1% | 0.7% | 1.2% | 0.8% | 0.8% | 1.0% |
| En el trabajo | 4.2% | 0.8% | 6.3% | 3.5% | 1.5% | 6.2% | 8.6% | 9.9% | 2.7% | 5.1% | 4.3% | 7.8% | 2.2% | 4.4% |
| En picaderos | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 4.7% | 8.6% | 6.4% | 6.8% | 2.7% | 1.9% | 2.5% | 1.5% | 2.9% |
| Otro | 0.9% | 1.5% | 2.7% | 0.3% | 0.0% | 0.8% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 1.0% | 0.8% | 0.0% | 0.9% |
| No sabe | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 62 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN EDAD DE INICIO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Edad de Inicio | 6,634 | 131 | 112 | 634 | 787 | 129 | 432 | 171 | 146 | 293 | 1123 | 398 | 1120 | 1158 |
| 5 a 9 | 7.7% | 6.9% | 10.7% | 8.0% | 2.2% | 7.0% | 6.9% | 9.4% | 15.1% | 9.6% | 8.9% | 10.6% | 7.5% | 7.9% |
| 10 a 14 | 49.1% | 57.3% | 66.1% | 55.7% | 22.6% | 45.7% | 40.7% | 53.8% | 59.6% | 54.3% | 51.1% | 54.8% | 57.8% | 48.5% |
| 15 a 19 | 34.5% | 33.6% | 21.4% | 33.0% | 48.7% | 38.8% | 41.2% | 33.3% | 23.3% | 30.4% | 33.2% | 29.6% | 28.8% | 35.1% |
| 20 a 24 | 5.2% | 1.5% | 1.8% | 2.5% | 15.2% | 3.1% | 6.9% | 2.3% | 1.4% | 4.8% | 4.1% | 2.5% | 3.7% | 4.8% |
| 25 a 29 | 1.8% | 0.8% | 0.0% | 0.6% | 4.6% | 3.1% | 2.1% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 1.6% | 0.8% | 1.6% | 1.9% |
| 30 a 34 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 3.7% | 1.6% | 1.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.8% | 0.2% | 1.1% |
| 35 a 39 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 40 a 44 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.8% | 0.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
| 45 a 49 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| 50 a 54 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 55 a 59 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 60 a 64 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65 a > | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 63.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| ALCOHOL | 1,582 | 66 | 26 | 265 | 138 | 54 | 65 | 77 | 35 | 85 | 272 | 89 | 158 | 252 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 82.7% | 100% | 96.2% | 62.3% | 93.5% | 83.3% | 81.5% | 83.1% | 77.1% | 69.4% | 90.1% | 68.5% | 88.0% | 91.7% |
| Menor efecto que antes | 66.8% | 83.3% | 46.2% | 41.1% | 82.6% | 63.0% | 61.5% | 67.5% | 45.7% | 21.2% | 75.7% | 68.5% | 79.7% | 84.5% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 67.8% | 87.9% | 50.0% | 59.6% | 81.9% | 59.3% | 50.8% | 64.9% | 42.9% | 22.4% | 74.3% | 61.8% | 75.3% | 81.3% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 71.3% | 71.2% | 92.3% | 65.7% | 93.5% | 63.0% | 66.2% | 59.7% | 48.6% | 36.5% | 78.7% | 65.2% | 68.4% | 80.6% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 55.9% | 83.3% | 50.0% | 37.7% | 79.7% | 40.7% | 53.8% | 48.1% | 20.0% | 10.6% | 62.9% | 49.4% | 62.0% | 73.0% |



Cuadro No. 63.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| ALCOHOL | 1,582 | 66 | 26 | 265 | 138 | 54 | 65 | 77 | 35 | 85 | 272 | 89 | 158 | 252 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 81.9% | 95.5% | 88.5% | 81.5% | 97.8% | 74.1% | 80.0% | 64.9% | 85.7% | 51.8% | 87.9% | 87.6% | 77.8% | 80.6% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 64.9% | 83.3% | 38.5% | 49.4% | 83.3% | 59.3% | 67.7% | 55.8% | 42.9% | 23.5% | 73.2% | 68.5% | 70.9% | 75.4% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 71.7% | 74.2% | 96.2 % | 65.7% | 94.2 % | 57.4 % | 67.7% | 51.9% | 51.4% | 38.8 % | 74.6 % | 59.6 % | 75.3% | 85.3 % |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 61.1% | 63.6 % | 50.0 % | 46.4 % | 81.2% | 70.4 % | 63.1% | 61.0% | 20.0 % | 17.6% | 66.5 % | 48.3 % | 67.7% | 78.2% |



Cuadro No. 63.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| ALCOHOL | 1,582 | 66 | 26 | 265 | 138 | 54 | 65 | 77 | 35 | 85 | 272 | 89 | 158 | 252 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 60.2% | 92.4% | 92.3% | 41.5% | 92.0% | 50.0% | 67.7% | 32.5% | 51.4% | 34.1% | 68.0% | 47.2% | 57.6% | 67.5% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 66.8% | 93.9% | 46.2% | 63.4% | 81.9% | 63.0% | 52.3% | 48.1% | 48.6% | 20.0% | 76.5% | 60.7% | 62.0% | 80.6% |
| Descuido de actividades | 69.6% | 92.4% | 50.0% | 66.0% | 85.5% | 66.7% | 61.5% | 53.2% | 42.9% | 20.0% | 82.0% | 56.2% | 68.4% | 81.0% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 59.5% | 92.4% | 80.8% | 63.0% | 50.0% | 55.6% | 49.2% | 49.4% | 34.3% | 34.1% | 71.7% | 53.9% | 53.2% | 61.9% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 59.2% | 93.9% | 80.8% | 57.0% | 37.7% | 44.4% | 49.2% | 44.2% | 42.9% | 29.4% | 73.9% | 67.4% | 59.5% | 65.5% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 74.0% | 93.9% | 100% | 79.2% | 50.7% | 66.7% | 66.2% | 62.3% | 71.4% | 37.6% | 86.8% | 73.0% | 69.6% | 82.1% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 73.0% | 92.4% | 96.2% | 78.5% | 40.6% | 68.5% | 66.2% | 61.0% | 62.9% | 40.0% | 87.1% | 77.5% | 67.1% | 83.3% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 64 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE DROGAS DEL SEXO MASCULINO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| ALCOHOL | 1,582 | 66 | 26 | 265 | 138 | 54 | 65 | 77 | 35 | 85 | 272 | 89 | 158 | 252 |
| 5 a 9 | 4.8% | 9.1% | 3.8% | 4.5% | 2.2% | 3.7% | 3.1% | 7.8% | 5.7% | 7.1% | 4.4% | 4.5% | 5.7% | 4.4% |
| 10 a 14 | 40.1% | 53.0% | 61.5% | 54.0% | 15.2% | 29.6% | 20.0% | 46.8% | 60.0% | 47.1% | 41.2% | 41.6% | 30.4% | 38.5% |
| 15 a 19 | 41.1% | 36.4% | 23.1% | 36.2% | 39.1% | 50.0% | 53.8% | 42.9% | 31.4% | 32.9% | 40.4% | 46.1% | 44.3% | 45.6% |
| 20 a 24 | 8.3% | 1.5% | 7.7% | 3.8% | 23.9% | 3.7% | 13.8% | 1.3% | | 9.4% | 8.8% | 4.5% | 12.7% | 6.7% |
| 25 a 29 | 3.2% | | | 1.1% | 10.1% | 5.6% | 4.6% | | | 2.4% | 3.7% | 1.1% | 5.7% | 2.4% |
| 30 a 34 | 1.4% | | | 0.4% | 5.8% | 1.9% | 3.1% | 1.3% | 2.9% | 1.2% | 0.4% | 1.1% | 0.6% | 1.6% |
| 35 a 39 | 0.4% | | 3.8% | | 0.7% | 3.7% | | | | | 0.7% | | | 0.4% |
| 40 a 44 | 0.3% | | | | 1.4% | 1.9% | | | | | 0.4% | | | |
| 45 a 49 | 0.2% | | | | 0.7% | | 1.5% | | | | | | | 0.4% |
| 50 a 54 | 0.1% | | | | 0.7% | | | | | | | 1.1% | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | 0.1% | | | | | | | | | | | | 0.6% | |



| Cuadro No. 65.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| MARIHUANA | 853 | 11 | 24 | 53 | 39 | 13 | 47 | 9 | 29 | 41 | 191 | 68 | 173 | 155 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 75.7% | 81.8% | 75.0% | 41.5% | 84.6% | 92.3% | 66.0% | 55.6% | 69.0% | 70.7% | 84.3% | 77.9% | 73.4% | 81.3% |
| Menor efecto que antes | 67.5% | 72.7% | 50.0% | 41.5% | 74.4% | 76.9% | 57.4% | 22.2% | 55.2% | 39.0% | 75.4% | 64.7% | 67.6% | 83.2% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 65.7% | 81.8% | 54.2% | 52.8% | 66.7% | 53.8% | 57.4% | 22.2% | 51.7% | 36.6% | 73.3% | 61.8% | 66.5% | 78.1% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 66.9% | 63.6% | 79.2% | 58.5% | 79.5% | 38.5% | 53.2% | 11.1% | 65.5% | 51.2% | 78.5% | 63.2% | 58.4% | 76.1% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 53.9% | 63.6% | 45.8% | 32.1% | 64.1% | 30.8% | 57.4% | 22.2% | 41.4% | 22.0% | 63.4% | 47.1% | 49.7% | 69.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 65.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| MARIHUANA | 853 | 11 | 24 | 53 | 39 | 13 | 47 | 9 | 29 | 41 | 191 | 68 | 173 | 155 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 79.7% | 81.8% | 91.7% | 60.4% | 82.1% | 46.2% | 76.6% | 77.8% | 86.2% | 63.4% | 87.4% | 79.4% | 76.3% | 85.2% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 64.9% | 90.9% | 58.3% | 41.5% | 71.8% | 30.8% | 72.3% | 44.4% | 55.2% | 29.3% | 73.3% | 48.5% | 64.7% | 80.6% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 62.7% | 63.6% | 75.0% | 30.2% | 79.5% | 38.5% | 66.0% | 22.2% | 58.6% | 51.2% | 71.2% | 55.9% | 56.1% | 74.8% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 55.9% | 63.6% | 45.8% | 28.3% | 64.1% | 38.5% | 40.4% | 33.3% | 55.2% | 31.7% | 66.5% | 51.5% | 53.2% | 70.3% |



Cuadro No. 65.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| MARIHUANA | 853 | 11 | 24 | 53 | 39 | 13 | 47 | 9 | 29 | 41 | 191 | 68 | 173 | 155 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 57.6% | 81.8% | 75.0% | 26.4% | 76.9% | 23.1% | 51.1% | 33.3% | 55.2% | 41.5% | 66.5% | 52.9% | 52.0% | 67.1% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 55.8% | 72.7% | 45.8% | 43.4% | 64.1% | 15.4% | 57.4% | 22.2% | 48.3% | 24.4% | 66.5% | 52.9% | 52.6% | 64.5% |
| Descuido de actividades | 64.6% | 72.7% | 66.7% | 45.3% | 64.1% | 23.1% | 63.8% | 33.3% | 55.2% | 31.7% | 72.8% | 70.6% | 61.8% | 76.8% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 49.0% | 72.7% | 66.7% | 26.4% | 53.8% | 46.2% | 44.7% | 44.4% | 37.9% | 29.3% | 61.3% | 44.1% | 43.9% | 52.9% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 51.6% | 72.7% | 66.7% | 22.6% | 46.2% | 15.4% | 44.7% | 44.4% | 37.9% | 26.8% | 63.4% | 61.8% | 43.9% | 63.2% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 69.4% | 72.7% | 83.3% | 66.0% | 61.5% | 38.5% | 59.6% | 77.8% | 62.1% | 46.3% | 82.7% | 72.1% | 60.1% | 75.5% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 69.4% | 72.7% | 87.5% | 64.2% | 53.8% | 46.2% | 53.2% | 77.8% | 58.6% | 43.9% | 82.7% | 72.1% | 61.3% | 78.7% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 66 EDAD DE INICIO EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| MARIHUANA | 853 | 11 | 24 | 53 | 39 | 13 | 47 | 9 | 29 | 41 | 191 | 68 | 173 | 155 |
| 5 a 9 | 1.5% | | 4.2% | 5.7% | 2.6% | | | | 6.9% | 2.4% | | | 1.2% | 1.9% |
| 10 a 14 | 51.3% | 45.5% | 58.3% | 49.1% | 33.3% | 61.5% | 51.1% | 44.4% | 65.5% | 65.9% | 45.0% | 45.6% | 53.2% | 57.4% |
| 15 a 19 | 40.7% | 36.4% | 29.2% | 39.6% | 53.8% | 30.8% | 38.3% | 55.6% | 24.1% | 29.3% | 48.7% | 44.1% | 39.3% | 36.8% |
| 20 a 24 | 4.0% | 9.1% | 8.3% | 5.7% | 2.6% | | 10.6% | | 3.4% | | 3.1% | 1.5% | 4.6% | 3.9% |
| 25 a 29 | 0.9% | | | | 2.6% | 7.7% | | | | | 1.0% | 2.9% | 1.2% | |
| 30 a 34 | 0.8% | 9.1% | | | 2.6% | | | | | 2.4% | 1.6% | 1.5% | | |
| 35 a 39 | 0.1% | | | | 2.6% | | | | | | | | | |
| 40 a 44 | 0.2% | | | | | | | | | | 0.5% | | 0.6% | |
| 45 a 49 | 0.4% | | | | | | | | | | | 4.4% | | |
| 50 a 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 67.1: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| INHALANTES | 102 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 15 | 4 | 41 | 27 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 76.5% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 66.7% | | 73.3% | 100% | 82.9% | 74.1% |
| Menor efecto que antes | 70.6% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 33.3% | | 60.0% | 75.0% | 80.5% | 74.1% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 73.5% | | | 50.0% | | | 83.3% | | 50.0% | | 73.3% | 75.0% | 82.9% | 66.7% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 68.6% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 66.7% | 100% | 60.0% | 25.0% | 70.7% | 77.8% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 58.8% | | | | | | 66.7% | | 33.3% | | 53.3% | 25.0% | 65.9% | 66.7% |



Cuadro No. 67.2: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| INHALANTES | 102 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 15 | 4 | 41 | 27 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 75.5% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 66.7% | 100% | 53.3% | 50.0% | 82.9% | 85.2% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 67.6% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 33.3% | | 46.7% | 50.0% | 78.0% | 77.8% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 75.5% | | | 100% | | | 66.7% | | 66.7% | 100% | 60.0% | 75.0% | 75.6% | 85.2% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 62.7% | | | | | | 66.7% | | 50.0% | | 40.0% | 75.0% | 70.7% | 70.4% |



Cuadro No. 67.3: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| INHALANTES | 102 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 15 | 4 | 41 | 27 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 53.9% | | | | | | 50.0% | | 66.7% | | 33.3% | 50.0% | 61.0% | 59.3% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 58.8% | | | | | | 66.7% | | 33.3% | 100% | 73.3% | 50.0% | 63.4% | 51.9% |
| Descuido de actividades | 70.6% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 50.0% | | 66.7% | 75.0% | 75.6% | 74.1% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 55.9% | | | | | | 50.0% | | 50.0% | 100% | 53.3% | 50.0% | 63.4% | 51.9% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 62.7% | | | | | | 66.7% | | 33.3% | 100% | 60.0% | 50.0% | 73.2% | 59.3% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 79.4% | | | 50.0% | | | 50.0% | | 83.3% | 100% | 73.3% | 75.0% | 85.4% | 81.5% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 80.4% | | | 50.0% | | | 66.7% | | 83.3% | 100% | 73.3% | 75.0% | 85.4% | 81.5% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 68 EDAD DE INICIO EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| INHALANTES | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Edad de Inicio | 102 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 15 | 4 | 41 | 27 |
| 5 a 9 | 3.9% | | | | | | | | 50.0% | | | | | 3.7% |
| 10 a 14 | 35.3% | | | 50.0% | | | 16.7% | | 50.0% | | 46.7% | | 36.6% | 33.3% |
| 15 a 19 | 44.1% | | | 50.0% | | | 50.0% | | | 100% | 40.0% | 100% | 43.9% | 44.4% |
| 20 a 24 | 9.8% | | | | | | 16.7% | | | | 13.3% | | 12.2% | 7.4% |
| 25 a 29 | 1.0% | | | | | | | | | | | | 2.4% | |
| 30 a 34 | 2.9% | | | | | | 16.7% | | | | | | 2.4% | 3.7% |
| 35 a 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 a 44 | 2.0% | | | | | | | | | | | | 2.4% | 3.7% |
| 45 a 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 a 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | 1.0% | | | | | | | | | | | | | 3.7% |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



Cuadro No. 69.1: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| COCAÍNA | 208 | 1 | 1 | 15 | 12 | - | 17 | - | 4 | 10 | 52 | 12 | 38 | 46 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 76.9% | 100% | 100% | 66.7% | 83.3% | | 52.9% | | 100% | 80.0% | 80.8% | 58.3% | 73.7% | 87.0% |
| Menor efecto que antes | 75.0% | 100% | | 60.0% | 75.0% | | 47.1% | | 75.0% | 60.0% | 78.8% | 66.7% | 89.5% | 80.4% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 72.1% | 100% | | 53.3% | 75.0% | | 47.1% | | 75.0% | 50.0% | 80.8% | 66.7% | 73.7% | 82.6% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 73.6% | 100% | 100% | 80.0% | 75.0% | | 58.8% | | 100% | 80.0% | 71.2% | 66.7% | 68.4% | 80.4% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 60.1% | 100% | | 40.0% | 66.7% | | 47.1% | | | 40.0% | 75.0% | 58.3% | 52.6% | 69.6% |



Cuadro No. 69.2: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| COCAÍNA | 208 | 1 | 1 | 15 | 12 | - | 17 | - | 4 | 10 | 52 | 12 | 38 | 46 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 83.7% | 100% | 100% | 80.0% | 91.7% | | 76.5% | | 100% | 90.0% | 86.5% | 83.3% | 73.7% | 87.0% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 67.8% | 100% | | 60.0% | 75.0% | | 47.1% | | | 50.0% | 76.9% | 75.0% | 52.6% | 87.0% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 72.6% | 100% | 100% | 53.3% | 83.3% | | 52.9% | | 75.0% | 70.0% | 76.9% | 66.7% | 65.8% | 84.8% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 63.9% | 100% | | 46.7% | 75.0% | | 64.7% | | 75.0% | 40.0% | 80.8% | 50.0% | 44.7% | 71.7% |



Cuadro No. 69.3: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| COCAÍNA | 208 | 1 | 1 | 15 | 12 | - | 17 | - | 4 | 10 | 52 | 12 | 38 | 46 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 57.7% | 100% | 100% | 40.0% | 75.0% | | 47.1% | | 25.0% | 60.0% | 63.5% | 50.0% | 50.0% | 65.2% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 62.0% | 100% | | 46.7% | 66.7% | | 47.1% | | 75.0% | 50.0% | 69.2% | 50.0% | 52.6% | 76.1% |
| Descuido de actividades | 70.2% | 100% | | 40.0% | 75.0% | | 47.1% | | 75.0% | 60.0% | 82.7% | 75.0% | 60.5% | 82.6% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 58.7% | 100% | 100% | 66.7% | 75.0% | | 29.4% | | 25.0% | 70.0% | 73.1% | 50.0% | 42.1% | 60.9% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 58.2% | 100% | 100% | 66.7% | 66.7% | | 23.5% | | 25.0% | 70.0% | 67.3% | 66.7% | 47.4% | 60.9% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 72.6% | 100% | 100% | 73.3% | 83.3% | | 52.9% | | 25.0% | 90.0% | 88.5% | 75.0% | 60.5% | 67.4% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 72.6% | 100% | 100% | 66.7% | 66.7% | | 58.8% | | 50.0% | 80.0% | 86.5% | 75.0% | 68.4% | 67.4% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 70 EDAD DE INICIO EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Edad de Inicio | 208 | 1 | 1 | 15 | 12 | - | 17 | - | 4 | 10 | 52 | 12 | 38 | 46 |
| 5 a 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 a 14 | 13.9% | | 100% | | 8.3% | | 17.6% | | 50.0% | 20.0% | 15.4% | 25.0% | 10.5% | 10.9% |
| 15 a 19 | 49.5% | 100% | | 80.0% | 58.3% | | 41.2% | | 50.0% | 40.0% | 48.1% | 50.0% | 55.3% | 39.1% |
| 20 a 24 | 18.8% | | | 13.3% | 16.7% | | 29.4% | | | 10.0% | 21.2% | 8.3% | 15.8% | 23.9% |
| 25 a 29 | 9.6% | | | | 16.7% | | 5.9% | | | | 9.6% | 16.7% | 5.3% | 17.4% |
| 30 a 34 | 3.8% | | | 6.7% | | | | | | | 3.8% | | 5.3% | 6.5% |
| 35 a 39 | 1.4% | | | | | | | | | 10.0% | 1.9% | | 2.6% | |
| 40 a 44 | 1.4% | | | | | | 5.9% | | | 10.0% | | | | 2.2% |
| 45 a 49 | 1.4% | | | | | | | | | 10.0% | | | 5.3% | |
| 50 a 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



Cuadro No. 71.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| TABACO | 207 | 12 | 19 | 18 | 3 | - | 10 | 5 | 5 | 3 | 29 | 16 | 41 | 46 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 81.6% | 91.7% | 89.5% | 94.4% | 33.3% | | 100% | 80.0% | 80.0% | 33.3% | 79.3% | 62.5% | 80.5% | 82.6% |
| Menor efecto que antes | 72.0% | 100% | 31.6% | 77.8% | 33.3% | | 100% | 80.0% | 20.0% | | 65.5% | 68.8% | 78.0% | 84.8% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 71.5% | 100% | 31.6% | 72.2% | 33.3% | | 90.0% | 80.0% | 20.0% | | 65.5% | 75.0% | 82.9% | 80.4% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 77.8% | 100% | 94.7% | 77.8% | 66.7% | | 90.0% | 80.0% | 60.0% | 66.7% | 69.0% | 81.3% | 58.5% | 87.0% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 58.9% | 91.7% | 31.6% | 50.0% | 33.3% | | 80.0% | 80.0% | | | 48.3% | 50.0% | 51.2% | 87.0% |



| Cuadro No. 71.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| TABACO | 207 | 12 | 19 | 18 | 3 | - | 10 | 5 | 5 | 3 | 29 | 16 | 41 | 46 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 80.7% | 91.7% | 94.7% | 72.2% | 33.3% | | 90.0% | 80.0% | 80.0% | 66.7% | 86.2% | 68.8% | 70.7% | 87.0% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 62.8% | 91.7% | 31.6% | 55.6% | | | 90.0% | 80.0% | 20.0% | | 75.9% | 43.8% | 58.5% | 78.3% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 66.7% | 91.7% | 89.5% | 50.0% | 33.3% | | 80.0% | 80.0% | 60.0% | 33.3% | 58.6% | 25.0% | 65.9% | 78.3% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 54.6% | 100% | 31.6% | 38.9% | 33.3% | | 80.0% | 80.0% | | | 51.7% | 25.0% | 58.5% | 69.6% |



| Cuadro No. 71.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| TABACO | 207 | 12 | 19 | 18 | 3 | - | 10 | 5 | 5 | 3 | 29 | 16 | 41 | 46 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 58.9% | 91.7% | 89.5% | 44.4% | 33.3% | | 50.0% | 80.0% | 20.0% | 33.3% | 48.3% | 31.3% | 53.7% | 71.7% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 55.1% | 91.7% | 31.6% | 55.6% | 33.3% | | 80.0% | 80.0% | 20.0% | | 48.3% | 31.3% | 51.2% | 71.7% |
| Descuido de actividades | 53.1% | 91.7% | 31.6% | 44.4% | | | 70.0% | 80.0% | | | 62.1% | 25.0% | 51.2% | 67.4% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobre dosis | 60.4% | 83.3% | 84.2% | 44.4% | 33.3% | | 50.0% | 80.0% | 40.0% | 33.3% | 51.7% | 37.5% | 48.8% | 80.4% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 63.8% | 91.7% | 84.2% | 50.0% | 33.3% | | 70.0% | 80.0% | 40.0% | 33.3% | 51.7% | 50.0% | 51.2% | 80.4% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 65.2% | 91.7% | 94.7% | 50.0% | 33.3% | | 70.0% | 80.0% | 60.0% | 33.3% | 62.1% | 43.8% | 48.8% | 78.3% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 68.6% | 91.7% | 94.7% | 50.0% | 33.3% | | 90.0% | 80.0% | 60.0% | 33.3% | 72.4% | 43.8% | 56.1% | 76.1% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 72 EDAD DE INICIO EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|---------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Edad de inicio | 207 | 12 | 19 | 18 | 3 | - | 10 | 5 | 5 | 3 | 29 | 16 | 41 | 46 |
| 5 a 9 | 7.7% | 8.3% | 10.5% | 5.6% | | | 30.0% | | | | 3.4% | | 7.3% | 10.9% |
| 10 a 14 | 54.1% | 58.3% | 68.4% | 72.2% | 66.7% | | 30.0% | 60.0% | 60.0% | 33.3% | 51.7% | 81.3% | 46.3% | 43.5% |
| 15 a 19 | 28.5% | 33.3% | 21.1% | 16.7% | 33.3% | | 30.0% | 40.0% | 20.0% | 33.3% | 31.0% | 12.5% | 29.3% | 37.0% |
| 20 a 24 | 5.3% | | | 5.6% | | | | | 20.0% | | | 6.3% | 12.2% | 6.5% |
| 25 a 29 | 1.0% | | | | | | | | | | 3.4% | | 2.4% | |
| 30 a 34 | 1.0% | | | | | | 10.0% | | | | | | | 2.2% |
| 35 a 39 | 0.5% | | | | | | | | | | 3.4% | | | |
| 40 a 44 | 0.5% | | | | | | | | | | 3.4% | | | |
| 45 a 49 | 1.0% | | | | | | | | | 33.3% | 3.4% | | | |
| 50 a 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | 0.5% | | | | | | | | | | | | 2.4% | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 73.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| METANFETAMINAS | 3,041 | 39 | 27 | 274 | 589 | 58 | 91 | 79 | 59 | 148 | 514 | 156 | 624 | 383 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 84.2% | 94.9% | 77.8% | 56.9% | 96.9% | 89.7% | 72.5% | 84.8% | 78.0% | 87.8% | 86.4% | 79.5% | 82.5% | 86.7% |
| Menor efecto que antes | 74.3% | 97.4% | 29.6% | 40.1% | 83.7% | 63.8% | 45.1% | 70.9% | 39.0% | 52.0% | 80.5% | 80.1% | 80.1% | 88.3% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 74.0% | 92.3% | 22.2% | 50.0% | 84.0% | 62.1% | 38.5% | 70.9% | 33.9% | 55.4% | 78.4% | 74.4% | 80.0% | 85.6% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 79.7% | 94.9% | 81.5% | 79.9% | 93.2% | 69.0% | 64.8% | 75.9% | 78.0% | 82.4% | 77.8% | 66.7% | 74.0% | 79.4% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 62.6% | 92.3% | 25.9% | 32.8% | 79.6% | 44.8% | 44.0% | 68.4% | 22.0% | 37.2% | 68.7% | 55.8% | 64.3% | 71.0% |



Cuadro No. 73.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| METANFETAMINAS | 3,041 | 39 | 27 | 274 | 589 | 58 | 91 | 79 | 59 | 148 | 514 | 156 | 624 | 383 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 84.5% | 97.4% | 96.3% | 82.1% | 96.4% | 53.4% | 82.4% | 81.0% | 83.1% | 87.8% | 84.0% | 82.1% | 77.9% | 83.0% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 70.9% | 92.3% | 37.0% | 36.5% | 82.5% | 46.6% | 72.5% | 65.8% | 30.5% | 44.6% | 78.2% | 75.0% | 74.5% | 81.2% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 81.9% | 94.9% | 88.9% | 76.6% | 95.2% | 53.4% | 51.6% | 63.3% | 62.7% | 84.5% | 80.7% | 80.1% | 81.9% | 82.8% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 72.5% | 92.3% | 25.9% | 58.8% | 80.8% | 75.9% | 73.6% | 77.2% | 37.3% | 44.6% | 71.8% | 65.4% | 77.1% | 81.7% |



Cuadro No. 73.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| METANFETAMINAS | 3,041 | 39 | 27 | 274 | 589 | 58 | 91 | 79 | 59 | 148 | 514 | 156 | 624 | 383 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 66.1% | 92.3% | 74.1% | 25.9% | 91.7% | 53.4% | 42.9% | 44.3% | 59.3% | 64.9% | 69.5% | 55.1% | 64.6% | 67.9% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 68.6% | 97.4% | 18.5% | 56.6% | 81.2% | 58.6% | 50.5% | 58.2% | 37.3% | 40.5% | 71.8% | 63.5% | 69.2% | 78.9% |
| Descuido de actividades | 73.8% | 92.3% | 37.0% | 53.3% | 84.2% | 55.2% | 51.6% | 63.3% | 25.4% | 55.4% | 79.8% | 71.8% | 75.0% | 88.8% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 55.5% | 89.7% | 77.8% | 47.4% | 71.1% | 29.3% | 37.4% | 45.6% | 42.4% | 54.1% | 60.9% | 47.4% | 45.2% | 58.0% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 59.2% | 87.2% | 77.8% | 48.9% | 60.3% | 24.1% | 45.1% | 48.1% | 30.5% | 54.7% | 64.0% | 55.1% | 64.9% | 63.4% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 80.3% | 84.6% | 92.6% | 84.7% | 76.4% | 74.1% | 64.8% | 83.5% | 81.4% | 89.9% | 78.6% | 84.6% | 78.8% | 84.9% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 79.0% | 84.6% | 92.6% | 84.3% | 66.0% | 75.9% | 75.8% | 83.5% | 79.7% | 85.8% | 83.1% | 84.6% | 77.7% | 85.6% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 74 EDAD DE INICIO EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Edad de Inicio | 3,041 | 39 | 27 | 274 | 589 | 58 | 91 | 79 | 59 | 148 | 514 | 156 | 624 | 383 |
| 5 a 9 | 0.1% | | | | 0.2% | | | | | | 0.6% | | | |
| 10 a 14 | 10.7% | 10.3% | 11.1% | 14.2% | 7.0% | 8.6% | 15.4% | 13.9% | 33.9% | 8.1% | 11.7% | 8.3% | 11.2% | 8.4% |
| 15 a 19 | 45.6% | 46.2% | 37.0% | 43.1% | 55.3% | 48.3% | 45.1% | 46.8% | 45.8% | 39.9% | 42.4% | 39.7% | 45.8% | 40.7% |
| 20 a 24 | 19.5% | 20.5% | 22.2% | 20.1% | 20.5% | 25.9% | 14.3% | 8.9% | 11.9% | 21.6% | 18.7% | 20.5% | 19.1% | 21.4% |
| 25 a 29 | 10.2% | 5.1% | 7.4% | 10.9% | 6.6% | 12.1% | 8.8% | 13.9% | 6.8% | 15.5% | 10.3% | 14.7% | 10.4% | 11.2% |
| 30 a 34 | 6.1% | 5.1% | 11.1% | 5.8% | 4.9% | 3.4% | 6.6% | 7.6% | | 8.1% | 7.4% | 6.4% | 5.1% | 7.6% |
| 35 a 39 | 3.7% | 10.3% | 3.7% | 2.6% | 2.0% | | 5.5% | 2.5% | 1.7% | 3.4% | 4.9% | 4.5% | 4.3% | 4.7% |
| 40 a 44 | 2.6% | | 7.4% | 2.2% | 2.4% | 1.7% | 1.1% | 5.1% | | 2.0% | 2.7% | 3.2% | 2.6% | 3.4% |
| 45 a 49 | 1.0% | 2.6% | | 1.1% | 0.5% | | 2.2% | 1.3% | | | 0.6% | 1.9% | 1.0% | 1.8% |
| 50 a 54 | 0.4% | | | | 0.3% | | 1.1% | | | 1.4% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.5% |
| 55 a 59 | 0.1% | | | | 0.2% | | | | | | 0.2% | | | 0.3% |
| 60 a 64 | 0.0% | | | | | | | | | | | | 0.2% | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SEXO FEMENINO Y POR REGIÓN SANITARIA

**Cuadro No. 75 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 QUE PREFIEREN EL ANONIMATO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Número | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Anónimo | | | | | | | | | | | | | | |
| Si | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 62.7% | 26.2% |
| No | 88.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.0% | 100% | 37.3% | 73.8% |

**Cuadro No. 76 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON EMBARAZO DURANTE EL TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Embarazo | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Si | 1.9% | 0.0% | 2.2% | 0.7% | 1.5% | 7.1% | 6.3% | 0.0% | 3.4% | 0.9% | 0.0% | 7.4% | 2.0% | 1.4% |
| No | 98.1% | 100% | 97.8% | 99.3% | 98.5% | 92.9% | 93.8% | 100% | 96.6% | 99.1% | 100% | 92.6% | 98.0% | 98.6% |
| No respuesta | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 77 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN EDAD EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Edad de afluencia | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| 5 a 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 a 14 | 15.8% | 25.6% | 37.8% | 24.5% | 3.0% | 50.0% | 3.1% | 32.0% | 31.0% | 13.1% | 6.0% | 8.4% | 20.6% | 12.1% |
| 15 a 19 | 37.3% | 44.2% | 33.3% | 36.7% | 29.9% | 42.9% | 21.9% | 28% | 48.3% | 42.1% | 34.9% | 47.4% | 43.1% | 33.2% |
| 20 a 24 | 16.9% | 16.3% | 6.7% | 13.6% | 25.4% | 7.1% | 21.9% | 8.0% | 6.9% | 18.7% | 23.5% | 16.8% | 13.7% | 17.3% |
| 25 a 29 | 8.3% | 4.7% | 4.4% | 8.8% | 16.4% | 0.0% | 15.6% | 0.0% | 6.9% | 11.2% | 10.1% | 9.5% | 2.9% | 7.0% |
| 30 a 34 | 6.5% | 2.3% | 6.7% | 4.1% | 14.9% | 0.0% | 12.5% | 20% | 3.4% | 5.6% | 6.0% | 4.2% | 3.9% | 7.9% |
| 35 a 39 | 3.3% | 4.7% | 4.4% | 0.7% | 3.0% | 0.0% | 12.5% | 8.0% | 3.4% | 4.7% | 3.4% | 3.2% | 2.0% | 2.8% |
| 40 a 44 | 3.8% | 0.0% | 2.2% | 4.8% | 4.5% | 0.0% | 3.1% | 4.0% | 0.0% | 1.9% | 6.7% | 3.2% | 2.0% | 5.1% |
| 45 a 49 | 3.1% | 0.0% | 2.2% | 3.4% | 3.0% | 0.0% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 4.7% | 5.3% | 2.0% | 3.3% |
| 50 a 54 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 2.1% | 3.9% | 3.3% |
| 55 a 59 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.0% | 0.0% | 4.9% | 3.3% |
| 60 a 64 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.3% | 0.0% | 1.0% | 1.9% |
| 65 a > | 0.8% | 2.3% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 78.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Estado. | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guanajuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalisco | 1,066 | 42 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 105 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michoacán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nayarit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 78.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacatecas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro País | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 79.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio de Residencia | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Acatic | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Acatlán de Juárez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ahualulco del Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amacueca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amatitán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ameca | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Juanito de Escobedo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arandas | 83 | 0 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Arenal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atemajac de Brizuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atengo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenguillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atotonilco el Alto | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atoyac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autlán de Navarro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 79.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio de Residencia | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Ayotlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayutla | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barca | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolaños | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Corrientes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Casimiro Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cihuatlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotlán El Grande | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cocula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colotlán | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concepción de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuautitlán de García Barragán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuautla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuquío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 79.3: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio de Residencia | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Chapala | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chimaltitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiquilistlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Degollado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ejutla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Encarnación de Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etzatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grullo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guachinango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 210 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 42 | 14 | 18 | 125 |
| Hostotipaquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejúcar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejuquilla el Alto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huerta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 79.4: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio de Residencia | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Ixtlahuacán del Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalostotitlán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamay | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús María | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jilotlán de los Dolores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocotepec | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Juanacatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juchitlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lagos de Moreno | 20 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Limón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santa María del Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzanilla de la Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mascota | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazamitla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexticacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 79.5: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio de Residencia | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Mezquitic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixtlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocotlán | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ojuelos de Jalisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pihuamo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poncitlán | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Vallarta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Villa Purificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quitupan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| San Cristóbal de la Barranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego de Alejandría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan de los Lagos | 36 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Julián | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 79.6: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio de Residencia | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| San Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Bolaños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Miguel el Alto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gómez Farías | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Sebastián del Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa María de los Ángeles | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayula | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Talpa de Allende | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tamazula de Gordiano | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tapalpa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 79.7: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio de Residencia | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Tecalitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tecolotlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Techaluta de Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenamaxtlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teocaltiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teocuitatlán de Corona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tepatitlán de Morelos | 40 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tequila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teuchitlán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tizapán el Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | 17 |
| San Pedro Tlaquepaque | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 35 | 18 |
| Tolimán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonalá | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 14 | 9 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 79.8: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio de Residencia | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Tonaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totatiche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tototlán | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxcacuesco | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxcueca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxpan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unión de San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unión de Tula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle de Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle de Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Guerrero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañadas de Obregón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 79.9: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | Total | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio de Residencia | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Yahualica de González Gallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zacoalco de Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapopan | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 5 | 3 | 24 |
| Zapotiltic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotitlán de Vadillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotlán del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zapotlanejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipios de Otros Estados | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 80 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Ocupación Principal | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Estudiante de tiempo completo | 33.0% | 74.4% | 40.0% | 34.7% | 9.0% | 71.4% | 9.4% | 48.0% | 55.2% | 38.3% | 28.9% | 28.4% | 32.4% | 28.5% |
| Estudiante con actividad laboral | 7.6% | 7.0% | 22.2% | 14.3% | 1.5% | 7.1% | 3.1% | 0.0% | 20.7% | 10.3% | 6.0% | 6.3% | 5.9% | 2.8% |
| Tiene empleo estable > 6 meses | 16.6% | 2.3% | 13.3% | 13.6% | 65.7% | 0.0% | 37.5% | 12.0% | 10.3% | 13.1% | 11.4% | 14.7% | 10.8% | 15.0% |
| Tiene menos de 6 meses | 8.5% | 2.3% | 2.2% | 2.7% | 9.0% | 14.3% | 3.1% | 20.0% | 3.4% | 9.3% | 10.1% | 7.4% | 9.8% | 13.1% |
| Desempleado (busca empleo) | 6.2% | 2.3% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 18.1% | 9.5% | 6.9% | 7.5% |
| Desocupado (no busca empleo) | 12.3% | 4.7% | 2.2% | 20.4% | 3.0% | 7.1% | 9.4% | 12.0% | 0.0% | 14.0% | 8.7% | 10.5% | 21.6% | 14.0% |
| Hogar | 14.3% | 7.0% | 13.3% | 14.3% | 11.9% | 0.0% | 34.4% | 8.0% | 10.3% | 11.2% | 11.4% | 20.0% | 12.7% | 17.8% |
| Pensionado | 0.6% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
| No aplica | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| Otra | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.1% | 0.0% | 0.5% |
| No sabe | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 81 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Grado Máximo de Estudios | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Primaria | 17.9% | 4.7% | 20.0% | 12.2% | 38.8% | 0.0% | 9.4% | 12.0% | 6.9% | 8.4% | 17.4% | 17.9% | 27.5% | 22.4% |
| Secundaria | 49.7% | 46.5% | 60.0% | 49.0% | 41.8% | 57.1% | 34.4% | 56.0% | 44.8% | 43.0% | 51.0% | 52.6% | 48.0% | 54.7% |
| Escolaridad Técnica | 2.8% | 2.3% | 4.4% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 6.0% | 6.3% | 2.0% | 2.3% |
| Bachillerato | 23.9% | 27.9% | 15.6% | 32.7% | 17.9% | 42.9% | 43.8% | 28.0% | 44.8% | 40.2% | 17.4% | 21.1% | 16.7% | 14.5% |
| Licenciatura | 4.5% | 18.6% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 4.0% | 0.0% | 5.6% | 8.1% | 1.1% | 3.9% | 4.2% |
| Maestría/doc torado/ Especialidad | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No sabe leer ni escribir | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| Sabe leer y escribir | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 1.9% |
| No aplica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



**Cuadro No. 82 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO CIVIL GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Estado Civil | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Soltero | 74.6% | 79.1% | 80.0% | 76.2% | 65.7% | 92.9% | 62.5% | 80.0% | 89.7% | 80.4% | 73.2% | 75.8% | 75.5% | 69.2% |
| Casado | 9.5% | 9.3% | 11.1% | 8.8% | 20.9% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 3.4% | 8.4% | 7.4% | 5.3% | 7.8% | 14.5% |
| Unión Libre | 9.4% | 11.6% | 2.2% | 8.8% | 9.0% | 0.0% | 31.3% | 12.0% | 6.9% | 7.5% | 10.1% | 13.7% | 4.9% | 9.3% |
| Separado | 3.6% | 0.0% | 6.7% | 4.1% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 2.8% | 4.0% | 2.1% | 6.9% | 4.2% |
| Divorciado | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.7% | 1.1% | 2.0% | 0.0% |
| Viudo | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2.1% | 2.0% | 2.8% |
| No aplica | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 1.0% | 0.0% |

**Cuadro No. 83 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON ANTECEDENTE DE BÚSQUDA DE APOYO PARA TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Búsqueda de Apoyo | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Primera vez en el año | 91.4% | 100% | 95.6% | 98.0% | 73.1% | 92.9% | 84.4% | 100% | 96.6% | 100% | 89.9% | 83.2% | 91.2% | 89.7% |
| Ya había acudido en este año | 8.6% | 0.0% | 4.4% | 2.0% | 26.9% | 7.1% | 15.6% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 10.1% | 16.8% | 8.8% | 10.3% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 84 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE ACUDE A TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Número de veces | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Primera Vez | 79.0% | 95.3% | 82.2% | 83.7% | 74.6% | 92.9% | 84.4% | 96.0% | 82.8% | 75.7% | 71.8% | 78.9% | 84.3% | 73.4% |
| 2 a 4 | 18.8% | 4.7% | 17.8% | 14.3% | 23.9% | 7.1% | 15.6% | 4.0% | 13.8% | 18.7% | 24.2% | 20.0% | 13.7% | 25.2% |
| 5 a > | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 5.6% | 4.0% | 1.1% | 2.0% | 1.4% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 85 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN FORMA DE ACUDIR A TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Forma que acude al centro | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Voluntariamente | 45.8% | 41.9% | 26.7% | 47.6% | 14.9% | 7.1% | 78.1% | 64.0% | 20.7% | 19.6% | 63.1% | 63.2% | 42.2% | 53.3% |
| Indicación médica no psiquiátrica | 3.8% | 2.3% | 4.4% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 6.9% | 0.9% | 0.7% | 2.1% | 4.9% | 10.7% |
| Indicación médica psiquiátrica | 0.1% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Lo llevaron amigos o familiares | 25.4% | 0.0% | 6.7% | 4.8% | 83.6% | 14.3% | 18.8% | 0.0% | 6.9% | 39.3% | 29.5% | 15.8% | 31.4% | 29.0% |
| Indicación Legal | 2.0% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 1.1% | 2.9% | 3.7% |
| Escuela o trabajo | 22.8% | 55.8% | 55.6% | 45.6% | 1.5% | 71.4% | 3.1% | 32.0% | 65.5% | 40.2% | 2.7% | 17.9% | 17.6% | 3.3% |
| Otra (s) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 86 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN DROGA DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Drogas de inicio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Alcohol | 53.6% | 90.7% | 64.4% | 66.0% | 29.9% | 100% | 56.3% | 100% | 72.4% | 68.2% | 38.9% | 36.8% | 38.2% | 49.1% |
| Marihuana | 9.0% | 2.3% | 4.4% | 4.1% | 13.4% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 6.9% | 3.7% | 18.8% | 6.3% | 7.8% | 12.1% |
| Inhalantes | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 1.3% | 1.1% | 2.0% | 1.4% |
| Alucinógenos | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
| Heroína | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Opio/Morfina | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cocaína | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.7% | 1.1% | 0.0% | 1.4% |
| Tranquilizantes | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 1.1% | 0.0% | 0.5% |
| Barbitúricos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anfetaminas | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tabaco | 29.7% | 7.0% | 31.1% | 25.2% | 32.8% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 13.8% | 24.3% | 24.8% | 52.6% | 49.0% | 32.7% |
| Antidepresivos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Psicotrópicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pasta Base | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Metanfetamina/Cristal | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 23.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 11.4% | 1.1% | 2.0% | 1.9% |
| Flunitracepam | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Crack | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Refractil ofteno | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 87 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN EDAD DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Edad de Inicio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| 5 a 9 | 5.4% | 0.0% | 4.4% | 8.8% | 1.5% | 7.1% | 0.0% | 12.0% | 6.9% | 4.7% | 3.4% | 8.4% | 7.8% | 4.7% |
| 10 a 14 | 59.5% | 65.1% | 73.3% | 63.3% | 31.3% | 85.7% | 31.3% | 40% | 55.2% | 74.8% | 56.4% | 58.9% | 65.7% | 58.9% |
| 15 a 19 | 26.7% | 27.9% | 17.8% | 22.4% | 38.8% | 7.1% | 43.8% | 44% | 34.5% | 17.8% | 30.9% | 24.2% | 21.6% | 28.0% |
| 20 a 24 | 4.6% | 4.7% | 4.4% | 2.7% | 20.9% | 0.0% | 3.1% | 4.0% | 3.4% | 0.9% | 3.4% | 5.3% | 2.9% | 4.7% |
| 25 a 29 | 2.0% | 2.3% | 0.0% | 0.7% | 3.0% | 0.0% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 3.4% | 1.1% | 0.0% | 1.9% |
| 30 a 34 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 3.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.1% | 0.0% | 0.5% |
| 35 a 39 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.1% | 2.0% | 0.0% |
| 40 a 44 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 45 a 49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50 a 54 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 55 a 59 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 60 a 64 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65 a > | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 88 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Drogas de impacto | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Alcohol | 34.4% | 65.1% | 37.8% | 53.7% | 13.4% | 42.9% | 34.4% | 72.0% | 72.4% | 43.0% | 15.4% | 26.3% | 26.5% | 27.1% |
| Marihuana | 12.4% | 16.3% | 13.3% | 6.1% | 4.5% | 42.9% | 15.6% | 4.0% | 6.9% | 12.1% | 12.8% | 11.6% | 17.6% | 15.4% |
| Inhalantes | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.0% | 1.4% |
| Alucinógenos | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 0.0% | 14.5% |
| Heroína | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Opio/Morfina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cocaína | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.9% | 2.7% | 3.2% | 1.0% | 1.4% |
| Tranquilizantes | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 1.3% | 2.1% | 2.9% | 0.9% |
| Barbitúricos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anfetaminas | 2.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.4% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 1.3% | 6.3% | 0.0% | 0.0% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tabaco | 8.6% | 9.3% | 28.9% | 5.4% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 6.0% | 12.6% | 13.7% | 13.6% |
| Antidepresivos | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Psicotrópicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pasta Base | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| Metanfetamina/Cristal | 34.8% | 9.3% | 17.8% | 29.3% | 79.1% | 14.3% | 0.0% | 24.0% | 13.8% | 41.1% | 57.7% | 31.6% | 37.3% | 25.2% |
| Flunitracepam | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Crack | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 3.2% | 0.0% | 0.0% |
| Refractil ofteno | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 89.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Estado | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Aguascalientes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colima | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guanajuato | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalisco | 1,028 | 43 | 45 | 145 | 61 | 14 | 28 | 25 | 29 | 91 | 142 | 93 | 102 | 210 |
| México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michoacán | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 89.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Estado | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Nayarit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinaloa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro País | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 90.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Acatic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Acatlán de Juárez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ahualulco del Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amacueca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amatitán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ameca | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Juanito de Escobedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arandas | 80 | 0 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Arenal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atemajac de Brizuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenguillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atotonilco el Alto | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atoyac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autlán de Navarro | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayotlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 90.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Ayutla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barca | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolaños | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casimiro Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cihuatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotlán El Grande | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cocula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colotlán | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concepción de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuautilán de García Barragán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuautla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuquío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapala | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chimaltitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 90.3: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Chiquilistlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Degollado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ejutla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Encarnación de Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etzatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grullo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guachinango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 199 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 11 | 19 | 124 |
| Hostotipaquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejúcar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejuquilla el Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huerta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ixtlahuacán del Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalostotitlán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamay | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 90.4: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Jesús María | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jilotlán de los Dolores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocotepec | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Juanacatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juchitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagos de Moreno | 21 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Limón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santa María del Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzanilla de la Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mascota | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazamitla | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexicacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezquitic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixtlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocotlán | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ojuelos de Jalisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 90.5: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Pihuamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poncitlán | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Vallarta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Villa Purificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quitupan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| San Cristóbal de la Barranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego de Alejandría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan de los Lagos | 36 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Julián | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Bolaños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 90.6: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| San Miguel el Alto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gómez Farías | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Sebastián del Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa María de los Ángeles | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayula | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Talpa de Allende | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tamazula | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tapalpa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tecalitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tecolotlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Techaluta de Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenamaxtlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teocaltiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teocuitatlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tepatitlán de Morelos | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 90.7: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Tequila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teuchitlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tizapán el Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 14 |
| San Pedro Tlaquepaque | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 35 | 23 |
| Tolimán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonalá | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 14 | 8 |
| Tonaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totatiche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tototlán | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxcacuesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxcueca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxpan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unión de San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 90.8: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Unión de Tula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle de Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle de Juárez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Corona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Guerrero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañadas de Obregón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahualica de González Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacoalco de Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zapopan | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | 10 | 3 | 24 |
| Zapotiltic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotitlán de Vadillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotlán del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zapotlanejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 90.9: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Municipio | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun Otros Estados | 41 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 4 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 91 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON USO DE DROGAS INYECTADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Uso de drogas inyectadas | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Si | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 4.0% | 0.0% | 3.7% | 2.0% | 2.1% | 4.9% | 0.0% |
| No | 98.2% | 100% | 100% | 98.0% | 100% | 100% | 96.9% | 96.0% | 100% | 96.3% | 98.0% | 97.9% | 95.1% | 100% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

**Cuadro No. 92 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 QUE COMPARTE JERINGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-------------------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Ha compartido jeringas | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Si | 68.4% | | | 100% | | | 100% | 100% | | 50% | 100% | 0.0% | 60% | |
| No | 31.6% | | | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | 50% | 0.0% | 100% | 40% | |
| No sabe | | | | | | | | | | | | | | |
| No responde | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 93 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 USO DE JERINGA SIN USO PREVIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Usa jeringa sin uso previo | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Si | 10.5% | | | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | 50% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| No | 89.5% | | | 100% | | | 100% | 100% | | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| No sabe | 0.0% | | | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| No responde | 0.0% | | | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

**Cuadro No. 94 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 QUE CONSUME DROGAS COMBINADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Combina Drogas | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Si | 44.0% | 20.9% | 33.3% | 38.8% | 31.3% | 14.3% | 15.6% | 32.0% | 34.5% | 51.4% | 57.0% | 60.0% | 36.3% | 50.9% |
| No | 56.0% | 79.1% | 66.7% | 61.2% | 68.7% | 85.7% | 84.4% | 68.0% | 65.5% | 48.6% | 43.0% | 40.0% | 63.7% | 49.1% |



**Cuadro No. 95 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 QUE HAN CONDUCIDO BAJO EFECTO DE DROGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Conducción bajo efecto de drogas | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Si | 18.1% | 2.3% | 15.6% | 16.3% | 37.3% | 14.3% | 6.3% | 20.0% | 24.1% | 32.7% | 24.2% | 18.9% | 7.8% | 10.7% |
| No | 81.9% | 97.7% | 84.4% | 83.7% | 62.7% | 85.7% | 93.8% | 80.0% | 75.9% | 67.3% | 75.8% | 81.1% | 92.2% | 89.3% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

**Cuadro No. 96 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 QUE PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ASOCIADA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---------------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Padece alguna enfermedad | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| Si | 21.4% | 90.7% | 2.2% | 10.9% | 1.5% | 14.3% | 71.9% | 8.0% | 6.9% | 3.7% | 54.4% | 15.8% | 20.6% | 10.3% |
| No | 78.6% | 9.3% | 97.8% | 89.1% | 98.5% | 85.7% | 28.1% | 92.0% | 93.1% | 96.3% | 45.6% | 84.2% | 79.4% | 89.7% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 97 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 LUGAR DONDE CONSIGUE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Lugar donde consigue la droga de impacto | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| En su propia casa | 15.6% | 7.0% | 2.2% | 22.4% | 32.8% | 21.4% | 15.6% | 24.0% | 3.4% | 8.4% | 14.8% | 8.4% | 19.6% | 15.9% |
| Se la llevan a su casa | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 3.0% | 0.0% | 15.6% | 0.0% | 3.4% | 8.4% | 6.7% | 5.3% | 2.0% | 7.5% |
| En casa de un amigo o familiar | 14.9% | 14.0% | 33.3% | 16.3% | 4.5% | 14.3% | 12.5% | 4.0% | 20.7% | 14.0% | 16.1% | 12.6% | 19.6% | 12.6% |
| En la calle | 23.1% | 20.9% | 4.4% | 7.5% | 50.7% | 28.6% | 3.1% | 32.0% | 17.2% | 15.9% | 34.9% | 27.4% | 21.6% | 26.2% |
| En antros y bares | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 7.5% | 7.1% | 9.4% | 4.0% | 0.0% | 3.7% | 1.3% | 3.2% | 2.9% | 2.8% |
| En fiestas y reuniones | 16.1% | 46.5% | 11.1% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 16.0% | 27.6% | 31.8% | 15.4% | 8.4% | 17.6% | 7.5% |
| En la escuela | 0.8% | 2.3% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 3.4% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.4% |
| En el trabajo | 0.4% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 1.0% | 0.0% |
| En tiendas cercanas a mi casa | 15.5% | 9.3% | 46.7% | 14.3% | 1.5% | 28.6% | 34.4% | 12.0% | 17.2% | 12.1% | 8.7% | 20.0% | 11.8% | 18.2% |
| Parques | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0.5% |
| Picaderos | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 6.9% | 4.7% | 2.0% | 9.5% | 2.9% | 7.5% |
| Otro | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 98 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 LUGAR DONDE CONSUME GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Lugar donde consume la droga de impacto | 1,069 | 43 | 45 | 147 | 67 | 14 | 32 | 25 | 29 | 107 | 149 | 95 | 102 | 214 |
| La tiene en su casa | 30.9% | 20.9% | 31.1% | 40.1% | 32.8% | 21.4% | 18.8% | 28.0% | 20.7% | 24.3% | 31.5% | 25.3% | 26.5% | 37.4% |
| En casa de un amigo o familiar | 21.8% | 18.6% | 24.4% | 21.8% | 9.0% | 21.4% | 46.9% | 4.0% | 17.2% | 22.4% | 29.5% | 18.9% | 21.6% | 20.6% |
| En la vía pública (calles, parques) | 20.1% | 18.6% | 20.0% | 6.1% | 49.3% | 35.7% | 9.4% | 12.0% | 27.6% | 4.7% | 16.1% | 28.4% | 30.4% | 23.4% |
| En antros y bares | 4.4% | 0.0% | 6.7% | 6.1% | 7.5% | 7.1% | 18.8% | 8.0% | 0.0% | 3.7% | 2.7% | 5.3% | 2.0% | 2.8% |
| En fiestas y reuniones | 17.1% | 39.5% | 13.3% | 23.1% | 1.5% | 14.3% | 3.1% | 44.0% | 27.6% | 33.6% | 16.1% | 10.5% | 14.7% | 8.4% |
| En la escuela | 1.3% | 2.3% | 2.2% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.9% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 1.4% |
| En el trabajo | 1.0% | 0.0% | 2.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 1.9% | 0.7% | 1.1% | 1.0% | 1.4% |
| En picaderos | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 4.0% | 0.0% | 7.5% | 1.3% | 10.5% | 1.0% | 4.2% |
| Otro | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.5% |
| No sabe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| No responde | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



| Cuadro No. 99.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| ALCOHOL | 368 | 28 | 17 | 79 | 9 | 6 | 11 | 18 | 21 | 46 | 23 | 25 | 27 | 58 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 75.3% | 100% | 94.1% | 73.4% | 88.9% | 83.3% | 81.8% | 61.1% | 76.2% | 50.0% | 73.9% | 68.0% | 77.8% | 82.8% |
| Menor efecto que antes | 56.0% | 78.6% | 52.9% | 57.0% | 88.9% | 50.0% | 72.7% | 44.4% | 38.1% | 15.2% | 60.9% | 56.0% | 70.4% | 70.7% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 54.9% | 82.1% | 41.2% | 54.4% | 88.9% | 50.0% | 72.7% | 33.3% | 42.9% | 19.6% | 60.9% | 56.0% | 55.6% | 74.1% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 54.3% | 67.9% | 82.4% | 48.1% | 77.8% | 33.3% | 54.5% | 33.3% | 57.1% | 17.4% | 60.9% | 56.0% | 63.0% | 74.1% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 41.6% | 71.4% | 35.3% | 40.5% | 77.8% | 16.7% | 54.5% | 38.9% | 14.3% | 2.2% | 30.4% | 48.0% | 44.4% | 67.2% |



| Cuadro No. 99.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| ALCOHOL | 368 | 28 | 17 | 79 | 9 | 6 | 11 | 18 | 21 | 46 | 23 | 25 | 27 | 58 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 65.5% | 82.1% | 94.1% | 64.6% | 77.8% | 50.0% | 90.9% | 50.0% | 85.7% | 32.6% | 60.9% | 56.0% | 70.4% | 72.4% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 50.5% | 67.9% | 52.9% | 51.9% | 100% | 83.3% | 81.8% | 33.3% | 52.4% | 15.2% | 56.5% | 44.0% | 33.3% | 63.8% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 52.4% | 57.1% | 88.2% | 40.5% | 77.8% | 33.3% | 63.6% | 44.4% | 66.7% | 15.2% | 65.2% | 64.0% | 59.3% | 65.5% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 41.0% | 57.1% | 47.1% | 36.7% | 66.7% | 33.3% | 63.6% | 55.6% | 14.3% | 4.3% | 52.2% | 44.0% | 40.7% | 58.6% |



**Cuadro No. 99.3: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| ALCOHOL | 368 | 28 | 17 | 79 | 9 | 6 | 11 | 18 | 21 | 46 | 23 | 25 | 27 | 58 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 54.6% | 89.3% | 82.4% | 55.7% | 77.8% | 33.3% | 54.5% | 33.3% | 47.6% | 15.2% | 52.2% | 52.0% | 55.6% | 69.0% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 54.9% | 89.3% | 47.1% | 64.6% | 77.8% | 16.7% | 45.5% | 33.3% | 47.6% | 10.9% | 56.5% | 52.0% | 51.9% | 75.9% |
| Descuido de actividades | 58.4% | 92.9% | 47.1% | 65.8% | 88.9% | 33.3% | 36.4% | 44.4% | 33.3% | 10.9% | 65.2% | 60.0% | 63.0% | 82.8% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 53.3% | 85.7% | 82.4% | 54.4% | 77.8% | 66.7% | 18.2% | 33.3% | 33.3% | 19.6% | 65.2% | 40.0% | 59.3% | 67.2% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 54.1% | 89.3% | 76.5% | 64.6% | 77.8% | 16.7% | 18.2% | 33.3% | 33.3% | 17.4% | 65.2% | 32.0% | 55.6% | 70.7% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 64.4% | 89.3% | 88.2% | 70.9% | 77.8% | 50.0% | 63.6% | 38.9% | 57.1% | 19.6% | 78.3% | 60.0% | 63.0% | 79.3% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 64.4% | 92.9% | 82.4% | 70.9% | 77.8% | 66.7% | 63.6% | 50.0% | 57.1% | 19.6% | 82.6% | 56.0% | 59.3% | 75.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 100 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| ALCOHOL | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Edad de Inicio droga de impacto | 368 | 28 | 17 | 79 | 9 | 6 | 11 | 18 | 21 | 46 | 23 | 25 | 27 | 58 |
| 5 a 9 | 4.1% | | 5.9% | 6.3% | | 16.7% | | 5.6% | 4.8% | 2.2% | | 12.0% | | 3.4% |
| 10 a 14 | 62.5% | 71.4% | 82.4% | 64.6% | 33.3% | 83.3% | 18.2% | 44.4% | 52.4% | 82.6% | 52.2% | 40.0% | 81.5% | 58.6% |
| 15 a 19 | 24.5% | 25.0% | 5.9% | 20.3% | 22.2% | | 54.5% | 44.4% | 38.1% | 10.9% | 39.1% | 40.0% | 14.8% | 24.1% |
| 20 a 24 | 3.3% | | | 3.8% | 22.2% | | | 5.6% | 4.8% | | 4.3% | 4.0% | | 5.2% |
| 25 a 29 | 3.3% | 3.6% | | 1.3% | 11.1% | | 18.2% | | | 2.2% | 4.3% | 4.0% | | 6.9% |
| 30 a 34 | 0.8% | | | | 11.1% | | 9.1% | | | | | | | 1.7% |
| 35 a 39 | 0.5% | | 5.9% | | | | | | | | | | 3.7% | |
| 40 a 44 | 0.5% | | | 2.5% | | | | | | | | | | |
| 45 a 49 | 0.3% | | | | | | | | | 2.2% | | | | |
| 50 a 54 | 0.3% | | | 1.3% | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 101.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MARIHUANA | 133 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 19 | 11 | 18 | 33 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 72.2% | 100% | 100% | 77.8% | 33.3% | 33.3% | 40.0% | 100% | 100% | 46.2% | 84.2% | 81.8% | 55.6% | 81.8% |
| Menor efecto que antes | 64.7% | 100% | 66.7% | 77.8% | | 33.3% | 80.0% | 100% | 100% | 15.4% | 63.2% | 90.9% | 44.4% | 81.8% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 60.9% | 100% | 66.7% | 77.8% | | 33.3% | 40.0% | 100% | 50.0% | 15.4% | 57.9% | 100% | 38.9% | 78.8% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 55.6% | 100% | 83.3% | 55.6% | 33.3% | 33.3% | 40.0% | 100% | 100% | 23.1% | 63.2% | 54.5% | 44.4% | 60.6% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 42.1% | 100% | 33.3% | 33.3% | | 16.7% | 20.0% | | 50.0% | 23.1% | 36.8% | 63.6% | 33.3% | 54.5% |



**Cuadro No. 101.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MARIHUANA | 133 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 19 | 11 | 18 | 33 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 70.7% | 85.7% | 83.3% | 77.8% | 33.3% | 66.7% | 80.0% | | 100% | 46.2% | 84.2% | 63.6% | 66.7% | 72.7% |
| Ha consumido cantidad y tiempo del que pensaba | 54.1% | 100% | 66.7% | 66.7% | | 16.7% | 100% | 100% | 50.0% | 15.4% | 63.2% | 63.6% | 44.4% | 54.5% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 51.9% | 85.7% | 83.3% | 55.6% | 33.3% | | 40.0% | | 100% | 23.1% | 47.4% | 63.6% | 38.9% | 66.7% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 52.6% | 100% | 50.0% | 44.4% | | 16.7% | 40.0% | | 50.0% | 15.4% | 57.9% | 72.7% | 38.9% | 72.7% |



**Cuadro No. 101.3: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MARIHUANA | 133 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 19 | 11 | 18 | 33 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 48.1% | 100% | 83.3% | 44.4% | 33.3% | | 60.0% | | 50.0% | 23.1% | 42.1% | 36.4% | 27.8% | 69.7% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 47.4% | 100% | 50.0% | 44.4% | | 16.7% | 60.0% | | 50.0% | 7.7% | 47.4% | 54.5% | 38.9% | 63.6% |
| Descuido de actividades | 59.4% | 100% | 50.0% | 66.7% | | 33.3% | 40.0% | | 50.0% | 15.4% | 68.4% | 63.6% | 55.6% | 78.8% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 40.6% | 100% | 66.7% | 44.4% | 33.3% | 16.7% | 20.0% | | | 15.4% | 42.1% | 54.5% | 27.8% | 45.5% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 42.9% | 85.7% | 66.7% | 66.7% | | | 40.0% | | | 15.4% | 42.1% | 54.5% | 33.3% | 51.5% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 66.2% | 85.7% | 83.3% | 55.6% | 33.3% | | 80.0% | | 50.0% | 30.8% | 78.9% | 90.9% | 61.1% | 78.8% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 66.2% | 85.7% | 83.3% | 55.6% | | | 100% | | 50.0% | 30.8% | 78.9% | 90.9% | 55.6% | 81.8% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 102 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| MARIHUANA | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Edad de Inicio droga de impacto | 133 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 19 | 11 | 18 | 33 |
| 5 a 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 a 14 | 49.6% | 42.9% | 33.3% | 44.4% | 33.3% | 50.0% | 80.0% | 100% | 100% | 23.1% | 52.6% | 36.4% | 61.1% | 54.5% |
| 15 a 19 | 44.4% | 42.9% | 66.7% | 33.3% | 66.7% | 50.0% | | | | 76.9% | 42.1% | 63.6% | 33.3% | 39.4% |
| 20 a 24 | 4.5% | 14.3% | | | | | 20.0% | | | | 5.3% | | 5.6% | 6.1% |
| 25 a 29 | 0.8% | | | 11.1% | | | | | | | | | | |
| 30 a 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 a 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 a 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 a 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 a 54 | 0.8% | | | 11.1% | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 103.1 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN
 SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| INHALANTES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 80.0% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 66.7% |
| Menor efecto que antes | 80.0% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 66.7% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 80.0% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 66.7% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 80.0% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 66.7% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 100% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% |



**Cuadro No. 103.2 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN
 SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| INHALANTES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 80.0% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 66.7% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 40.0% | | | | | | | | | | | | 100% | 33.3% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 100% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 100% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% |



| Cuadro No. 103.3 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| INHALANTES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 40.0% | | | | | | | | | | | | 100% | 33.3% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 60.0% | | | | | | | | | | | | 100% | 66.7% |
| Descuido de actividades | 100% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 20.0% | | | | | | | | | | | | 100% | |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 40.0% | | | | | | | | | | | | 100% | 33.3% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 80.0% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 66.7% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 80.0% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 66.7% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 104 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|
| Edad de Inicio droga de impacto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 5 a 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 a 14 | 60.0% | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 33.3% |
| 15 a 19 | 20.0% | | | | | | | | | | | | | 33.3% |
| 20 a 24 | 20.0% | | | | | | | | | | | | | 33.3% |
| 25 a 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 a 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 a 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 a 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 a 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 a 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 105.1 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| COCAÍNA | 17 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 76.5% | | | 50.0% | | | | | 100% | 100% | 50.0% | 100% | 100% | 100% |
| Menor efecto que antes | 70.6% | | | 75.0% | | | | | 100% | 100% | 50.0% | 100% | 100% | 33.3% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 64.7% | | | 75.0% | | | | | 100% | 100% | 25.0% | 100% | 100% | 33.3% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 58.8% | | | 25.0% | | | | | 100% | | 50.0% | 100% | 100% | 66.7% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 64.7% | | | 50.0% | | | | | 100% | | 50.0% | 100% | 100% | 66.7% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 105.2 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| COCAÍNA | 17 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 76.5% | | | 75.0% | | | | | 100% | 100% | 75.0% | 100% | | 66.7% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 58.8% | | | 50.0% | | | | | 100% | | 50.0% | 66.7% | | 100% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 82.4% | | | 75.0% | | | | | 100% | 100% | 75.0% | 66.7% | 100% | 100% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 52.9% | | | 50.0% | | | | | 100% | | 50.0% | 66.7% | 100% | 33.3% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 105.3 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| COCAÍNA | 17 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 58.8% | | | 50.0% | | | | | 100% | 100% | 25.0% | 33.3% | 100% | 100% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 58.8% | | | 75.0% | | | | | 100% | | 75.0% | 66.7% | | 33.3% |
| Descuido de actividades | 70.6% | | | 75.0% | | | | | 100% | | 75.0% | 100% | | 66.7% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 64.7% | | | | | | | | 100% | 100% | 75.0% | 100% | 100% | 66.7% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 64.7% | | | 50.0% | | | | | 100% | 100% | 50.0% | 100% | 100% | 33.3% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 88.2% | | | 75.0% | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.7% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 70.6% | | | 75.0% | | | | | 100% | 100% | 50.0% | 100% | 100% | 33.3% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 106 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Edad de Inicio droga de impacto | 17 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 a 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 a 14 | 41.2% | | | 50.0% | | | | | 100% | | 75.0% | 33.3% | | |
| 15 a 19 | 41.2% | | | 50.0% | | | | | | 100% | 25.0% | 33.3% | | 66.7% |
| 20 a 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 a 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 a 34 | 5.9% | | | | | | | | | | | | 100% | |
| 35 a 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 a 44 | 11.8% | | | | | | | | | | | 33.3% | | 33.3% |
| 45 a 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 a 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |
| S/D | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 107.1 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| TABACO | 92 | 4 | 13 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 | 12 | 14 | 29 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 87.0% | 100% | 100% | 50.0% | | | | | | 100% | 88.9% | 91.7% | 92.9% | 89.7% |
| Menor efecto que antes | 75.0% | 100% | 61.5% | 50.0% | | | | | | | 66.7% | 75.0% | 85.7% | 89.7% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 71.7% | 100% | 61.5% | 50.0% | | | | | | | 66.7% | 66.7% | 78.6% | 86.2% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 72.8% | 100% | 100% | 37.5% | 50.0% | | | | | 100% | 77.8% | 50.0% | 50.0% | 86.2% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 55.4% | 100% | 61.5% | 37.5% | | | | | | | 44.4% | 33.3% | 50.0% | 72.4% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 107.2 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| TABACO | 92 | 4 | 13 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 | 12 | 14 | 29 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 73.9% | 100% | 92.3% | 50.0% | | | | | | | 66.7% | 41.7% | 64.3% | 96.6% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 62.0% | 100% | 61.5% | 62.5% | | | | | | 100% | 77.8% | 33.3% | 50.0% | 72.4% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 68.5% | 100% | 100% | 50.0% | | | | | | 100% | 66.7% | 41.7% | 57.1% | 75.9% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 59.8% | 100% | 61.5% | 62.5% | | | | | | | 44.4% | 33.3% | 50.0% | 79.3% |



| Cuadro No. 107.3 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| TABACO | 92 | 4 | 13 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 | 12 | 14 | 29 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 59.8% | 100% | 100% | 37.5% | | | | | | 100% | 44.4% | 25.0% | 42.9% | 72.4% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 50.0% | 100% | 53.8% | 37.5% | | | | | | | 44.4% | 25.0% | 28.6% | 72.4% |
| Descuido de actividades | 53.3% | 100% | 53.8% | 37.5% | | | | | | | 44.4% | 41.7% | 28.6% | 75.9% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 56.5% | 100% | 92.3% | 37.5% | | | | | | 100% | 55.6% | 25.0% | 28.6% | 69.0% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 65.2% | 100% | 92.3% | 50.0% | | | | | | 100% | 55.6% | 50.0% | 35.7% | 79.3% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 65.2% | 100% | 100% | 50.0% | 50.0% | | | | | 100% | 55.6% | 25.0% | 42.9% | 79.3% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 72.8% | 100% | 100% | 50.0% | 50.0% | | | | | 100% | 66.7% | 41.7% | 50.0% | 89.7% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 108 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|---------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Edad de Inicio | 92 | 4 | 13 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 | 12 | 14 | 29 |
| 5 a 9 | 4.3% | | | 12.5% | 50.0% | | | | | | 11.1% | | | 3.4% |
| 10 a 14 | 52.2% | 50.0% | 61.5% | 62.5% | 50.0% | | | | | | 33.3% | 66.7% | 42.9% | 51.7% |
| 15 a 19 | 23.9% | 25.0% | 23.1% | 12.5% | | | | | | | 33.3% | 25.0% | 28.6% | 24.1% |
| 20 a 24 | 10.9% | 25.0% | 15.4% | | | | | | | 100% | 11.1% | | 14.3% | 10.3% |
| 25 a 29 | 2.2% | | | | | | | | | | | | 7.1% | 3.4% |
| 30 a 34 | 2.2% | | | 12.5% | | | | | | | | 8.3% | | |
| 35 a 39 | 3.3% | | | | | | | | | | 11.1% | | 7.1% | 3.4% |
| 40 a 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 a 49 | 1.1% | | | | | | | | | | | | | 3.4% |
| 50 a 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



**Cuadro No. 109.1 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN
 SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|--|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MET-ANFETAMINAS | 372 | 4 | 8 | 43 | 53 | 2 | - | 6 | 4 | 44 | 86 | 30 | 38 | 54 |
| TOLERANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Usa mayor cantidad | 82.5% | 100% | 62.5% | 79.1% | 96.2% | 100% | | 100% | 50.0% | 97.7% | 81.4% | 83.3% | 76.3% | 66.7% |
| Menor efecto que antes | 71.2% | 100% | 50.0% | 62.8% | 88.7% | 50.0% | | 66.7% | 25.0% | 63.6% | 68.6% | 83.3% | 68.4% | 72.2% |
| Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto | 70.2% | 100% | 50.0% | 69.8% | 88.7% | 50.0% | | 83.3% | | 63.6% | 67.4% | 86.7% | 63.2% | 63.0% |
| COMPULSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo | 77.7% | 100% | 50.0% | 74.4% | 96.2% | 100% | | 100% | 100% | 95.5% | 75.6% | 66.7% | 57.9% | 68.5% |
| Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más | 59.4% | 100% | 37.5% | 44.2% | 88.7% | 50.0% | | 83.3% | | 54.5% | 60.5% | 53.3% | 52.6% | 55.6% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 109.2 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
| MET-ANFETAMINAS | 372 | 4 | 8 | 43 | 53 | 2 | - | 6 | 4 | 44 | 86 | 30 | 38 | 54 |
| DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha querido suspender o disminuir el consumo | 86.6% | 100% | 62.5% | 90.7% | 94.3% | 50.0% | | 83.3% | 75.0% | 97.7% | 86.0% | 83.3% | 78.9% | 79.6% |
| Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía | 64.0% | 100% | 37.5% | 44.2% | 86.8% | | | 83.3% | 25.0% | 61.4% | 66.3% | 46.7% | 68.4% | 66.7% |
| ABSTINENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Malestar por suspender | 84.9% | 100% | 62.5% | 79.1% | 96.2% | 50.0% | | 100% | 75.0% | 93.2% | 91.9% | 73.3% | 71.1% | 79.6% |
| Consumo de otra sustancia para evitar el malestar | 68.0% | 100% | 50.0% | 67.4% | 86.8% | 50.0% | | 100% | 25.0% | 56.8% | 72.1% | 56.7% | 57.9% | 66.7% |



**Cuadro No. 109.3 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN
 SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|---|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MET-ANFETAMINAS | 372 | 4 | 8 | 43 | 53 | 2 | - | 6 | 4 | 44 | 86 | 30 | 38 | 54 |
| REDUCCIÓN PROGRESIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor tiempo en conseguir | 61.6% | 100% | 37.5% | 39.5% | 94.3% | 50.0% | | 83.3% | 75.0% | 70.5% | 74.4% | 30.0% | 36.8% | 51.9% |
| Mayor tiempo de uso y/o recuperación | 60.2% | 100% | 37.5% | 58.1% | 88.7% | 50.0% | | 66.7% | | 61.4% | 58.1% | 40.0% | 57.9% | 53.7% |
| Descuido de actividades | 71.8% | 100% | 62.5% | 69.8% | 90.6% | 50.0% | | 66.7% | | 63.6% | 72.1% | 66.7% | 65.8% | 74.1% |
| USO PERSISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas de salud, sobredosis | 54.0% | 100% | 62.5% | 9.3% | 90.6% | | | 100% | 25.0% | 70.5% | 55.8% | 53.3% | 44.7% | 38.9% |
| Continuó usando a pesar de esos problemas | 61.8% | 100% | 62.5% | 76.7% | 84.9% | | | 100% | 25.0% | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 47.4% | 50.0% |
| Ha tenido problemas psicológicos o sociales | 82.8% | 75.0% | 87.5% | 79.1% | 96.2% | 50.0% | | 100% | 75.0% | 100% | 77.9% | 83.3% | 73.7% | 72.2% |
| Continúa usando a pesar de esos problemas | 80.4% | 75.0% | 87.5% | 86.0% | 90.6% | 50.0% | | 100% | 75.0% | 100% | 69.8% | 76.7% | 68.4% | 75.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 110 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

| | General | RS-I | RS-II | RS-III | RS-IV | RS-V | RS-VI | RS-VII | RS-VIII | RS-IX | RS-X | RS-XI | RS-XII | RS-XIII |
|-----------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Edad de Inicio | 372 | 4 | 8 | 43 | 53 | 2 | - | 6 | 4 | 44 | 86 | 30 | 38 | 54 |
| 5 a 9 | 0.3% | | | | | | | | | 2.3% | | | | |
| 10 a 14 | 17.5% | 50.0% | | 4.7% | 3.8% | 50.0% | | 16.7% | 75.0% | 9.1% | 20.9% | 30.0% | 34.2% | 18.5% |
| 15 a 19 | 46.8% | 25.0% | 62.5% | 58.1% | 56.6% | | | 50.0% | 25.0% | 45.5% | 41.9% | 33.3% | 52.6% | 42.6% |
| 20 a 24 | 16.7% | | 37.5% | 16.3% | 24.5% | 50.0% | | 16.7% | | 20.5% | 16.3% | 13.3% | 7.9% | 13.0% |
| 25 a 29 | 7.8% | 25.0% | | 11.6% | 3.8% | | | | | 11.4% | 10.5% | 13.3% | | 5.6% |
| 30 a 34 | 4.8% | | | 4.7% | 7.5% | | | 16.7% | | 4.5% | 5.8% | 3.3% | | 5.6% |
| 35 a 39 | 1.9% | | | 2.3% | | | | | | 4.5% | 1.2% | | | 5.6% |
| 40 a 44 | 2.7% | | | 2.3% | 1.9% | | | | | 2.3% | 3.5% | 6.7% | | 3.7% |
| 45 a 49 | 1.1% | | | | | | | | | | | | 5.3% | 3.7% |
| 50 a 54 | 0.3% | | | | | | | | | | | | | 1.9% |
| 55 a 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 a 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 a > | | | | | | | | | | | | | | |



INDICADOR: PUESTO CENTINELA DE URGENCIAS

En este indicador del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, tiene el objetivo de conocer el porcentaje de personas que acuden a un servicio médico de urgencias, que ingresan por algún padecimiento médico o lesión de causa externa.

Este indicador se aplica en 2 semanas durante el año, ubicadas en los meses de junio y noviembre del 2018.

En este año se registró una participación moderada por los servicios médicos de urgencias y la muestra se analizará en forma numérica y se describirán en proporciones porcentuales a través de las variables que se encuentran en la cédula, la cual fue modificada en marzo del 2017 se aplicó por personal médico de cada una de las unidades de urgencias.

En este indicador el instrumento contiene las siguientes secciones con las siguientes variables

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS.

Fecha de elaboración del instrumento.

Edad del paciente

Entidad de residencia y municipio de residencia.

Fecha de Nacimiento

Edad

Sexo y en el caso del femenino se pregunta si hay embarazo.

Nombre aunque no se utilizará para ningún fin solo de tipo estadístico.

Ocupación principal del paciente

Estudiante de tiempo completo

Estudiante con actividad laboral

Tiene empleo estable en más de 6 meses.

Tiene menos de 6 meses en el actual empleo

Desempleado (busca empleo)

Desocupado (no busca empleo)

Hogar

Pensionado



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



No aplica
Otra
No sabe
No responde

Grado máximo de estudios

Primaria
Secundaria
Escolaridad técnica
Bachillerato
Licenciatura
Maestría / Doctorado / Especialidad

No sabe leer ni escribir
Sabe leer y escribir

No aplica
No sabe
No responde

Estado Civil

Soltero
Casado
Unión Libre
Separado
Divorciado
Viudo

No aplica
No sabe
No responde

La ubicación de la Unidad de Urgencias por Región o Jurisdicción sanitaria.

I Colotlán
II Lagos de Moreno
III Tepatlán
IV La Barca



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



- V Tamazula de Gordiano
- VI Zapotlán el Grande
- VII Autlán de Navarro
- VIII Puerto Vallarta
- IX Ameca
- X Zapopan
- XI Tonalá
- XII San Pedro Tlaquepaque
- XIII Guadalajara

Para los estados y municipios se utiliza las claves del INEGI de los 32 estados y 125 municipios de Jalisco



CONSUMO DE SUSTANCIAS

Se observa si clínicamente el paciente llegó bajo efecto de alguna sustancia o droga y se pregunta si o no. En el caso de que la respuesta sea afirmativa se anotan cuales fueron, dando oportunidad hasta 5 drogas.

Si llegó por **Lesión de Causa Externa** se toman las siguientes variables.

Atropellado, Accidente Automovilístico, Caída, trauma por objeto contundente o persona, aplastamiento, proyectil de arma de fuego, objetos punzocortantes o punzocontundentes, maquinaria, piquete o mordedura, quemaduras por fuego o quemadura química, sustancias líquidas, sólidas o gaseosas, corriente eléctrica, asfixia o sofocación, intoxicación o envenenamiento; sustancias, vapor u objetos calientes, congelamiento, sobredosis accidental, sobredosis autoinflingida (suicidio) y envenenamiento suicida.

Lugar donde ocurre la lesión con las siguientes variables

Hogar, escuela, vía pública, sitio de recreación, trabajo, otro y se desconoce

Si el Ingreso a urgencias por **patología de base** se toma los siguientes rubros.

Bronquitis/enfisema/asma, cáncer de tráquea/bronquios/pulmón, enfermedades del corazón, hipertensión, afección neurológica, cirrosis / gastritis, urgencias quirúrgicas, psicosis alcohólica/sustancias (drogas).

Consumo de algún tipo de sustancia(s), droga(s) incluyendo alcohol y tabaco.

PATRÓN DE CONSUMO

Si el paciente refiere consumir alguna sustancia se preguntará en orden cronológico desde la droga de inicio a un total de diez drogas, preguntando consumo durante el último año, edad de que la usó, forma de administración, patrón de consumo actual y el número de veces en el consumo.

Las **formas de administración** se toman las siguientes variables.

Fumada, inhalada, intranasal (esnifada), inyectada, tópica, otras mucosas, ingerida, masticada, otra vía, no sabe o no responde.

Consumo actual es el patrón diario, semanal, mensual y anual así como el número de veces que la consume.



DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

| Cuadro No. 1 PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS POR REGIÓN SANITARIA GENERAL Y SEXO | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Región Sanitaria | 1092 | 634 | 458 |
| Región Sanitaria I Colotlán | 13.6% | 10.9% | 17.2% |
| Región Sanitaria II Lagos de Moreno | 2.4% | 3.0% | 1.5% |
| Región Sanitaria III Tepatlán de Morelos | 8.1% | 7.6% | 8.7% |
| Región Sanitaria IV La Barca | 1.4% | 1.1% | 1.7% |
| Región Sanitaria V Tamazula | 3.3% | 2.8% | 3.9% |
| Región Sanitaria VI Zapotlán | 26.9% | 24.0% | 31.0% |
| Región Sanitaria VII Autlán de Navarro | 1.9% | 2.4% | 1.3% |
| Región Sanitaria VIII Puerto Vallarta | 5.5% | 4.6% | 6.8% |
| Región Sanitaria IX Ameca | 3.2% | 3.3% | 3.1% |
| Región Sanitaria X Zapopan | 10.3% | 11.2% | 9.2% |
| Región Sanitaria XI Tonalá | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Región Sanitaria XII San Pedro Tlaquepaque | 9.4% | 9.3% | 9.6% |
| Región Sanitaria XIII Guadalajara | 14.0% | 19.9% | 5.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 2 PACIENTES ATENDIDOS EN SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS SEGÚN GÉNERO | | |
|---|---------------|-------------------|
| Género | Número | Porcentaje |
| Masculino | 634 | 58% |
| Femenino | 458 | 42% |
| Total | 1092 | 100% |

| Cuadro No. 3 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDAS EN SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS SEGÚN EMBARAZO | | |
|---|---------------|-------------------|
| Embarazo | Número | Porcentaje |
| Si | 25 | 5.5% |
| No | 433 | 94.5% |
| Total | 458 | 100% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 4 EDAD EN QUE ACUDE A SOLICITAR UN SERVICIO DE URGENCIAS GENERAL Y POR SEXO | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Región Sanitaria | 1092 | 634 | 458 |
| 5 a 9 | 1.1% | 1.4% | 0.7% |
| 10 a 14 | 2.9% | 2.2% | 3.9% |
| 15 a 19 | 10.5% | 11.4% | 9.4% |
| 20 a 24 | 13.5% | 13.6% | 13.3% |
| 25 a 29 | 10.8% | 12.0% | 9.2% |
| 30 a 34 | 7.8% | 7.3% | 8.5% |
| 35 a 39 | 10.4% | 9.9% | 11.1% |
| 40 a 44 | 7.6% | 8.8% | 5.9% |
| 45 a 49 | 6.1% | 6.3% | 5.9% |
| 50 a 54 | 5.6% | 6.0% | 5.0% |
| 55 a 59 | 5.0% | 4.9% | 5.2% |
| 60 a 64 | 4.9% | 4.1% | 5.9% |
| 65 a > | 13.7% | 12.1% | 15.9% |
| S/D | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 5 ESTADO DE RESIDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y POR SEXO | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Estado de Residencia. | 1092 | 634 | 458 |
| Colima | 3 | 1 | 2 |
| Durango | 2 | 1 | 1 |
| Jalisco | 1077 | 628 | 449 |
| Michoacán | 1 | 0 | 1 |
| Nayarit | 5 | 4 | 1 |
| Zacatecas | 4 | 0 | 4 |

Cuadro No. 6.1 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y POR SEXO

| | General | Hombres | Mujeres |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|
| Municipio de Residencia | 1092 | 634 | 458 |
| Acatic | 3 | 2 | 1 |
| Amacueca | 1 | 1 | 0 |
| Ameca | 30 | 17 | 13 |
| Arandas | 28 | 15 | 13 |
| Arenal | 1 | 1 | 0 |
| Atemajac de Brizuela | 2 | 1 | 1 |
| Atotonilco el Alto | 1 | 0 | 1 |
| Atoyac | 2 | 1 | 1 |
| Autlán de Navarro | 21 | 15 | 6 |
| Bolaños | 3 | 3 | 0 |
| Cabo Corrientes | 2 | 1 | 1 |
| Cihuatlán | 0 | 0 | 0 |
| Zapotlán El Grande | 209 | 112 | 97 |
| Cocula | 1 | 1 | 0 |
| Colotlán | 101 | 44 | 57 |
| Guachinango | 2 | 1 | 1 |
| Guadalajara | 144 | 109 | 35 |
| Huejuquilla el Alto | 21 | 12 | 9 |
| Mascota | 29 | 13 | 16 |
| Mazamitla | 1 | 1 | 0 |
| Mezquitic | 4 | 2 | 2 |
| Ocotlán | 10 | 5 | 5 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 6.2 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y POR SEXO | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Municipio de Residencia | 1092 | 634 | 458 |
| Pihuamo | 1 | 1 | 0 |
| Poncitlán | 1 | 1 | 0 |
| Puerto Vallarta | 22 | 11 | 11 |
| Salto | 1 | 1 | 0 |
| San Juan de los Lagos | 26 | 19 | 7 |
| San Julián | 1 | 0 | 1 |
| San Martín de Hidalgo | 1 | 1 | 0 |
| San Miguel el Alto | 4 | 2 | 2 |
| Gómez Farías | 5 | 1 | 4 |
| Santa María de los Ángeles | 9 | 4 | 5 |
| Sayula | 6 | 2 | 4 |
| Talpa de Allende | 1 | 0 | 1 |
| Tamazula de Gordiano | 48 | 25 | 23 |
| Tapalpa | 3 | 1 | 2 |
| Tecalitlán | 8 | 5 | 3 |
| Techaluta de Montenegro | 1 | 0 | 1 |
| Teocuitatlán de Corona | 1 | 0 | 1 |
| Tepatitlán de Morelos | 50 | 28 | 22 |
| Tequila | 0 | 0 | 0 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 67 | 40 | 27 |
| San Pedro Tlaquepaque | 24 | 16 | 8 |
| Tolimán | 1 | 0 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 6.3 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y POR SEXO | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Municipio de Residencia | 1092 | 634 | 458 |
| Tomatlán | 2 | 1 | 1 |
| Tonalá | 6 | 6 | 0 |
| Totatiche | 3 | 1 | 2 |
| Tuxpan | 17 | 10 | 7 |
| San Gabriel | 8 | 2 | 6 |
| Villa Guerrero | 1 | 1 | 0 |
| Zapopan | 126 | 83 | 43 |
| Zapotiltic | 9 | 5 | 4 |
| Zapotitlán de Vadillo | 1 | 1 | 0 |
| Zapotlán del Rey | 4 | 1 | 3 |
| Zapotlanejo | 1 | 1 | 0 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 2 | 1 | 1 |
| Municipios de Otros Estados | 15 | 6 | 9 |

| Cuadro No. 7 OCUPACIÓN PRONCPAL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y POR SEXO | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Ocupación Principal | 1092 | 634 | 458 |
| Estudiante de tiempo completo | 11.4% | 9.8% | 13.5% |
| Estudiante con actividad laboral | 3.3% | 3.8% | 2.6% |
| Tiene empleo estable > 6 meses | 33.2% | 42.9% | 19.9% |
| Tiene menos de 6 meses | 8.1% | 11.2% | 3.7% |
| Desempleado (busca empleo) | 4.5% | 5.7% | 2.8% |
| Desocupado (no busca empleo) | 4.1% | 5.5% | 2.2% |
| Hogar | 21.6% | 1.9% | 48.9% |
| Pensionado | 6.1% | 8.4% | 3.1% |
| No aplica | 1.9% | 2.5% | 1.1% |
| Otra | 4.7% | 6.6% | 2.0% |
| No sabe | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
| No responde | 0.9% | 1.4% | 0.2% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 8 GRADO MÁXIMO DE ESTUDIO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y POR SEXO | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Grado Máximo de Estudios | 1092 | 634 | 458 |
| Primaria | 24.5% | 23.0% | 26.6% |
| Secundaria | 27.8% | 26.8% | 29.3% |
| Escolaridad Técnica | 4.1% | 3.6% | 4.8% |
| Bachillerato | 19.9% | 20.3% | 19.2% |
| Licenciatura | 9.7% | 9.6% | 9.8% |
| Maestría/doctorado/Especialidad | 6.6% | 9.0% | 3.3% |
| No sabe leer ni escribir | 2.4% | 2.1% | 2.8% |
| Sabe leer y escribir | 2.3% | 2.2% | 2.4% |
| No aplica | 1.7% | 2.4% | 0.9% |
| No sabe | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
| No responde | 0.7% | 0.6% | 0.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 9 ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y POR SEXO | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Estado Civil | 1092 | 634 | 458 |
| Soltero | 34.0% | 36.3% | 30.8% |
| Casado | 40.9% | 40.4% | 41.7% |
| Unión Libre | 13.2% | 11.5% | 15.5% |
| Separado | 1.9% | 2.7% | 0.9% |
| Divorciado | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Viudo | 5.1% | 3.3% | 7.6% |
| No aplica | 1.7% | 2.8% | 0.2% |
| No sabe | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
| No responde | 0.5% | 0.2% | 0.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 10 CAUSA DE INGRESO A UNA UNIDAD DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y SEXO | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Causa | 1092 | 634 | 458 |
| Lesión de Causa Externa | 435 | 306 | 129 |
| Patología de Base | 657 | 328 | 329 |

| Cuadro No. 11 CAUSA DE INGRESO A UNA UNIDAD DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y SEXO | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Causa | General | Hombres | Mujeres |
| Lesión de Causa Externa | 37.9% | 48.9% | 29.5% |
| Patología de Base | 51.2% | 44.3% | 59.5% |
| Otras | 10.9% | 6.7% | 16% |

| Cuadro No. 12 MOTIVOS DE INGRESO POR LESIÓN DE CAUSA EXTERNA A UNA UNIDAD DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y SEXO | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Origen de la lesión | 435 | 306 | 129 |
| Atropellado | 6.0% | 6.9% | 3.9% |
| Accidente automovilístico | 14.3% | 14.1% | 14.7% |
| Caída | 33.8% | 30.7% | 41.1% |
| Trauma por Objeto Contundente o Persona | 12.6% | 12.4% | 13.2% |
| Aplastamiento | 1.8% | 2.3% | 0.8% |
| Proyectil de Arma de Fuego | 0.9% | 1.0% | 0.8% |
| Objeto Punzo Cortante o Punzo Contundente | 4.4% | 3.9% | 5.4% |
| Maquinaria | 1.1% | 1.3% | 0.8% |
| Piquete o mordedura | 9.7% | 10.1% | 8.5% |
| Quemadura o por fuego o química | 2.1% | 2.6% | 0.8% |
| Sustancias Líquidas, Sólidas o Gaseosas | 0.5% | 0.7% | 0.0% |
| Corriente eléctrica | 0.9% | 1.3% | 0.8% |
| Asfixia o sofocación | 2.1% | 2.9% | 0.0% |
| Intoxicación o envenenamiento | 2.3% | 3.3% | 6.2% |
| Sustancias, vapor y objetos calientes | 1.4% | 2.0% | 0.0% |
| Congelamiento | 0.5% | 0.7% | 0.0% |
| Sobredosis accidental | 1.8% | 1.6% | 2.3% |
| Sobredosis autoinflingida (suicidio) | 0.9% | 1.0% | 0.8% |
| Envenenamiento Suicida | 0.9% | 1.3% | 0.0% |
| Otra | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| Cuadro No. 13 LUGAR DONDE OCURRIÓ LA LESIÓN DE CAUSA EXTENA EN URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y SEXO | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Lugar donde ocurrió la lesión | 435 | 306 | 129 |
| Hogar | 33.1% | 27.8% | 45.7% |
| Escuela | 2.1% | 1.6% | 3.1% |
| Vía Pública | 42.1% | 42.5% | 41.1% |
| Sitio de recreación | 2.5% | 3.6% | 0.0% |
| Trabajo | 15.2% | 19.0% | 6.2% |
| Otros | 0.9% | 1.3% | 0.0% |
| Se desconoce | 4.1% | 4.2% | 3.9% |

| Cuadro No. 14 RELACIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES QUE INGRESAN POR PATOLOGÍA A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Ingreso por patología | 1092 | 634 | 129 |
| Si | 71.9% | 66.2% | 79.7% |
| No | 28.1% | 33.8% | 20.3% |

| Cuadro No. 15 NÚMERO DE PACIENTES QUE INGRESAN POR PATOLOGÍA A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Ingreso por patología | 1092 | 634 | 129 |
| Si | 785 | 420 | 365 |
| No | 307 | 214 | 93 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 16 INGRESO POR PATOLOGÍA DE BASE EN URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y SEXO | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Ingreso por patología | 1092 | 634 | 129 |
| Bronquitis/ enfisema/ asma | 5.4% | 6.4% | 4.1% |
| Cáncer de tráquea / Bronquios/ Pulmón | 1.1% | 1.4% | 0.8% |
| Enfermedades del corazón | 5.5% | 6.7% | 4.1% |
| Hipertensión arterial | 9.7% | 9.0% | 10.4% |
| Afección neurológica | 2.2% | 3.3% | 0.8% |
| Cirrosis/ gastritis | 6.1% | 6.7% | 5.5% |
| Urgencias quirúrgicas | 1.3% | 2.4% | 2.7% |
| Psicosis alcohólica/ sustancias (drogas) | 2.5% | 3.8% | 1.1% |
| Afección gineco/obstétrica | 3.6% | 1.0% | 6.6% |
| Afección osteo/muscular | 4.5% | 4.0% | 4.9% |
| Diabetes mellitus | 7.4% | 6.4% | 8.5% |
| Otras | 49.6% | 48.8% | 50.4% |



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 17 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES QUE INGRESARON BAJO EFECTO DE DROGAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y POR SEXO | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Ingreso Bajo Efecto de Drogas | 1092 | 634 | 458 |
| Si | 21.4% | 29.2% | 10.7% |
| No | 78.6% | 70.8% | 89.3% |

| Cuadro No. 18 NÚMERO DE PACIENTES QUE INGRESARON BAJO EFECTO DE DROGAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN GENERAL Y POR SEXO | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | General | Hombres | Mujeres |
| Ingreso Bajo Efecto de Drogas | 1092 | 634 | 458 |
| Si | 234 | 185 | 49 |
| No | 858 | 449 | 409 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 19 TIPO DE DROGAS ASOCIADAS AL INGRESO DE URGENCIAS MÉDICAS EN LOS PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| | General | Masculino | Femenino |
| Cuales Drogas | 234 | 185 | 49 |
| Alcohol | 53.8% | 45.9% | 83.7% |
| Marihuana | 23.9% | 23.8% | 24.5% |
| Inhalantes | 0.9% | 1.1% | 0.0% |
| Alucinógenos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Heroína | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Opio/Morfina | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cocaína | 17.9% | 18.9% | 14.3% |
| Tranquilizantes | 0.9% | 0.0% | 4.1% |
| Barbitúricos | 0.4% | 0.0% | 2.0% |
| Anfetaminas | 12.8% | 11.4% | 18.4% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tabaco | 0.9% | 0.5% | 2.0% |
| Antidepresivos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Psicotrópicos | 0.4% | 0.0% | 2.0% |
| Pasta Base | 5.6% | 6.5% | 2.0% |
| Metanfetamina/Cristal | 3.0% | 3.2% | 2.0% |
| Flunitracepam | 0.4% | 0.5% | 0.0% |
| Crack | 5.6% | 4.9% | 8.2% |
| Refractil ofteno | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total | 100% | 100% | 100% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 20 PACIENTES QUE INGRESAN A SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS POR LESIÓN DE CAUSA EXTERNA | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| Lesión de Causa Externa | General | Masculino | Femenino |
| Si | 435 | 306 | 129 |
| No | 657 | 328 | 329 |
| Total | 1092 | 634 | 458 |

| Cuadro No. 21 PACIENTES QUE INGRESAN A SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS POR LESIÓN DE CAUSA EXTERNA | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| | General | Masculino | Femenino |
| Lesión de Causa Externa | 1092 | 634 | 458 |
| Si | 39.8% | 48.3% | 28.2% |
| No | 60.2% | 51.7% | 71.8% |

| Cuadro No. 22 PACIENTES QUE INGRESAN A SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS POR LESIÓN DE CAUSA EXTERNA BAJO EL EFECTO DE ALGUNA DROGA | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| | General | Masculino | Femenino |
| Bajo efecto de drogas | 435 | 306 | 129 |
| Si | 42.7% | 51.3% | 7.9% |
| No | 57.3% | 48.7% | 98.1% |
| Total | 100% | 100% | 100% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 23 PACIENTES QUE INGRESAN A SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS POR LESIÓN DE CAUSA EXTERNA BAJO EL EFECTO DE ALGUNA DROGA | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| | General | Masculino | Femenino |
| Tipo de drogas | 187 | 157 | 29 |
| Alcohol | 48.9% | 43.9% | 75.9% |
| Marihuana | 26.3% | 24.8% | 34.5% |
| Inhalantes | 0.5% | 0.6% | 0.0% |
| Alucinógenos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Heroína | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Opio/Morfina | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cocaína | 21.0% | 21.0% | 20.7% |
| Tranquilizantes | 1.1% | 0.0% | 6.9% |
| Barbitúricos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anfetaminas | 12.9% | 12.7% | 13.8% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tabaco | 1.1% | 0.6% | 3.4% |
| Antidepresivos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Psicotrópicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pasta Base | 6.5% | 7.6% | 0.0% |
| Metanfetamina/Cristal | 1.6% | 1.9% | 0.0% |
| Flunitracepam | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Crack | 6.5% | 5.7% | 10.3% |
| Refractilofteno | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 24.1 PACIENTES CON LESIÓN DE CAUSA EXTERNA BAJO EL INFLUJO DE DROGAS SEGÚN ORIGEN DE LA LESIÓN Y TIPO DE DROGA UTILIZADA DEL SEXO MASCULINO | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| | TOTAL | Alcohol | Cannabis | Inhalantes | Cocaína | Anfetamina | Tabaco | Pasta Base | Cristal | Crack |
| | N= 157 | n=69 | n=39 | n=1 | n=33 | n=20 | n=1 | n=12 | n=3 | n=9 |
| Atropellado | 10.8% | 10.1% | 10.3% | 0.0% | 18.2% | 15.0% | 0.0% | 8.3% | 33.3% | 11.1% |
| Accidente Automovilístico | 13.4% | 24.6% | 2.6% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| Caída | 26.1% | 30.4% | 30.8% | 100% | 18.2% | 15.0% | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 22.2% |
| Trauma por Objeto Contundente o Persona | 8.9% | 14.5% | 5.1% | 0.0% | 12.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Aplastamiento | 3.2% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 6.1% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Proyectil de Arma de Fuego | 1.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
| Objeto Punzo Cortante o Punzo Contundente | 0.6% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Maquinaria | 1.3% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Piquete o mordedura | 5.7% | 5.8% | 5.1% | 0.0% | 3.0% | 10.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 11.1% |
| Quemadura por fuego o química | 3.2% | 0.0% | 5.1% | 0.0% | 3.0% | 5.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
| Sustancias Líquidas, Sólidas o Gaseosas | 0.6% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 24.2 PACIENTES CON LESIÓN DE CAUSA EXTERNA BAJO EL INFLUJO DE DROGAS SEGÚN ORIGEN DE LA LESIÓN Y TIPO DE DROGA UTILIZADA DEL SEXO MASCULINO

| | TOTAL | Alcohol | Cannabis | Inhalantes | Cocaína | Anfetamina | Tabaco | Pasta Base | Cristal | Crack |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| | N= 157 | n=69 | n=39 | n=1 | n=33 | n=20 | n=1 | n=12 | n=3 | n=9 |
| Corriente eléctrica | 1.9% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% |
| Asfixia o sofocación | 5.1% | 0.0% | 12.8% | 0.0% | 3.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| Intoxicación o envenenamiento | 4.5% | 2.9% | 5.1% | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| Sustancias, vapor u objetos calientes | 3.8% | 0.0% | 5.1% | 0.0% | 3.0% | 10.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 11.1% |
| Congelamiento | 1.3% | 1.4% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| Sobredosis accidental | 3.2% | 2.9% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
| Sobredosis autoinflingida (suicidio) | 1.9% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 3.0% | 5.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
| Envenenamiento suicida | 2.5% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 3.0% | 5.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 11.1% |
| Otra | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 25.1 PACIENTES CON LESIÓN DE CAUSA EXTERNA BAJO EL INFLUJO DE DROGAS SEGÚN ORIGEN DE LA LESIÓN Y TIPO DE DROGA UTILIZADA DEL SEXO FEMENINO

| | Total | Alcohol | Marihuana | Cocaína | Tranquilizantes | Anfetaminas | Tabaco | Crack |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | n=40 | n=22 | n=10 | n=6 | n=2 | n=4 | n=1 | n=3 |
| Atropellado | 7.5% | 0.0% | 10.0% | 16.7% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 33.3% |
| Accidente Automovilístico | 27.5% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% |
| Caída | 20.0% | 27.3% | 30.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Trauma por Objeto Contundente o Persona | 10.0% | 9.1% | 20.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Aplastamiento | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Proyectil de Arma de Fuego | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 33.3% |
| Objeto Punzo Cortante o Punzo Contundente | 5.0% | 4.5% | 10.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Maquinaria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Piquete o mordedura | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Quemadura por fuego o química | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



Cuadro No. 25.2 PACIENTES CON LESIÓN DE CAUSA EXTERNA BAJO EL INFLUJO DE DROGAS SEGÚN ORIGEN DE LA LESIÓN Y TIPO DE DROGA UTILIZADA DEL SEXO FEMENINO

| | Total | Alcohol | Marihuana | Cocaína | Tranquilizantes | Anfetaminas | Tabaco | Crack |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | n=40 | n=22 | n=10 | n=6 | n=2 | n=4 | n=1 | n=3 |
| Sustancias Líquidas, Sólidas o Gaseosas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Corriente eléctrica | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| Asfixia o sofocación | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Intoxicación o envenenamiento | 12.5% | 9.1% | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| Sustancias, vapor u objetos calientes | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Congelamiento | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Sobredosis accidental | 7.5% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| Sobredosis autoinflingida (suicidio) | 2.5% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Envenenamiento suicida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otra | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No 26 NÚMERO DE PACIENTES QUE INGRESAN A SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS SEGÚN PATOLOGÍA DE BASE Y GÉNERO | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| Patología de Base | General | Masculino | Femenino |
| Si | 785 | 420 | 365 |
| NO | 307 | 214 | 93 |
| Total | 1092 | 634 | 458 |

| Cuadro No. 27 NÚMERO DE PACIENTES QUE INGRESAN A SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS SEGÚN PATOLOGÍA Y GÉNERO | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| Patología de Base | General | Masculino | Femenino |
| Total | 1092 | 634 | 458 |
| Si | 71.9% | 66.2% | 79.7% |
| NO | 28.1% | 33.8% | 20.3% |
| Total | 100% | 100% | 100% |



Cuadro No. 28 NÚMERO DE PACIENTES QUE INGRESAN A SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS POR PATOLOGÍA DE BASE Y BAJO EL INFLUJO DE DROGAS POR GÉNERO

| Bajo el efecto de drogas | General | Masculino | Femenino |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Si | 126 | 97 | 29 |
| NO | 659 | 323 | 336 |
| Total | 785 | 420 | 365 |

Cuadro No. 29 PACIENTES QUE INGRESAN A SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS POR PATOLOGÍA DE BASE Y BAJO EL INFLUJO DE DROGAS POR

| Bajo efecto de drogas | General | Masculino | Femenino |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Si | 16% | 23% | 7.9% |
| No | 84% | 77% | 92.1% |
| Total | 100% | 100% | 100% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



CUADRO No. 30 ENFERMEDAD DE BASE EN PACIENTES QUE INGRESARON A URGENCIAS BAJO EFECTO DE DROGAS SEGÚN TIPO DE DROGA SEXO MASCULINO

| | Total | Alcohol | Cannabis | Inhalantes | Cocaína | Anfeta | Pasta Base | Cristal | Flunitrazepam | Crack |
|--|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|
| Tipo de patología | n=97 | n= 35 | N=27 | N=2 | N= 20 | N=15 | n=7 | n=3 | n=1 | n=5 |
| Bronquitis/ enfisema/ asma | 5.7% | 5.7% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cáncer de tráquea / Bronquios/ Pulmón | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 0.0% | 10.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| Enfermedades del corazón | 17.1% | 17.1% | 14.8% | 0.0% | 35.0% | 46.7% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
| Hipertensión arterial | 5.7% | 5.7% | 11.1% | 0.0% | 15.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| Afección neurológica | 8.6% | 8.6% | 3.7% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cirrosis/ gastritis | 11.4% | 11.4% | 11.1% | 0.0% | 15.0% | 6.7% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Urgencias quirúrgicas | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Psicosis alcohólica/ sustancias (drogas) | 31.4% | 31.4% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% |
| Afección gineco /obstétrica | 2.9% | 2.9% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| Afección osteo - muscular | 8.6% | 8.6% | 0.0% | 50.0% | 5.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diabetes mellitus | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 0.0% | 5.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras | 8.6% | 8.6% | 7.4% | 50.0% | 5.0% | 6.7% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



CUADRO No. 31 ENFERMEDAD DE BASE EN PACIENTES QUE INGRESARON A URGENCIAS BAJO EFECTO DE DROGAS SEGÚN TIPO DE DROGA SEXO FEMENINO

| Tipo de Patología | Total | Alcohol | Cannabis | Cocaína | Traquizantes | Barbituricos | Anfetaminas | Otros | Cristal | Crack |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | n=29 | n= 11 | N=8 | N=7 | N= 1 | N=1 | n=3 | n=1 | n=1 | n=2 |
| Bronquitis/ enfisema/ asma | 10.3% | 18.2% | 12.5% | 0.0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cáncer de tráquea / Bronquios/ Pulmón | 6.9% | 0.0% | 12.5% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Enfermedades del corazón | 20.7% | 0.0% | 50.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| Hipertensión arterial | 3.4% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Afección neurológica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cirrosis/ gastritis | 3.4% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Urgencias quirúrgicas | 3.4% | 9.1% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Psicosis alcohólica/ sustancias (drogas) | 13.8% | 36.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Afección gineco /obstétrica | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Afección osteo - muscular | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diabetes mellitus | 17.2% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| Otras | 17.2% | 27.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 0.0% | 100% | 100% | 0.0% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 32 PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS SEGÚN EL CONSUMO DE DROGAS GENERAL Y POR SEXO | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| Consume Drogas | General | Masculino | Femenino |
| Si | 457 | 351 | 106 |
| No | 634 | 282 | 352 |

| Cuadro No. 33 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS SEGÚN EL CONSUMO DE DROGAS GENERAL Y POR SEXO | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| Consume Sustancias | General | Masculino | Femenino |
| Si | 41.8% | 55.4% | 23.1% |
| No | 58.1% | 44.5% | 76.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 34 HISTORIAL DE CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES ATENDIDOS EN GENERAL Y POR SEXO | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| | General | Masculino | Femenino |
| Historial de Consumo de Drogas | N= 457 | n= 351 | n= 106 |
| Alcohol | 67.6% | 66.7% | 70.8% |
| Marihuana | 17.3% | 18.2% | 14.2% |
| Inhalantes | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Alucinógenos | 1.1% | 1.4% | 0.0% |
| Heroína | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Opio/Morfina | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cocaína | 14.0% | 15.4% | 9.4% |
| Tranquilizantes | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
| Barbitúricos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anfetaminas | 6.1% | 6.8% | 3.8% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tabaco | 34.8% | 35.9% | 31.1% |
| Antidepresivos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Psicotrópicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pasta Base | 3.3% | 4.3% | 0.0% |
| Metanfetamina/Cristal | 2.6% | 3.1% | 0.9% |
| Flunitracepam | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Crack | 4.4% | 4.0% | 5.7% |
| Refractilofeno | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



INDICADOR SERVICIO MÉDICO FORENSE

En el año 2017 se modificó las cédulas de los diferentes indicadores del SISVEA, en el año 2018 se continúa en este reporte se presentará con información en cuadros, donde se describirá el contenido de la cédula lo cual abarca lo siguiente:

La información se obtiene de tres fuentes:

Libros de Trabajo Social

Libros de registro de las autopsias por parte del médico forense

Las alcoholimetrías del informe del Instituto de Ciencias Forenses

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

La fecha de elaboración:

La fecha de nacimiento del cadáver:

Edad del cadáver al perder la vida

Nombre del cadáver y si no se conoce o tiene registro se dejará como anónimo.

Sexo:

Femenino: Se pregunta si falleció estando en estado grávido

La Entidad y el Municipio de Residencia.

DATOS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE

Toda la información se obtiene del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ubicado en San Pedro Tlaquepaque Jalisco.

CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO

Fecha de defunción:

Causa de la Muerte:

Causa directa y básica de la muerte: para ello se utilizó la codificación del CIE 10

Lugar en el que ocurrió la muerte



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Se toman los siguientes lugares:

- En tránsito
- Hogar
- Vía Pública
- Escuela
- Sitio de Recreación
- Trabajo
- Otro
- Se Desconoce

El **producto de la defunción** se toma en cuatro rubros:

- Accidente
- Homicidio
- Suicidio
- Muerte no violenta

DATOS DE QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA

Se obtiene la información si la muerte se presentó bajo el efecto de alguna sustancia droga y/o psicotrópico
Si es afirmativa se buscan 5 principales sustancias y si hubo confirmación laboratorial de las drogas encontradas.
Se describirá el número total de muertes y se detallarán las muertes producidas bajo el efecto de alguna droga.

Los criterios para llenar su información en la cédula son en cadáveres mayores de 5 años y con información completa.



INFORMACIÓN GENERAL

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

| Cuadro No. 1 DISTRIBUCIÓN GENERAL SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | |
|---|---------------|-------------------|
| Producto | Número | Porcentaje |
| Accidente | 856 | 26.2% |
| Homicidio | 1,741 | 53.3% |
| Suicidio | 311 | 9.5% |
| No violenta | 357 | 10.9% |
| Total | 3,265 | 100% |

| Cuadro No. 2 INFORMACIÓN COMPLETA DEL CADÁVER SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Anónimo | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Si | 10.4% | 10.6% | 10.1% | 11.9% | 10.1% |
| No | 89.6% | 89.4% | 89.9% | 88.1% | 89.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 3 EDAD DE FALLECIMIENTO SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Edad del cadáver | 3,265 | 856 | 1741 | 311 | 357 |
| 5 a 9 | 0.6% | 1.4% | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
| 10 a 14 | 1.2% | 2.6% | 0.2% | 3.5% | 0.6% |
| 15 a 19 | 6.8% | 6.9% | 7.1% | 10.3% | 2.0% |
| 20 a 24 | 13.1% | 10.3% | 15.8% | 15.4% | 4.5% |
| 25 a 29 | 14.8% | 11.8% | 18.7% | 13.5% | 3.6% |
| 30 a 34 | 12.5% | 8.5% | 15.7% | 14.1% | 5.0% |
| 35 a 39 | 10.9% | 7.5% | 12.9% | 11.9% | 8.1% |
| 40 a 44 | 9.5% | 7.1% | 10.6% | 11.3% | 8.1% |
| 45 a 49 | 7.7% | 8.1% | 7.4% | 5.8% | 9.8% |
| 50 a 54 | 6.2% | 7.7% | 4.8% | 5.1% | 10.4% |
| 55 a 59 | 4.2% | 5.7% | 2.5% | 2.3% | 10.4% |
| 60 a 64 | 3.3% | 5.4% | 1.5% | 2.6% | 7.6% |
| 65 a 69 | 2.5% | 4.0% | 0.9% | 0.6% | 8.1% |
| 70 a > | 6.9% | 13.1% | 1.7% | 3.2% | 21.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 4 GÉNERO DEL CADÁVER POR PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Sexo | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Masculino | 86.2% | 80.5% | 91.8% | 79.7% | 78.4% |
| Femenino | 13.8% | 19.5% | 8.2% | 20.3% | 21.6% |

| Cuadro No. 5 CADÁVERES DEL SEXO FEMENINO SEGÚN ESTADO GRÁVIDO Y PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Embarazo | 3,265 | 856 | 1741 | 311 | 357 |
| Si | 1.8% | 0.6% | 2.1% | 3.2% | 2.6% |
| No | 98.2% | 99.4% | 97.9% | 96.8% | 97.4% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 6.1 ESTADO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Estado de Residencia | 3,265 | 856 | 1741 | 311 | 357 |
| Aguascalientes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Baja California | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coahuila | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Colima | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Chiapas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciudad de México | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Durango | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guanajuato | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Guerrero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalisco | 3,165 | 806 | 1,711 | 309 | 339 |
| México | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Michoacán | 21 | 13 | 4 | 0 | 4 |
| Morelos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nayarit | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Nuevo León | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puebla | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 6.2 ESTADO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Estado de Residencia | 3,265 | 856 | 1741 | 311 | 357 |
| Querétaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis Potosí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sinaloa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sonora | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamaulipas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tlaxcala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Veracruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yucatán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zacatecas | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Otro país | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 7.1 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 3265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Acatic | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Acatlán de Juárez | 22 | 6 | 11 | 1 | 4 |
| Ahualulco del Mercado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Amatitán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ameca | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| San Juanito de Escobedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arandas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atotonilco el Alto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Atoyac | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Autlán de Navarro | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ayotlán | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ayutla | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Barca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Corrientes | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Zapotlán El Grande | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Cocula | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Colotlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuquío | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapala | 30 | 9 | 10 | 6 | 5 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 7.2 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 3265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Chimaltitlán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Degollado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ejutla | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Encarnación de Díaz | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Etzatlán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Guachinango | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 944 | 214 | 543 | 91 | 96 |
| Hostotipaquillo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Huejuquilla el Alto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 29 | 8 | 13 | 3 | 5 |
| Ixtlahuacán del Río | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jalostotitlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús María | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jocotepec | 37 | 7 | 23 | 4 | 3 |
| Juanacatlán | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Juchitlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Manzanilla de la Paz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mazamitla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 7.3 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 3265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Mezquitic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ocotlán | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Poncitlán | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Vallarta | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Salto | 147 | 41 | 79 | 9 | 18 |
| San Cristóbal de la Barranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| San Julián | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| San Miguel el Alto | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Santa María de los Ángeles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sayula | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tala | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| Talpa de Allende | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tamazula de Gordiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tecalitlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tenamaxtlán | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Teocuitatlán de Corona | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tepatitlán de Morelos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Tequila | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Tizapán el Alto. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 7.4 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 3265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Tlajomulco de Zúñiga. | 388 | 104 | 201 | 25 | 58 |
| San Pedro Tlaquepaque | 532 | 88 | 372 | 44 | 28 |
| Tolimán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tomatlán | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tonalá | 288 | 69 | 148 | 48 | 23 |
| Tototlán | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tuxpan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Unión de Tula | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Valle de Guadalupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| San Gabriel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Villa Corona | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Zacoalco de Torres | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zapopan | 495 | 137 | 224 | 64 | 70 |
| Zapotiltic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotitlán de Vadillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zapotlanejo | 35 | 19 | 6 | 5 | 5 |
| Municipios de Otros Estados | 100 | 50 | 30 | 2 | 18 |
| Sin Dato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO

| Cuadro No. 8.1 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 149 | 0 | 144 | 5 | 0 |
| Agresión con disparo de arma corta | 741 | 1 | 740 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto cortante | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto romo o sin filo | 74 | 2 | 71 | 0 | 1 |
| Amebiasis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amputación traumática de parte de la cabeza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aneurisma y disección aórticos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 8.2 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Apendicitis aguda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asfixia | 284 | 53 | 95 | 120 | 16 |
| Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aterosclerosis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Caída en o desde escalera o escalones | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Caída no especificada | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Choque, no clasificado en otra parte | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal | 59 | 1 | 57 | 1 | 0 |
| Desnutrición proteico calórica severa, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edema pulmonar | 54 | 3 | 0 | 8 | 43 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 8.3 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Edema, no clasificado en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Efecto tóxico de plaguicidas (pesticidas) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Efectos adversos, no clasificados en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Embolia pulmonar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Embolia y trombosis arteriales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad alcohólica del hígado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Enfermedad cardíaca hipertensiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermedad diverticular del intestino | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, anti parkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 8.4 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Envenenamiento por antibióticos sistémicos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Explosión y rotura de cilindro con gas | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 8.5 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Exposición a líneas de transmisión eléctrica | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flebitis y tromboflebitis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fractura de huesos del cráneo y de la cara | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Fractura de la columna lumbar y de la pelvis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fractura del cuello | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Golpe contra o golpeado por otros objetos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hemorragia intraencefálica | 26 | 9 | 8 | 0 | 9 |
| Hemorragia subaracnoidea | 34 | 10 | 22 | 0 | 2 |
| Herida de la cabeza | 129 | 0 | 120 | 8 | 1 |
| Herida de la pierna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 43 | 2 | 41 | 0 | 0 |
| Herida del cuello | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 8.6 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo | 196 | 5 | 191 | 0 | 0 |
| Infarto agudo de miocardio | 157 | 2 | 0 | 0 | 155 |
| Infarto cerebral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inhalación de contenidos gástricos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias | 33 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| Insuficiencia cardíaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lesión auto infligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 133 | 0 | 12 | 121 | 0 |
| Lesión auto infligida intencionalmente por disparo de arma corta | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Lesión auto infligida intencionalmente por objeto cortante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lesión auto infligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 8.7 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Mordedura o ataque de perro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Neumonía viral, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neumonía, organismo no especificado | 52 | 4 | 2 | 0 | 46 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta | 224 | 222 | 2 | 0 | 0 |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



| Cuadro No. 8.8 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras anemias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras anemias nutricionales | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Otras enfermedades del sistema digestivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras Sepsis | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Otros aneurismas y aneurismas disecantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros trastornos del encéfalo | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza | 134 | 77 | 57 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados del tórax | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 8.9 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Pancreatitis aguda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paro cardíaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 101 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Quemadura y corrosión del tronco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Traumatismo intracraneal | 121 | 78 | 40 | 1 | 2 |
| Traumatismo superficial de la cabeza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Traumatismo superficial del hombro y del brazo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial del tórax | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Úlcera gástrica | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |



| Cuadro No. 9.1 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Básica de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Afección nosocomial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Agresión con disparo de arma corta | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto cortante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto romo o sin filo | 93 | 0 | 92 | 0 | 1 |
| Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión no especificados | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aneurisma y disección aórticos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apendicitis aguda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asfixia | 342 | 55 | 160 | 126 | 1 |
| Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |



| Cuadro No. 9.2 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Básica de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Caída en o desde escalera o escalones | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Caída no especificada | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Choque, no clasificado en otra parte | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Edema pulmonar | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Efecto tóxico del monóxido de carbono | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad alcohólica del hígado | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Enfermedad cardíaca hipertensiva | 115 | 1 | 0 | 0 | 114 |
| Enfermedad cardiorrenal hipertensiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad renal crónica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 9.3 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE
 SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Básica de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| Explosión y rotura de cilindro con gas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a chorro de alta presión | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a líneas de transmisión eléctrica | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fibrosis y cirrosis del hígado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fiebre reumática con complicación cardíaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Flebitis y tromboflebitis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fractura de huesos del cráneo y de la cara | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Fractura de la pierna, inclusive del tobillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fractura del cuello | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 9.4 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE
 SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Básica de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Golpe contra o golpeado por otros objetos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hemorragia intraencefálica | 25 | 9 | 10 | 0 | 6 |
| Hemorragia subaracnoidea | 24 | 17 | 5 | 0 | 2 |
| Herida de la cabeza | 215 | 13 | 195 | 6 | 1 |
| Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 59 | 5 | 54 | 0 | 0 |
| Herida del antebrazo y del codo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Herida del cuello | 41 | 0 | 29 | 12 | 0 |
| Herida del tórax | 82 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo | 585 | 96 | 487 | 1 | 1 |
| Hernia inguinal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hipotensión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infarto agudo de miocardio | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Infarto subsecuente del miocardio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infecciones debidas a otras mico bacterias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inhalación de contenidos gástricos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias | 48 | 33 | 2 | 1 | 12 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 9.5 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE
 SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Básica de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Insuficiencia cardíaca | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Insuficiencia renal aguda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Lesión auto infligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lesión auto infligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lesión auto infligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 119 | 0 | 1 | 114 | 4 |
| Lesión auto infligida intencionalmente por disparo de arma corta | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Lesión auto infligida intencionalmente por objeto cortante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mordedura o ataque de perro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 9.6 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE
 SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Básica de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte | 38 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| Neumonía, organismo no especificado | 53 | 22 | 2 | 0 | 29 |
| Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta | 91 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras anemias nutricionales | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Otras enfermedades cardiopulmonares | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Otras enfermedades del sistema digestivo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 9.7 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE
 SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Básica de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Otras enfermedades renales tubulointersticiales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Sepsis | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Otros aneurismas y aneurismas disecantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Otros trastornos de las venas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otros trastornos del encéfalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza | 171 | 137 | 31 | 2 | 1 |
| Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados del tórax | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pancreatitis aguda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paro cardíaco | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 9.8 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Básica de la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peritonitis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Quemadura y corrosión del tronco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo intracraneal | 95 | 63 | 32 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial de la cabeza | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial del tórax | 56 | 48 | 8 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del estómago | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Úlcera duodenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Úlcera gástrica | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Úlcera péptica, de sitio no especificado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 10 LUGAR DONDE OCURRIÓ DE LA MUERTE | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Lugar en que ocurre la muerte | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| En tránsito | 15.8% | 56.5% | 0.5% | 3.9% | 3.4% |
| Hogar | 18.6% | 9.7% | 7.6% | 82.6% | 37.8% |
| Vía Pública | 48.2% | 8.3% | 80.1% | 2.9% | 28.0% |
| Escuela | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | 0.0% |
| Sitio de recreación | 1.1% | 2.5% | 0.6% | 1.0% | 0.8% |
| Trabajo | 1.7% | 4.8% | 0.9% | 0.0% | 0.3% |
| Otro | 13.9% | 18.1% | 9.6% | 8.7% | 29.4% |
| Se desconoce | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 11 MES EN QUE OCURRIÓ LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Mes del año | 3,265 | 856 | 1,741 | 311 | 357 |
| Enero | 7.8% | 9.8% | 6.5% | 7.1% | 9.8% |
| Febrero | 7.8% | 8.3% | 7.9% | 7.1% | 7.0% |
| Marzo | 9.6% | 10.3% | 9.1% | 5.8% | 14.3% |
| Abril | 9.8% | 10.4% | 9.8% | 7.7% | 10.4% |
| Mayo | 9.5% | 9.0% | 7.6% | 19.3% | 11.5% |
| Junio | 8.3% | 9.3% | 7.9% | 8.7% | 7.6% |
| Julio | 8.2% | 8.5% | 7.8% | 9.0% | 8.4% |
| Agosto | 8.7% | 7.5% | 9.6% | 9.6% | 6.7% |
| Septiembre | 8.2% | 5.1% | 9.8% | 8.0% | 7.8% |
| Octubre | 9.4% | 7.5% | 10.8% | 8.4% | 8.4% |
| Noviembre | 9.1% | 10.6% | 9.2% | 7.7% | 5.6% |
| Diciembre | 3.4% | 3.6% | 3.9% | 1.3% | 2.5% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 12 NÚMERO DE CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS POR PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Muerte Bajo Drogas | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Si | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| No | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |

| Cuadro No. 13 CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Muerte Bajo Drogas | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Si | 10.4% | 10.6% | 10.1% | 11.9% | 10.1% |
| No | 89.6% | 89.4% | 89.9% | 88.1% | 89.9% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 14 TIPO DE DROGAS REGISTRADAS EN CADÁVERES SEGÚN PRODUCTO DE LA MUERTE | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Tipo de Drogas | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Alcohol | 99.4% | 98.9% | 100% | 97.3% | 100% |
| Marihuana | 0.6% | 1.1% | 0.0% | 2.7% | 0.0% |
| Inhalables | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% |
| Alucinógenos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Heroína | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Opio, Morfina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cocaína | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| Tranquilizantes | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Barbitúricos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anfetaminas | 0.6% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| Anticolinérgicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tabaco | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Antidepresivos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras drogas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pasta Base, Basuco | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Metanfetaminas | 1.2% | 1.1% | 1.7% | 0.0% | 0.0% |
| Flunitracepam | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Crack | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Refractilofeno | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



INFORMACIÓN EN CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS

| Cuadro No. 15 NÚMERO DE CASOS POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Número | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |

| Cuadro No. 16 NÚMERO DE CASOS POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Edad del cadáver | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| 5 a 9 | 0.3% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 a 14 | 1.2% | 2.2% | 0.6% | 2.7% | 0.0% |
| 15 a 19 | 4.4% | 4.4% | 3.4% | 8.1% | 5.6% |
| 20 a 24 | 13.2% | 5.5% | 16.5% | 24.3% | 5.6% |
| 25 a 29 | 17.4% | 16.5% | 18.8% | 18.9% | 11.1% |
| 30 a 34 | 12.6% | 5.5% | 17.6% | 16.2% | 2.8% |
| 35 a 39 | 11.2% | 9.9% | 15.3% | 5.4% | 0.0% |
| 40 a 44 | 8.2% | 8.8% | 8.5% | 10.8% | 2.8% |
| 45 a 49 | 10.3% | 13.2% | 8.5% | 2.7% | 19.4% |
| 50 a 54 | 8.2% | 14.3% | 5.1% | 2.7% | 13.9% |
| 55 a 59 | 3.5% | 4.4% | 2.3% | 2.7% | 8.3% |
| 60 a 64 | 3.5% | 4.4% | 2.3% | 2.7% | 8.3% |
| 65 a 69 | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.4% |
| 70 a > | 3.8% | 9.9% | 1.1% | 2.7% | 2.8% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 17 GÉNERO DEL CADÁVER POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Sexo | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Masculino | 87.1% | 83.5% | 92.6% | 75.7% | 80.6% |
| Femenino | 12.9% | 16.5% | 7.4% | 24.3% | 19.4% |

| Cuadro No. 18 CADÁVERES DEL GÉNERO FEMENINO POSITIVOS A DROGAS SEGÚN EMBARAZO Y PRODUCTO DE LA MUERTE | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Embarazo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Si | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% |
| No | 12.6% | 16.5% | 7.4% | 21.6% | 19.4% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 19 ESTADO DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL DE LA MUERTE | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Estado de Residencia | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Ciudad de México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jalisco | 330 | 86 | 173 | 36 | 35 |
| Michoacán | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Querétaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| San Luís Potosí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zacatecas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otro País | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 20.1 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL DE LA MUERTE | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Acatic | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Acatlán | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cabo Corrientes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chapala | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Encarnación de Díaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 100 | 21 | 60 | 8 | 11 |
| Huejuquilla el Alto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ixtlahuacán del Río | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalostotitlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juanacatlán | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mezquitic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| El Salto | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Tala | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 20.2 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL DE LA MUERTE | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Tamazula de Gordiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tenamaxtlán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 44 | 9 | 22 | 4 | 9 |
| San Pedro Tlaquepaque | 66 | 13 | 43 | 7 | 3 |
| Tonalá | 27 | 11 | 7 | 6 | 3 |
| Villa Corona | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Zapopan | 54 | 13 | 26 | 9 | 6 |
| Zapotlanejo | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Municipios de Otros Estados | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Sin Dato | | | | | |



CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO EL CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS

| Cuadro No. 21.1 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agresión con disparo de arma corta | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto cortante | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto romo o sin filo | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asfixia | 38 | 5 | 11 | 17 | 5 |
| Asfixia | 38 | 5 | 11 | 17 | 5 |
| Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Caída en o desde escalera o escalones | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Caída en o desde escalera o escalones | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Caída no especificada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caída no especificada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |



**Cuadro No. 21.2 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Directa de la muerte | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Edema pulmonar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Efectos adversos, no clasificados en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Efectos adversos, no clasificados en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad alcohólica del hígado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad diverticular del intestino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Explosión y rotura de cilindro con gas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Explosión y rotura de cilindro con gas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a líneas de transmisión eléctrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a líneas de transmisión eléctrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fractura de huesos del cráneo y de la cara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fractura del cuello | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia intraencefálica | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hemorragia subaracnoidea | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Herida de la cabeza | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Herida del tórax | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |



**Cuadro No. 21.3 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Directa de la muerte | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Infarto agudo de miocardio | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Infarto cerebral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía viral, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neumonía, organismo no especificado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 21.4 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|---|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Causa Directa de la muerte | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados del tórax | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo intracraneal | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial del hombro y del brazo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial del tórax | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Úlcera gástrica | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 22.1 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Causa básica de la muerte | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Agresión con disparo de arma corta | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto cortante | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto romo o sin filo | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión no especificados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asfixia | 38 | 7 | 21 | 10 | 0 |
| Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edema pulmonar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edema pulmonar | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad alcohólica del hígado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Enfermedad cardíaca hipertensiva | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Exposición a líneas de transmisión eléctrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fractura de huesos del cráneo y de la cara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia intraencefálica | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Hemorragia subaracnoidea | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |



**Cuadro No. 22.2 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa básica de la muerte | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Herida de la cabeza | 20 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Herida del cuello | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Herida del tórax | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo | 45 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia cardíaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Neumonía, organismo no especificado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 22.3 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|---|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Causa básica de la muerte | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados del tórax | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Peritonitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo intracraneal | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial de la cabeza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial del tórax | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Úlcera gástrica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 23 LUGAR EN QUE OCURRIÓ LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Lugar en que ocurre la muerte | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| En tránsito | 17.9% | 60.4% | 0.0% | 10.8% | 5.6% |
| Hogar | 19.1% | 9.9% | 5.7% | 70.3% | 55.6% |
| Vía Pública | 48.2% | 9.9% | 84.1% | 2.7% | 16.7% |
| Escuela | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Sitio de recreación | 1.5% | 2.2% | 1.1% | 0.0% | 2.8% |
| Trabajo | 1.8% | 5.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| Otro | 10.9% | 12.1% | 8.5% | 10.8% | 19.4% |
| Se desconoce | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 24 MES EN QUE OCURRIÓ LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Mes del año | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Enero | 22.1% | 25.3% | 19.9% | 18.9% | 27.8% |
| Febrero | 10.3% | 8.8% | 11.9% | 13.5% | 2.8% |
| Marzo | 14.4% | 13.2% | 12.5% | 10.8% | 30.6% |
| Abril | 12.9% | 13.2% | 12.5% | 16.2% | 11.1% |
| Mayo | 15.3% | 12.1% | 14.8% | 24.3% | 16.7% |
| Junio | 7.1% | 14.3% | 4.5% | 2.7% | 5.6% |
| Julio | 4.7% | 3.3% | 7.4% | 0.0% | 0.0% |
| Agosto | 5.6% | 2.2% | 7.4% | 5.4% | 5.6% |
| Septiembre | 3.2% | 2.2% | 4.5% | 2.7% | 0.0% |
| Octubre | 1.8% | 3.3% | 1.7% | 0.0% | 0.0% |
| Noviembre | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.7% | 0.0% |
| Diciembre | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |



DATOS DE QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA

| Cuadro No. 25 TIPO DE DROGAS ENCONTRADAS EN CADÁVERES SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Tipo de Drogas | 340 | 91 | 176 | 37 | 36 |
| Alcohol | 99.4% | 98.9% | 100% | 97.3% | 100% |
| Marihuana | 0.6% | 1.1% | 0.0% | 2.7% | 0.0% |
| Cocaína | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| Tranquilizantes | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Barbitúricos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anfetaminas | 0.6% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| Total | 100.9% | 100% | 101.7% | 100% | 100% |



INFORMACIÓN DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

| Cuadro No. 26 NÚMERO DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Número | 2925 | 765 | 1,565 | 274 | 321 |

| Cuadro No. 27 CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS CON INFORMACIÓN COMPLETA PARA SISVEA SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Anónimo | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Si | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| No | 99.9% | 99.9% | 99.8% | 100% | 100% |

| Cuadro No. 28 GÉNERO DE LOS CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Sexo | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Masculino | 86.1% | 80.1% | 91.7% | 80.3% | 78.2% |
| Femenino | 13.9% | 19.9% | 8.3% | 19.7% | 21.8% |

| Cuadro No. 29 CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS DEL SEXO FEMENINO SEGÚN ESTADO GRÁVIDO POR PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Embarazo | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Si | 1.7% | 0.7% | 2.3% | 1.9% | 2.9% |
| No | 98.3% | 99.3% | 97.7% | 98.1% | 97.1% |

| Cuadro No. 30 EDAD DEL CADÁVER NEGATIVOS A DROGAS Y PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Edad del cadáver | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| 5 a 9 | 0.6% | 1.4% | 0.2% | 0.4% | 0.9% |
| 10 a 14 | 1.2% | 2.6% | 0.2% | 3.6% | 0.6% |
| 15 a 19 | 7.1% | 7.2% | 7.5% | 10.6% | 1.6% |
| 20 a 24 | 13.1% | 10.8% | 15.7% | 14.2% | 4.4% |
| 25 a 29 | 14.5% | 11.2% | 18.7% | 12.8% | 2.8% |
| 30 a 34 | 12.5% | 8.9% | 15.5% | 13.9% | 5.3% |
| 35 a 39 | 10.8% | 7.2% | 12.7% | 12.8% | 9.0% |
| 40 a 44 | 9.6% | 6.9% | 10.9% | 11.3% | 8.7% |
| 45 a 49 | 7.4% | 7.5% | 7.3% | 6.2% | 8.7% |
| 50 a 54 | 5.9% | 6.9% | 4.7% | 5.5% | 10.0% |
| 55 a 59 | 4.3% | 5.9% | 2.6% | 2.2% | 10.6% |
| 60 a 64 | 3.2% | 5.5% | 1.4% | 2.6% | 7.5% |
| 65 a 69 | 2.5% | 4.4% | 1.0% | 0.7% | 6.9% |
| 70 a > | 7.3% | 13.5% | 1.7% | 3.3% | 23.1% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 31.1 ESTADO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Estado de Residencia | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Aguascalientes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Baja California | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coahuila | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Colima | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Chiapas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Guanajuato | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Guerrero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalisco | 2835 | 720 | 1538 | 273 | 304 |
| México | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Michoacán | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 |
| Morelos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nayarit | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Nuevo León | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puebla | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Querétaro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 31.2 ESTADO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Estado de Residencia | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinaloa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sonora | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamaulipas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tlaxcala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Veracruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yucatán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zacatecas | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Otro País | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 32.1 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Acatic | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Acatlán de Juárez | 20 | 5 | 10 | 1 | 4 |
| Ahualulco del Mercado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Amacueca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amatitán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ameca | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| San Juanito de Escobedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arandas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atemajac de Brizuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenguillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atotonilco el Alto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Atoyac | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Autlán de Navarro | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ayotlán | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ayutla | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Barca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bolaños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Corrientes | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Casimiro Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cihuatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 32.2 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Zapotlán El Grande | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Cocula | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Colotlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concepción de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuautitlán de García Barragán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuautla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuquío | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapala | 28 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| Chimaltitlán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chiquilistlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Degollado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ejutla | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Encarnación de Díaz | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Etzatlán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grullo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guachinango | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 844 | 193 | 483 | 83 | 85 |
| Hostotipaquillo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Huejúcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huejuquilla el Alto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 29 | 8 | 13 | 3 | 5 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 32.3 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Ixtlahuacán del Río | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jalostotitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús María | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jilotlán de los Dolores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocotepec | 37 | 7 | 23 | 4 | 3 |
| Juanacatlán | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Juchitlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lagos de Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Santa María del Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzanilla de la Paz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mascota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazamitla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mexticacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezquitic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixtlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocotlán | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ojuelos de Jalisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pihuamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poncitlán | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 32.4 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Puerto Vallarta | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Villa Purificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quitupán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 136 | 37 | 74 | 8 | 17 |
| San Cristóbal de la Barranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| San Diego de Alejandría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan de los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Julián | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| San Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Bolaños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Miguel el Alto | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gómez Farías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Sebastián del Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa María de los Ángeles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sayula | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tala | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| Talpa de Allende | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tamazula de Gordiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapalpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tecalitlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tecolotlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 32.5 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Techaluta de Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenamaxtlán | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Teocuitatlán de Corona | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tepatitlán de Morelos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Tequila | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Teuchitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tizapán el Alto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 344 | 95 | 179 | 21 | 49 |
| San Pedro Tlaquepaque | 466 | 75 | 329 | 37 | 25 |
| Tolimán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tomatlán | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tonalá | 261 | 58 | 141 | 42 | 20 |
| Tonaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totatiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tototlán | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tuxcacuesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxcueca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuxpan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Unión de San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unión de Tula | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Valle de Guadalupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 32.6 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Municipio de residencia | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Valle de Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Gabriel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Villa Corona | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Villa Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañadas de Obregón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahualica de González Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacoalco de Torres | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zapopan | 441 | 124 | 198 | 55 | 64 |
| Zapotiltic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotitlán de Vadillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zapotlán del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapotlanejo | 31 | 16 | 6 | 5 | 4 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipios de Otros Estados | 90 | 45 | 27 | 1 | 17 |
| Sin Dato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 33.1 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Directa de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Agresión con disparo de arma corta | 672 | 1 | 671 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto cortante | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 130 | 0 | 125 | 5 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Amebiasis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amputación traumática de parte de la cabeza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aneurisma y disección aórticos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aneurisma y disección aórticos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apendicitis aguda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apendicitis aguda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asfixia | 246 | 48 | 84 | 103 | 11 |



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 33.2 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Directa de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aterosclerosis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Caída en o desde escalera o escalones | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Caída no especificada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Choque, no clasificado en otra parte | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal | 57 | 1 | 55 | 1 | 0 |
| Desnutrición proteicocalórica severa, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edema pulmonar | 50 | 3 | 0 | 8 | 39 |
| Edema pulmonar | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Edema, no clasificado en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edema, no clasificado en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Efecto tóxico de plaguicidas (pesticidas) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Embolia pulmonar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Embolia y trombosis arteriales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad alcohólica del hígado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |



**Cuadro No. 33.3 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Directa de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Enfermedad cardíaca hipertensiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermedad cardíaca hipertensiva | 102 | 1 | 0 | 0 | 101 |
| Enfermedad cardiorrenal hipertensiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad diverticular del intestino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Envenenamiento por antibióticos sistémicos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 33.4 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Directa de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Explosión y rotura de cilindro con gas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Exposición a líneas de transmisión eléctrica | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fiebre reumática con complicación cardíaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Flebitis y tromboflebitis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Flebitis y tromboflebitis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fractura de huesos del cráneo y de la cara | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fractura de la columna lumbar y de la pelvis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Golpe contra o golpeado por otros objetos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hemorragia intraencefálica | 22 | 6 | 7 | 0 | 9 |
| Hemorragia intraencefálica | 18 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| Hemorragia subaracnoidea | 27 | 8 | 18 | 0 | 1 |
| Hemorragia subaracnoidea | 22 | 16 | 4 | 0 | 2 |



**Cuadro No. 33.5 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Directa de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Herida de la cabeza | 113 | 0 | 106 | 6 | 1 |
| Herida de la pierna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 40 | 2 | 38 | 0 | 0 |
| Herida del cuello | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Herida del tórax | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo | 169 | 5 | 164 | 0 | 0 |
| Hernia inguinal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infarto agudo del miocardio | 143 | 2 | 0 | 0 | 141 |
| Infarto agudo del miocardio | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Infarto subsecuente del miocardio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infecciones debidas a otras micobacterias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inhalación de contenidos gástricos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias | 29 | 26 | 0 | 0 | 3 |
| Insuficiencia cardíaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Insuficiencia cardíaca | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Lesión auto infligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 118 | 0 | 10 | 108 | 0 |



**Cuadro No. 33.6 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Directa de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Lesión auto infligida intencionalmente por disparo de arma corta | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Lesión auto infligida intencionalmente por objeto cortante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mordedura o ataque de perro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte | 35 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| Neumonía, organismo no especificado | 50 | 4 | 2 | 0 | 44 |
| Neumonía, organismo no especificado | 51 | 21 | 2 | 0 | 28 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta | 199 | 197 | 2 | 0 | 0 |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



| Cuadro No. 33.7 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras anemias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras anemias nutricionales | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Otras anemias nutricionales | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Otras enfermedades cardiopulmonares | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Otras enfermedades del sistema digestivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Sepsis | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Otras Sepsis | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Otros aneurismas y aneurismas disecantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros aneurismas y aneurismas disecantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otros trastornos de las venas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otros trastornos del encéfalo | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Otros trastornos del encéfalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 |



| Cuadro No. 33.8 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Causa Directa de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza | 123 | 70 | 53 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados del tórax | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Pancreatitis aguda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paro cardíaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paro cardíaco | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 94 | 93 | 0 | 0 | 1 |
| Peritonitis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quemadura y corrosión del tronco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Traumatismo intracraneal | 111 | 69 | 39 | 1 | 2 |
| Traumatismo superficial de la cabeza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 33.8 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa Directa de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Traumatismo superficial del tórax | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del estómago | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Úlcera duodenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Úlcera gástrica | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Úlcera gástrica | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Úlcera péptica, de sitio no especificado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |



**Cuadro No. 34.1 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa básica de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Afección nosocomial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agresión con disparo de arma corta | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto cortante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agresión con objeto romo o sin filo | 87 | 0 | 86 | 0 | 1 |
| Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión no especificados | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asfixia | 304 | 48 | 139 | 116 | 1 |
| Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Caída en o desde escalera o escalones | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Caída no especificada | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Choque, no clasificado en otra parte | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 34.2 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa básica de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Efecto tóxico del monóxido de carbono | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad alcohólica del hígado | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Enfermedad renal crónica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| Explosión y rotura de cilindro con gas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a chorro de alta presión | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a líneas de transmisión eléctrica | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



**Cuadro No. 34.3 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa básica de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Fibrosis y cirrosis del hígado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fractura de huesos del cráneo y de la cara | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Fractura de la pierna, inclusive del tobillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fractura del cuello | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Golpe contra o golpeado por otros objetos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Herida de la cabeza | 195 | 12 | 177 | 6 | 0 |
| Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 51 | 5 | 46 | 0 | 0 |
| Herida del antebrazo y del codo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Herida del cuello | 33 | 0 | 26 | 7 | 0 |
| Herida del tórax | 73 | 1 | 72 | 0 | 0 |
| Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo | 540 | 91 | 447 | 1 | 1 |
| Inhalación de contenidos gástricos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias | 36 | 28 | 1 | 0 | 7 |
| Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Insuficiencia renal aguda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |



**Cuadro No. 34.4 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa básica de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 103 | 0 | 1 | 98 | 4 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mordedura o ataque de perro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta | 85 | 84 | 1 | 0 | 0 |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades del sistema digestivo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



**Cuadro No. 34.5 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Causa básica de la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Otras enfermedades renales tubulointersticiales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza | 142 | 113 | 27 | 1 | 1 |
| Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| Otros traumatismos y los no especificados del tórax | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pancreatitis aguda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quemadura y corrosión del tronco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo intracraneal | 86 | 56 | 30 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial de la cabeza | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| Traumatismo superficial del tórax | 50 | 42 | 8 | 0 | 0 |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 35 LUGAR DONDE OCURRIÓ LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Lugar en que ocurre la muerte | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| En tránsito | 15.6% | 56.1% | 0.6% | 2.9% | 3.1% |
| Hogar | 18.5% | 9.7% | 7.8% | 84.3% | 35.8% |
| Vía Pública | 48.2% | 8.1% | 79.6% | 2.9% | 29.3% |
| Escuela | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
| Sitio de recreación | 1.1% | 2.5% | 0.5% | 1.1% | 0.6% |
| Trabajo | 1.7% | 4.7% | 0.9% | 0.0% | 0.3% |
| Otro | 14.3% | 18.8% | 9.8% | 8.4% | 30.5% |
| Se desconoce | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |



SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2018



| Cuadro No. 36 MES DONDE OCURRIÓ LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Global | Accidente | Homicidio | Suicidio | No Violenta |
| Mes del año | 2925 | 765 | 1565 | 274 | 321 |
| Enero | 6.1% | 8.0% | 5.0% | 5.5% | 7.8% |
| Febrero | 7.6% | 8.2% | 7.5% | 6.2% | 7.5% |
| Marzo | 9.1% | 9.9% | 8.7% | 5.1% | 12.5% |
| Abril | 9.5% | 10.1% | 9.5% | 6.6% | 10.3% |
| Mayo | 8.9% | 8.6% | 6.8% | 18.6% | 10.9% |
| Junio | 8.5% | 8.8% | 8.3% | 9.5% | 7.8% |
| Julio | 8.6% | 9.2% | 7.9% | 10.2% | 9.3% |
| Agosto | 9.1% | 8.1% | 9.8% | 10.2% | 6.9% |
| Septiembre | 8.8% | 5.5% | 10.4% | 8.8% | 8.7% |
| Octubre | 10.3% | 8.0% | 11.8% | 9.5% | 9.3% |
| Noviembre | 9.9% | 11.6% | 10.0% | 8.4% | 6.2% |
| Diciembre | 3.8% | 4.1% | 4.3% | 1.5% | 2.8% |



CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS ADICTIVAS

Alcohol:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Alcohol Etilico o Etanol.

Especies:

Destilados y fermentados: Vino, Tequila, Brandy, Whisky, Vodka, Cerveza, Cooler, Ron, Alcohol puro, Pulque, Charanda, Sotol,

Nombres Comunes:

Alipuses, caballos, caballito, chabelas, chelas, cheves, chupes, chupirules, cubas, copas, cuete, guachicoles, heladas, helodias, jaibol, michelada, michela, pajarettes, pedo, pegue, pisto, salpicón, tequilas, tecailas, wino, yarda.

Marihuana:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central (Alucinógeno).

Compuesto Activo:



Delta 9 Tetrahidrocannabinol (9THC)

Especies:

Cannabis Sativa, Cannabis Erratic, Cannabis Índica, Cannabis Rudelaris.

Nombres Populares:

Cannabis. Caña, chora, churro, grass (yerba), federal, hachich, hash, hashís, hoja verde, joint (enganche), juana, juanita, marijuana, Mery Jane, mota, mostaza naconha, pasto, pot, pura federal, quemando las patas a judas, reefer (rizador), tabaco federal, toque, vaísa, yesca, yerba, yerba buena, weed, (maleza), sikeak, jerry, tonco, tronco, efervesciente, clorotina, black dan, gardor, café, hiloraina, zick zack, silexico.

Otros: Spice

Inhalantes y Solventes:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Adhesivos:

Compuestos Activos:

Acetato de Etileno, Acetona, Epoxi, Hexano, Estireno-Butadieno, Gasolina, Poliestireno, Tetracloroetileno, Tolueno, Toluol, Tricloroetileno.

Producto:

Pegamentos: Tolueno, acetato de etilo y acetonas.



Cementos especiales: Tricloroetileno y tetracloroetileno.

Pegamentos de uso general: Mucilago de dextrina, Cola de nitrocelulosa, cola de acetato de polivinilo, mucilago de goma arábica.

Cola Plástica: Acetato de Polivinilo, epoxi, cola de nitrocelulosa y poliestireno.

Cola para papel: Cola de dextrina y goma de almidón.

Adhesivo de contacto: Látex de neopreno y hexano.

Cola para porcelana: Acetato de polivinilo y nitrato de celulosa.

Cola para zapatos: Hexano, gasolina y nitrato de celulosa.

Cola para cuero: Resina, tolueno, Hexano, cola de nitrocelulosa, cola de poliestireno y acetato de polivinilo.

Cola para modelos: Acetona, acetatos, tulol, alcanfor.

Cola para papel de pared: Resina, estireno-butadieno.

Nombres Comunes.

Chemo (bolsa), globo, inflado, soplado

Aerosoles:

Compuestos Activos:

Butano, Dimetil-Éter, Fluorocarbonos, Hidrocarburos, Hidrofluorocarbonados, Propano, Tricloroetano.

Productos:



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Sprays de Pintura: Butano, propano, fluorocarburos, tolueno e hidrocarburos.

Sprays de cabello: Butano, propano, clorofluorocarbonos.

Sprays analgésicos: Clorofluorocarbonados.

Sprays para el asma: Clorofluorocarbonados.

Sprays para telas: Butano y tricloroetano.

Limpiadores de computadoras: Dimetil éter e hidrofluorocarbonados.

Nombres Comunes:

Aerosol, Aire, Comprimidos, Spray, Saint.

Anestésicos:

Compuestos Activos: Cloroformo, Cloruro de Etilo, Enflorano, Éter, Halotano, Óxido Nitroso.

Solventes y Gases.

Compuestos Activos:

Acetona, Acetato de Etilo, Acetato de Metilo, Bromoclorodifluoroetano, Butano, Cloruro de Metilo, Destilados del Tricloroetano, Isopropano, Tolueno.



Producto:

Removedor de barniz de uñas: Acetona y acetato de etilo.

Removedor de pinturas: Tolueno, cloruro de metilo, acetona, acetato de metilo.

Líquido Corrector: tricloroetileno y tricloroetano.

Gas líquido de encendedor: Butano e isopropano.

Extinguidor de fuego: Bromoclorodifluorometano.

Aguarrás

Activo: tonzol.

Agua de Celeste.

Gasolina y diesel.

Limpiadores:

Compuestos Activos:

Clorohidrocarburos, Destilados del Petróleo, Tetracloroetileno, Tricloroetileno, Tricloroetano, Xileno.

Productos:

Desmanchadores: Xileno, destilados del petróleo y clorohidrocarburos.

Lavado en seco: tetracloroetileno y tricloroetileno.



Petróleo.

Nombres Comunes:

Activo, celeste, chemo, estopa, mona, toncho, vaina, vainilla,

Alucinógenos:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Antihistamínicos:

Compuestos Activos:

Astemizol, Bromfeniramina, Clemastina, Clorferinamina, Cromoglicato, Feniramina, Loratadina, Pirilamina, Terfenadina.

Otros:

Dietilamida del ácido lisérgico, Dietiltriptamina, Dimiltriptamina, Dimetoxianfetamina, Fenciclidina, Feniletilamina (mezcalina), Psilocibina, Psilocina, Bufotenina.

Nombres Comunes:

Ácidos, mezcal, hongos, zetas.



Heroína:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

3-6 Diacetilmorfina.

Nombres comunes.

Chiva, Arpón, Arponazo

Opio o Morfina y Derivados:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Morfina y Opio.

Derivados de la Morfina:

Compuestos Activos:

Alfentanil, Buprenorfina, Butorfanol, Codeína, Dextropropoxifeno, Fentanil, Hidromorfina, Meperidina, Metadona, Nalbufina, Oximorfina, Pentazocina, Propoxifen, Tramadol y Difenoxilato.



Principio Activo.

Desomorfina

Nombres comunes:

Krokodil, Cocodrilo, heroína de los pobres, heroína de los zombis.

Tranquilizantes:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Benzodiazepinas:

Compuestos Activos:

Acción Prolongada:

Clordiazepoxido, Diazepam, Flunitrazepam, Clonazepam, Praxepam, Clorazepato, Praxepam y Halazepam.

Acción Intermedia:

Oxazepam, Lorazepam, Temesepam, Alprazolam.

Acción Corta:

Midazolam, Triazolam.



Barbitúricos:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Amobarbital, Apobarbital, Fenobarbital, Secobarbital, Talbutal, Tiopental.

Otros Compuestos Activos:

Hidrato de Cloral, Etclorvinol, Etinamato, Etomidato, Glutemida, Meprobamato, Metiprilon, Paraldehido.

Gamahidroxibutirato.

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo.

Gamahidroxibutirato.

Nombre Común.

Éxtasis líquido, súper g, punto g, viola fácil,



Anfetaminas:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Metilfenidato, Bazedrina.

Sustancias Anoréxicas:

Compuestos Activos:

Anfepramona, Atropina, Benzetamina, Bromelina, Clobenzorex, Dextrofenfluramina, Dietilpropion, Fendimetrazina, Fenfluramina, Femproporex, Fentermina, Mazindol, Metilfenidato, norpseudoefedrina, Propilhexedrina.

Nombres Comunes:

Anfetas, anitas, fetas,



Anticolinérgicos:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Aloína, Atropina, Belladona, Boldo, Datura, Difenoxilato y Mandrágora.

Antiespasmódicos:

Compuestos Activos:

Bromuro, Butilhioscina, Clidinio, Diccloverina, Etomidolina, Floroglucinol y Fenoverine, Hioscina, Metamizol, Pargeverina, Pinaverio, Pipenzolato, Prifinio, Ropifenazona, Trimebutina.

Antiparkinsonianos:

Compuestos Activos:

Biperideno, Bromocriptina, Carbidopa, Dopamina, Levodopa, Pergolida y Trihexifenidilo.

Cocaína:

Efecto.

Estimulante del Sistema Nervioso Central.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



Compuestos Activos:

Clorhidrato de Cocaína, Sulfato de Cocaína.

Nombres Comunes.

Blanca nieves, Coca, Grapa, La Reyna, Nieve, Micha, Michela, Pase, Perico, Raya, Papel, Plástico.

Otros: Aticus, famous stars and straps, filinoica, chacha(r), AVC, antomina, pauder power, bang

Tabaco:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Nicotina.

Antidepresivos:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.



Antidepresivos tricíclicos y otras sustancias:

Compuesto Activo:

Ademetionina, Amitriptilina, Amoxapina, Citalopram, Clomipramina, Esipramina, Fluoxetina, Fluvoxamina, Hipericum, Imipramina, Litio, Maprotilina, Meclobemida, Mianserina, Nefazodona, Nortriptilina, Paroxetina, Sertralina, Sulpiride, Taneptina, Enlafaxina.

Iminoestilbenos:

Compuesto Activo:

Carbamacepina.

Fenitoínas:

Compuesto Activo:

Fenitoina.

Valproico:

Compuesto Activo:

Valproico Ácido.



Pasta Base: (Basuco)

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Benzoilmetilecgonina.

Nombres Comunes:

Basuco, Baserola, Base Libre, Bazoka, Free Base, Pasta.

Metanfetaminas (Cristales):

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Metilendioximetanfetamina (MDMA)



Nombres Comunes:

Cristal, Ectacy, Éxtasis, Ex, Metas, Meth, Tachas,

Otras presentaciones. Angelitos, Carita Feliz, Bart, Batman, Corona, Coronilla, Estrellas, Estrellitas, Simson, Versache, Maseratis, sirulax, asteroides, torofina, anaxle, felica, xt, general X, globos blancos, Blogo, omega, grino, ruedas, teamina, Cristalin, Bordín, UnderWhigle, purific, Bang, Catalenon, Dragones etc.

Flunitracepam:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Flunitracepam.

Nombres Comunes:

Rho, Reyna, Rohypnol, Roofies, Roche II.

Crack:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.



Compuesto Activo:

Benzoilmetilecgonina.

Nombres Comunes:

Crack, Coca, Roca, Piedra.

Refractyl Ofteno:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo: Ciclopentolato

Antimuscarínico.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abstemio:

(Del lat. abstemius; de abs priv. y del lat. tenum, vino) adj. Que se abstiene del vino y en general de todo licor alcohólico. Enófobo.

Abstinencia:

(Del lat. abstinentia), f. A., Abstinenz; F. e In., Abstinente. It., abstieneza. Privación voluntaria de la satisfacción de apetitos. (Fenómenos o síntomas de). Fenómenos producidos por la cesación más o menos brusca de una sustancia de uso habitual como el alcohol, la morfina, etc.

Abuso:

Hábito desadaptativo diferente al que se produce en el caso de dependencia, se caracteriza por el uso continuo de un fármaco a pesar de que el sujeto está consciente de tener un problema causado o desencadenado por su consumo y pone en peligro su integridad psicofísica.

Abuso:

(Del lat. abusus) m. Uso exagerado de una sustancia o de un medicamento, que puede convertirse en causa nociva, como abuso de alcohol, tabaco, de los vinos espirituosos, etc.

Abuso de una Droga:

Es el consumo de una droga en forma excesiva, persistente o esporádica, incompatible o sin relación con la terapéutica médica habitual.

Acusma:

(Del gr. Akousma). F. Alucinación acústica; ruidos subjetivos. Acúfeno, fonema.



Adaptación:

(Del lat. ad. A y aptare, acomodar) F. A., Anpassung; F. e In., adaptation; It., Adattamento; P., adaptacao). Ajustamiento de un organismo al ambiente. Disminución de la frecuencia de impulsos de la actividad refleja cuando se repiten varias veces a estímulos sensoriales.

Adolescencia:

(Del lat. adolescentia), f. A., Adoleszenz; F. e In., adolescente. It., adolescenza; P., adolescencia. Época que sigue a la infancia y que se extiende desde los primeros signos de la pubertad hasta que el cuerpo ha adquirido toda su madurez física.

Adormidera:

Planta papaverácea (*Papaver somniferum*) cuyas cápsulas sin madurar, suministran el opio. De las semillas se obtiene un aceite fijo.

Adrenalina:

F., Adrenalín; F., adrénaline; In. Adrenalin; It. Y P., adrenalina. Principio activo de la médula de las cápsulas suprarrenales. En su forma pura es un polvo cristalino, $C_6H_3(OH)CHOHCH_3NHCH_8$, o Dioxifeniletanolametilamina. Se emplea generalmente el clorhidrato. Obra esencialmente excitando las terminaciones nerviosas del simpático en todos los órganos; inyectado en las venas aumenta la presión arterial y refuerza la acción cardíaca: dilata la pupila y los bronquios e inhibe los movimientos intestinales y las contracciones del útero. Localmente tiene acción hemostática e isquemante poderosa. Sinónimos: Adrenina, adnefrina, epinefrina, paranéfrica, supracapsulina, suprarrenina, suprarrenalita, etc.

Adrenérgico:

Adj. A., adrenergisch; F., adrénérgique; In., adrenergic; It., adrenérgico; P., adrenérgico. Activado o transmitido por la adrenalina; se aplica a las fibras nerviosas y algunas drogas de abuso de tipo excitativo.

Adicción:



Es la necesidad que desarrolla un organismo de una situación, un objeto, o de consumir una sustancia para experimentar sus efectos y de cuya presencia física depende para seguir funcionando.

Adicción a Drogas:

Estado de intoxicación periódica o crónica producido por el consumo repetido de una sustancia (natural o sintética).

Adicto:

Persona adicta, dependiente de una o más sustancias.

Alcohol:

Es un fármaco depresor, como tal inhibe y retarda las acciones del sistema nervioso central.

Alcohol etílico o etanol:

Es un depresor primario del Sistema Nervioso Central.

Alcaloide:

(De álcali) y del gr. eidos, aspecto). Sustancias orgánicas de origen vegetal, que poseen propiedades básicas y que forman ácidos sales cristalizables. Desde el punto de vista químico son derivados de la piridina, quinoleína, pirimidina, y en su mayoría, compuestos cuaternarios. El término se aplica también a las sustancias obtenidas por síntesis.

Alcoholemia:

(De alcohol y del gr. Haima, sangre) Presencia de alcohol en la sangre.

Alcohólisis:

F. lisis o desintegración del alcohol.

Alcoholización:



f. A., Alkoholisierung; F., alcoholisation. Tratamiento por la aplicación o inyección de alcohol, especialmente en las neuralgias o síndrome de supresión.

Alcoholofilia o alcoholomanía:

(De alcohol y del gr. philía amistad, o manía, locura). Apetito morboso por las bebidas alcohólicas.

Alcohólico:

Persona que sufre de alcoholismo o síndrome de dependencia del alcohol.

Alcoholismo:

Síndrome de dependencia del alcohol. Enfermedad crónica que consiste en el desorden de la conducta caracterizada por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas, hasta el punto en que se excede de lo que está socialmente aceptado y llega a interferir con la salud del bebedor, así como con sus relaciones interpersonales o con su capacidad para el trabajo.

Alucinación:

(Del lat. alucinatio, onis). F. A., Halluzination. Error mental en la percepción de los sentidos no fundado en una realidad objetiva, percepción imaginaria (táctil, visual, auditiva, olfatoria o gustativa) sin causa exterior. Percepción sin estímulo externo que puede ocurrir en todos los campos sensoriales: auditivo, visual, olfatorio, gustativo y táctil (ver, oír, gustar, y tocar cosas que no existen en la realidad).

Alucinógenos:

También llamados psicométicos, psicoticométicos, psicodislépticos y psicogenéticos. Son sustancias que en el cerebro del sujeto crean alucinaciones, visiones y otras imágenes que no existen en la realidad (LSD, mezcalina, marihuana).

Alucinosis:

f. A., Halluzinose, F., hallucinose, In., hallucinosis. It. Allucinosi, P., alucinose. Psicosis caracterizada por alucinaciones, delirio alucinatorio crónico, síndrome generalmente múltiple, observado sobre todo en el alcoholismo, en el que las alucinaciones se asocian con ideas de



persecución. Cuadro observado tras haber tomado sustancias alucinógenas (marihuana, LSD, morfina, cocaína, etc.) o como resultado de una autointoxicación (uremia, exicosis, etc.).

Analgésico:

Droga que alivia el dolor.

Anfetamina:

Sustancia estimulante del sistema nervioso central (SNC). Las sales más comunes derivadas de esta droga son: el sulfato de amfetamina, el sulfato de dextroamfetamina y el hidrocloreuro de metanfetamina (todas son estimulantes del SNC).

Anfetaminas:

Pertenecen al grupo de los estimulantes del sistema nervioso. Por lo tanto, aceleran la actividad mental y producen estados de excitación. Además, reducen el apetito. Por ello, las amfetaminas se usan a veces como medicamentos para tratar la obesidad y algunos casos de depresión mental menor.

Amanita:

Género de hongos que comprende algunas especies muy venenosas como la Amanita Muscaria, A. Phalloides, etc.

Amanitina:

f. Nombre de algunos principios tóxicos obtenidos de hongos del género Amanita, especialmente de uno idéntico a la colina.

Amanitohemolisina:

Glúsido altamente hemolítico que se encuentra en los hongos del género Amanita.

Amanitotoxina:



F. Principio venenoso o toxina de la Amanita Phalloides, Difiere de la phallina en que es más resistente al calor y a la acción de la pepsina y de la pancreatina.

Amapola:

Planta anual de la familia de las papaveráceas (Papaver rheas) cuyos pétalos se emplean en infusión como diaforéticos y ligeramente calmantes. Es una de las cuatro flores béquicas.

Amina:

F. A., Amin. F, e In., amine. Miembro de un grupo de compuestos químicos formados del amoniaco por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por el radical NH₂. Se denominan monoamina, diaminas, triaminas, según sean uno, dos o tres átomos sustituidos.

Anestésico:

(Adj. A., Narkosemitte). Insensible al tacto o al dolor. m. Agente o sustancia que produce anestesia.

Ansia:

(Del lat. anxia. F. de anxius, angustiado). f. Congoja, aflicción.

Ansiedad:

Sensación de temor, depresión o inquietud que surge de anticipar un peligro cuyo origen se desconoce y no se comprende. La angustia se distingue del miedo porque este último sí tiene una causa conocida: se tiene miedo a los animales, a estar solo, a ciertas personas, etc.

Ansiolítico:

Psicofármaco utilizado para reducir la ansiedad.

Ansiolíticos o Timolépticos:



En el individuo normal producen mejoría en los estados depresivo-patológicos sin ser estimulantes. Eso lo hace diferente de los neurolépticos, de los sedantes y los tranquilizantes. Desarrollan más selectivamente y de manera directa, un efecto regulador sobre el humor (benzodiazepinas, meprobamatos, clordiazepóxido, metacualona).

Antidepresores:

Tienen también una función establecida en el tratamiento de los trastornos graves de ansiedad, incluso en síndrome del pánico y la agorafobia, así como la enfermedad obsesiva-compulsiva. Los primeros antidepresores que mostraron eficacia fueron imipramina, amitriptilina, sus derivados y otros compuestos semejantes. Está bien establecida su eficacia para aliviar la depresión mayor y está creciendo su apoyo en su empleo en otros trastornos psiquiátricos.

Antipsicóticos, Neurolépticos:

Tranquilizantes mayores (reserpina, fenotiazina, haloperidol) tienen las siguientes características: Crean un estado de diferencia o desinterés psicoafectivo. No poseen empleados en dosis usuales, una verdadera acción narcótica. Son eficaces en los estados de excitación, agitación psicótica y ansiedad. Reducen la impulsividad y la agresividad. Enmiendan los procesos psicotrópicos de las psicosis aguda, crónica y experimental. Producen manifestaciones de origen vegetativo y extrapiramidal. Su acción dominante sería extracortical. No producen dependencia.

Barbitúricos:

Pertencen al grupo de medicamentos popularmente conocidos como “pastillas para dormir”. Se trata de sustancias cuya función principal es la de deprimir las funciones del sistema nervioso central. Los barbitúricos se producen en forma sintética. Los barbitúricos deprimen con carácter reversible la actividad de todos los tejidos excitables. El sistema nervioso central es particularmente sensible, e incluso cuando se administran en concentraciones anestésicas, son débiles los efectos directos sobre los tejidos periféricos excitables. Sin embargo en caso de intoxicación aguda por barbitúricos sobreviene déficit en las funciones cardiovasculares y periféricas de otras clases.

Barbiturismo:

M. A., Barbiturismus. Intoxicación aguda o crónica por los barbitúricos.



Benzodiacepinas:

Familia de psicofármacos llamados también "tranquilizantes menores", que se prescriben con frecuencia en casos de ansiedad e insomnio.

Cafeína:

Sustancia estimulante que se encuentra en el café, el té y los refrescos de cola. Es probablemente la droga más popular del mundo.

Cafeísmo:

Estado morbosos o intoxicación por abuso de café.

Canabina o cannabina:

Nombre de una resina, de un alcaloide hipnótico de un glucósido de la Cannabis Indica.

Canabinol:

Esencia, derivada de cannabis; parece ser el principio más activo del cáñamo y el componente más eficaz del hachís.

Cannabinomanía:

Canabismo, consumo habitual de cannabis.

Cannabinismo:

Estado morbosos o intoxicación producida por el abuso de cannabis, marihuana o hachís.

Cannabis sativa:

Variedad de cáñamo de cuyas hojas se obtiene la marihuana. Su resina recibe el nombre de "hachís" o "hashish".



Catecolaminas:

Nombre genérico de las aminas derivadas del catecol o 1,2 bencenodiol, las más importantes son la adrenalina y noradrenalina y su predecesor la DOPA (dehidrofenilalanina) de acción simpaticomimética.

Cocaína:

Droga estimulante que proviene de una planta cultivada en algunos países de América del Sur, principalmente en Perú y Bolivia eritropsilon coca. Esta planta requiere un clima templado y húmedo. Alcanza una altura de cerca de un metro y medio. Las hojas son lisas y de forma oval y crecen en grupos de siete en cada tallo.

Codeína:

Se obtiene en su mayor parte de la morfina. Su poder adictivo es mucho menor que el de las drogas anteriores y debe tomarse en grandes cantidades y durante mucho tiempo para causar dependencia. Puede ingerirse o inyectarse. Se presenta en forma de polvo blanco o de tabletas. Como medicamento, la codeína se emplea extensamente en forma de jarabes y tabletas para suprimir la tos. También se usa para aliviar el dolor, aunque sus efectos analgésicos son diez veces menores que los de la morfina.

Consumo de sustancias psicoactivas:

Rubro genérico que agrupa diversos patrones de uso y abuso de estas sustancias, ya sean medicamentos o tóxicos naturales, químicos o sintéticos.

Crack:

Droga estimulante derivada del clorhidrato de cocaína que habitualmente se fuma.

Craving:

Se refiere al anhelo fuerte, intenso e irreprimible (la mayor parte de las veces), de consumir psicotrópicos u otras sustancias. Esta condición exhibe la pérdida del control sobre el consumo.



Delirio:

Trastorno de las facultades mentales, con alteración de la moral o sin ella, que se manifiesta por lenguaje incoherente, excitación nerviosa e insomnio.

Delirio tóxico:

Estado de confusión agudo con alucinaciones, delirios, agitación y paranoia, provocado por la ingestión de una o más sustancias.

Delirium tremens:

Trastorno mental caracterizado principalmente por la incapacidad para percibir la realidad; confusión, alucinaciones, angustia, temblor generalizado, sudación excesiva, deshidratación y en ocasiones, convulsiones. Se presenta en los alcohólicos crónicos de uno a tres días después de que dejan de beber abruptamente.

Demencia:

Estado de alineación caracterizado por la pérdida o disminución de la mente, de ordinario en correspondencia con lesiones anatómicas de naturaleza destructiva, focales o difusas.

Dependencia cruzada:

La capacidad farmacológica de un agente o clase de sustancias para suprimir las manifestaciones del síndrome de abstinencia, de otras sustancias o clases y mantener el estado físico del dependiente.

Dependencia Física:

Es un estado de adaptación biológica que se manifiesta por trastornos fisiológicos más o menos intensos cuando se suspende bruscamente la droga.



Dependencia Psíquica:

Equivalente al término habituación. Uso compulsivo de la droga sin desarrollo de dependencia física, pero que implica también un grave peligro para el individuo.

Depresión Mental:

Trastorno caracterizado por disminución del tono afectivo, tristeza o melancolía, hipotimia.

Depresor:

Droga psicoactiva que inhibe las funciones del Sistema Nervioso Central (SNC). El grupo de sustancias depresoras incluye, entre otros, fármacos tales como el alcohol, los barbitúricos y una enorme variedad de sedantes sintéticos y somníferos.

Destoxicación o Desintoxicación:

Reducción de las propiedades tóxicas de los venenos o tóxicos.

Diagnóstico:

Parte de la medicina que tiene por objeto la identificación de una enfermedad fundándose en los síntomas de ésta.

Dosificación:

Determinación y regulación de las dosis.

Dosimetría:

Determinación exacta y sistemática de las dosis.

Dosis:

Cantidad determinada de un medicamento o agente terapéutico.



Depresores:

Disminuyen las reacciones del Sistema Nervioso Central (barbitúricos o alcohol).

Doping:

Uso o manejo de sustancias que artificialmente proveen a un individuo la mejoría e incremento de su capacidad física o psicológica a efecto de potenciar su condición atlética.

Droga ilegal o ilícita:

Es todo fármaco, adictivo o no, que puede causar daño al organismo y al psiquismo y que ha sido incluido en las listas de sustancias prohibidas que la legislación de cada país ha elaborado para los fines de proteger al individuo y a la sociedad.

Droga lícita:

Es cualquier fármaco no incluido en la lista de las sustancias que han sido declaradas ilegales por la legislación de cada país. Las más importantes son los psicofármacos medicinales sujetos a reglamentación, la nicotina contenida en el tabaco, y el etanol (alcohol etílico) de las bebidas alcohólicas.

Droga sintética:

Droga que no tiene un origen vegetal, que ha sido sintetizada en el laboratorio.

Droga:

Desde el punto de vista legal, en México son todas las sustancias que la legislación comprende bajo los términos “estupefacientes y psicotrópicos”.

Droga de impacto:

Se entiende como la droga que el paciente identifica con más capacidad de producirle efectos negativos (problemas), ya sea en el área de salud, familiar, legal o laboral, que motiva principalmente la demanda de tratamiento.



Droga de inicio:

De acuerdo con la información aportada por el propio paciente, se refiere a la primera droga consumida.

Drogadicción:

Uso compulsivo de sustancias químicas dañinas al individuo, a la comunidad o a ambos.

Drogas Parasimpaticomiméticas:

Producen efectos similares a los que crea la estimulación de los nervios parasimpáticos.

Drogas Parasimpaticolíticas:

Provocan efectos similares a los producidos por la interrupción de la transmisión en un nervio parasimpático, desarrollando una acción destructiva sobre las fibras del nervio parasimpático o bloqueando la transmisión de los impulsos de éste.

Drogas Psicoanalépticas o Psicotónicas:

Sustancias químicas (estimulantes) que se caracterizan por acelerar las reacciones del Sistema Nervioso Central (anfetaminas).

Drogas Simpaticolíticas:

Bloqueadores de la transmisión de impulsos de las fibras posganglionares a los órganos efectores o tejidos, inhibiendo la contracción del músculo liso y la secreción glandular.

Drogas Simpaticomiméticas:

Producen efectos que semejan los impulsos transmitidos por las fibras posganglionares del Sistema Nervioso Simpático.



Esquizofrenia:

Grupo de trastornos psicóticos caracterizados por desórdenes del pensamiento, del humor y la conducta. Los trastornos del pensamiento pueden llevar a la mala interpretación de la realidad, a los delirios y alucinaciones. La esquizofrenia es la más típica de las psicosis. (En lenguaje popular, “locura”).

Estimulantes:

Drogas que aceleran la actividad mental y que por lo tanto, producen estados de excitación.

Estupefaciente:

Droga psicoactiva narcótica y analgésica que provoca adicción.

Éxtasis (tacha):

Droga sintética de efecto estimulante, de estructura química similar a la anfetamina (de las llamadas drogas “de diseño”).

Farmacodependencia:

Es el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces, para evitar el malestar producido por la privación.

Fármacos o Drogas:

Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más de sus funciones.



Flashback:

Trastorno que se presenta posterior al consumo de alucinógenos y como consecuencia del mismo, pero sin requerir nueva administración.

Gamahidroxitirato:

GHB, o gamma-hidroxitirato, es un componente normal del metabolismo de los mamíferos; Se encuentran en forma natural en cada célula del cuerpo humano y es considerado como un nutriente. Es un precursor del ácido gama-hidroxitirico.

Hábito:

(Del lat. habitus). Costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de un mismo acto.

Habitación:

Adaptación gradual a un estímulo o medio. Aumento de la tolerancia a una droga desarrollada por su repetida administración.

Hashís, hashish:

Del árabe. Hasis, hierva. Preparación de hojas y sumidades de la cannabis sativa, excitante o sedante del Sistema Nervioso, según las dosis. A dosis moderadas y asociada con café o té, produce una excitación manifiesta de las funciones cerebrales, y en algunos casos genésicos. Resina de la planta de la marihuana (Cannabis sativa).

Heroína:

Es un derivado de la morfina que se produce también mediante procedimientos químicos relativamente sencillos. Sus efectos son de cuatro a diez veces más poderosos que los de la morfina. En su forma pura, es un polvo cristalino blanco tan fino que desaparece al frotarse contra la piel.



Hidrocarburos:

Se refiere a las combinaciones que resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de los hidrocarburos alifáticos o de cadenas laterales de los cíclicos, por uno o más grupos hidroxílicos. A grandes dosis es un veneno narcótico que produce intoxicación con incoordinación muscular, delirio y coma.

Hipnótico:

Droga que produce sueño.

Ice:

Droga sintética de efecto estimulante de estructura química similar a la anfetamina. (De las llamadas drogas “de diseño”).

Inhalables:

Forman un grupo especial de los depresores del Sistema Nervioso, constituidos por una serie de sustancias químicas diversas, caracterizados todos por tratarse de gases, líquidos volátiles y aerosoles, que al ser inhalados y absorbidos por vía pulmonar, producen alteraciones de la conciencia, de la percepción, cognición, volición, y debido a la intoxicación primero y después del daño cerebral, son causa de problemas conductuales. (Entre éstas se incluyen pegamentos, lacas, thinner, cementos, gasolina, acetona, etc.).

Intoxicación:

Es un estado mórbido resultante de la presencia de toxinas en el organismo.

Kirsch:

Licor alcohólico obtenido por la fermentación y destilación de las cerezas.



Krocodil:

Droga sintética de fabricación casera, extraída de la codeína, en el proceso se obtiene desomorfina. Se utiliza en forma inyectada y causa efecto depresor y endurecimiento de los tejidos con tinte verdoso.

LSD: (dietilamida del ácido lisérgico).

Droga sintética psicodisléptica o alucinógena de producción y distribución ilegal. Se deriva de un hongo llamado cornezuelo del centeno. Comúnmente se prepara como un líquido, sin color, sin olor y sin sabor, también se encuentra como polvo, en pequeñas píldoras blancas o de color, como tabletas o cápsulas.

Mal Viaje:

En el argot de los usuarios, se refiere a la mala experiencia dada por el uso de algún determinado psicotrópico.

Marihuana:

Es una droga alucinógena que se puede presentar en diversas formas, se obtiene de una planta llamada cannabis, que tiene las variedades sativa e indica, conocido también como cáñamo indio o simplemente cáñamo. Esta planta se cultiva y también crece silvestre. La altura de la planta varía entre uno y tres o más metros. Las hojas son largas, estrechas y aserradas. Adoptan la forma de abanico. Cada abanico suele tener cinco o siete hojas, pero llega a poseer desde tres hasta quince. Estas hojas son lustrosas y pegajosas y su superficie superior está cubierta por vellos cortos.

Metadona:

Droga sintética adictiva que se utiliza en el tratamiento de la adicción a la heroína.

Metanfetamina:

Droga derivada de las anfetaminas que produce efectos subjetivos semejantes a los causados por la cocaína. La metanfetamina intravenosa o fumada es causa de un síndrome de abuso y dependencia semejante a la que produce la cocaína.



Mezcalina:

Sustancia alucinógena. Es el ingrediente activo obtenido de los capullos de un cacto llamado peyote. El peyote crece principalmente en México. Los capullos pueden masticarse, o bien ser molidos en forma de polvo. Este polvo se coloca en cápsulas para ser ingerido o se usa para fabricar un líquido de color café que se bebe. Los capullos tienen un fuerte sabor amargo.

Morfina:

Prototipo de las drogas opiáceas de efecto analgésico que produce euforia con somnolencia placentera y que posee un alto potencial adictivo. Se extrae del opio mediante un sencillo procedimiento químico.

Narcóticos:

Este término se aplica a las llamadas drogas fuertes que producen un estado de euforia, tranquilidad, modorra, inconsciencia o sueño (morfina, codeína, heroína).

Neuroadaptación:

Es el proceso bioquímico que las neuronas del sistema nervioso central realizan ante la presencia frecuente de una droga psicoactiva, de tal modo que alteran su propia fisiología y por tanto su reactividad a esa sustancia. La tolerancia es la manifestación clínica de esta “adaptación” al fármaco; si el consumo continúa, es frecuente y en dosis elevadas, se presenta el otro fenómeno central de la adicción: el síndrome de abstinencia o de supresión. Tolerancia y síndrome de supresión son, así, la expresión clínica de la neuroadaptación.

Nicotina (tabaco):

Tiene importancia médica considerable por su toxicidad, su presencia en el tabaco y su capacidad para producir dependencia en quienes la consumen. La nicotina es uno de los pocos alcaloides líquidos naturales. Puede ocurrir envenenamiento con nicotina como consecuencia de ingestión accidental en aspersiones insecticidas, en las cuales se encuentra esta sustancia como agente eficaz, lo mismo que en niños que ingieren productos del tabaco.



Opiáceos:

Drogas derivadas del opio que tienen la propiedad común de suprimir el dolor, producir euforia con somnolencia placentera y causar dependencia. Son sustancias de alto potencial adictivo.

Opio:

Líquido resinoso de la cápsula de la amapola o *Papaver somniferum* (planta de opio). El opio cuyo principal ingrediente activo es la morfina, contiene sustancias psicoactivas que pueden extraerse en forma pura, como la codeína. De la morfina se sintetiza la heroína.

Patrón de consumo:

Se refiere a las características del modo o forma con que el consultante mantiene el consumo o uso de un determinado tipo de droga(s) y el orden consecutivo de las diferentes sustancias consumidas desde su inicio.

PCP (Polvo de ángel):

Fenciclidina. Sustancia sintética alucinógena originalmente utilizada como anestésico en veterinaria.

Peyote:

Cactácea originaria de determinadas áreas de México y América Central, del cual se obtiene la mezcalina.

Prevención:

Conjunto de acciones que permiten evitar y detener la historia natural de cualquier enfermedad.

Poliusuario:

Persona que consume dos o más tipos de drogas.



Psicopatológico:

Término que se aplica a las manifestaciones de los trastornos mentales.

Psicosis:

Trastorno mental en el que la capacidad individual para pensar, responder emocionalmente, recordar, comunicarse, interpretar la realidad y conducirse de manera adecuada se encuentra deteriorada. Suele cursar con delirios y alucinaciones.

Psicotrópico:

Sustancia que altera el funcionamiento mental (pensamiento, juicio, razonamiento, memoria, etc.).

Psilocibina:

Ingrediente activo de la seta *Psilocybe mexicana*. Sustancia psicodisléptica o alucinógena de efectos similares a los de la LSD.

Sedación:

Estado de disminución de las actividades funcionales, de la irritabilidad o del dolor, provocado por una sustancia sedante.

Sedante, sedativo:

Que tiene virtud de calmar o sosegar los dolores o la excitación nerviosa. Proviene del latín *sedare*, que significa calmar o “apaciguar”.

Síndrome de abstinencia:

Conjunto de trastornos físicos y psicológicos que presenta el individuo que ha desarrollado dependencia de una droga cuando suspende su consumo bruscamente o cuando lo disminuye en forma significativa.



Síndrome amotivacional:

Son signos y síntomas clínicos asociados al uso de sustancias, tales como apatía, pérdida de la efectividad, disminución para desarrollar planes a largo plazo, poca tolerancia a la frustración, se altera la capacidad de concentración y dificultad para continuar con rutinas elementales.

Tabaquismo:

Es una enfermedad ocasionada por el consumo de tabaco en donde se afectan todo el organismo, con repercusiones en el área física, mental y social.

THC (Delta-9-tetrahidrocannabinol):

Principal ingrediente activo de la cannabis sativa, a las que se atribuye la mayor parte de las acciones psicoactivas de la planta.

Tolerancia:

Adaptación del organismo a los efectos de la droga; esto implica la necesidad de aumentar la dosis para seguir obteniendo resultados de igual magnitud.

Toxicomanía:

Es una condición que se caracteriza por el envenenamiento del Sistema Nervioso Central, recurrente o continuo, que no responde a motivo médico o terapéutico alguno, sino a los que busca el propio individuo.

Tranquilizantes:

Los ansiolíticos y sedantes, en particular las benzodiazepinas se usan para el tratamiento farmacológico de los trastornos de la ansiedad.



Tratamiento:

Sistema y métodos que se emplean para curar las enfermedades o problemas.

Uso de una droga:

Es el hecho de introducir en un organismo vivo una sustancia mediante prescripción y conforme a la práctica médica.

Uso recreacional:

Consumo de sustancias usualmente referido a las de tipo ilegal bajo circunstancias sociales, a efecto de producir relajación; no necesariamente debe considerarse tal uso como sinónimo de dependencia.

Veneno o tóxico:

Toda sustancia natural o sintética (química) que al ser introducida al organismo por cualquier vía (oral, intramuscular, etc.) causa daños que pueden ser parciales o totales.

Volátil:

Característica de una sustancia que se evapora



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2018



DIRECTORIO

Ing. Enrique Alfaro Ramírez

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y presidente del Consejo Estatal Contra las Adicciones.

Dr. Fernando Petersen Arangúren

Secretario de Salud y Coordinador del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

Dr. Ignacio Contreras Ramírez.

Secretario Técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

Dr. Luis Javier Robles Arellano.

Coordinador General del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco.

Dra. Gloria Gómez Sandoval.

Coordinadora de Enlace del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco.

LTS. María Patricia Carlín Sánchez.

Capturista y Diseño en Comunicación Visual del SISVEA.

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández.

Proceso de Análisis Estadístico

Edición: Junio del 2019