



SALUD



RESULTADOS SISVEA 2017 JALISCO

Contenido

RESULTADOS 2017	11
MÉTODO	15
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	16
ESTRATEGIAS	17
ACCIONES.....	19
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS CIVILES QUE PARTICIPAN EN EL SISVEA POR INDICADOR.....	21
Indicador: Tratamiento y Rehabilitación	29
SEXO MASCULINO Y POR REGIÓN SANITARIA	76
SEXO FEMENINO Y POR REGIÓN SANITARIA	118
INDICADOR: Puesto Centinela De Urgencias.....	161
Indicador: Servicio Médico Forense	173
INFORMACIÓN EN CADÁVERES <i>POSITIVOS</i> A DROGAS	185
INFORMACIÓN DE CADÁVERES <i>NEGATIVOS</i> A DROGAS	193
CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS ADICTIVAS	206
GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	226

Mensaje del Secretario Técnico:

Con el objetivo de conocer y monitorear de cerca el uso y abuso de drogas, en Jalisco continuamos aplicando el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, que como herramienta epidemiológica nos brinda información sobre los indicadores que tienen que ver de manera directa con su consumo.

Con el indicador del SISVEA, Tratamiento y Rehabilitación, conocemos el perfil sociodemográfico del paciente, patrón del consumo de drogas, droga de inicio, droga de mayor impacto y la de mayor consumo, detectamos los cambios en las vías de administración, nombres coloquiales y patrón de consumo, así como situaciones de riesgo, en cuanto al uso de drogas intravenosas.

En cuanto a menores de edad con problemas legales en este indicador asocia el uso y abuso de drogas en menores que comenten la infracción bajo el efecto de drogas así como el antecedente de ser usuarios habituales de drogas.

En el indicador Puesto Centinela de Urgencias, nos informa la prevalencia de ingresos a servicios de urgencias médicas bajo el efecto de drogas o a consecuencia del uso de éstas, tanto para aquellos pacientes que llegan por lesión de causa externa o bien por alguna patología

En el indicador Forense, nos marca la prevalencia de personas mayores de 5 años que pierden la vida bajo el efecto de drogas, así como la causa de ésta.

Sin duda el consumo de sustancias afecta de manera negativa cualquier área del ser humano, tanto en su salud física, familiar y social. Las ventajas de este sistema es que ofrece información de manera continua nos permite contar con información por Región Sanitaria y un panorama de lo que sucede en Jalisco, lo que favorece el desarrollo de actividades en prevención, capacitación, tratamiento, rehabilitación y la reinserción social del usuario. Programas acordes a las necesidades y prioridades detectadas a través de este sistema.

Por lo anterior, exhorto a todos los establecimientos que atienden a pacientes con problemas uso y abuso de drogas, continúen participando de manera activa con el registro de cada uno de los casos que se atiendan en nuestro Estado.

Así mismo pongo a sus órdenes esta información para que la utilicen en el desarrollo de proyectos y programas que se expresen en acciones que beneficien a la población en Jalisco.

Dr. Gustavo Iglesias Robles

Secretario Técnico

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco.

Resultados 2017

Edición Junio 2018.

Coordinación Editorial.

Dr. Luis Javier Robles Arellano.

Edición.

Dra. Gloria Gómez Sandoval.

L.T.S. María Patricia Carlín Sánchez.

Lic. Alejandra Gutiérrez Miramontes.

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández.

Tec. Claudia Mónica Prado Palacios.

Producción Software Interactivo.

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández.

D.R. Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

Lago Tequesquitengo 2600, Colonia Lagos del Country. Zapopan Jalisco México.

01 800 536 94 44, 01 33 38 23 20 20

Hecho en México.

Citación sugerida: Iglesias Robles G, Robles-Arellano L J, Gómez-Sandoval G, Carlín-Sánchez MP, Maury-Hernández HE. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco, Resultados 2017. Secretaría de Salud Jalisco.

Colaboradores del SISVEA por Región Sanitaria.

Región Sanitaria I Colotlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Colotlán.

Lic. Ana Hilda Luna López

Lic. TS. Maribel Vargas Franco.

Región Sanitaria II Lagos de Moreno.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Lagos de Moreno.

Lic. Norma Angélica Nava Neri.

Lic. Rocelia Huerta Martín

María Eugenia de la Cruz Vázquez.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de San Juan de los Lagos.

Mtra. Margarita González de la Torre.

Lic. TS. Guadalupe Liliana Murillo Mares.

Región Sanitaria III Tepatitlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tepatitlán de Morelos.

Lic. Víctor Daniel Sánchez Esqueda

Eduardo Javier Hernández Orozco.

Lic. María del Refugio Villaseñor Tavera

Lic. Yolanda Baltazar Cruz.

Lic. Norma Lilia Delgadillo Perales.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Arandas

Ing. Felipe de Jesús Hernández Orozco.

Región Sanitaria IV La Barca

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Ocotlán.

Lic. TS. Verónica Gallardo López.

Región Sanitaria V Tamazula.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tamazula de Gordiano.

Lic. Psic. Gilberto de Jesús García Medina.

Lic. TS. Marcela de Jesús Ávalos Hernández.

Región Sanitaria VI Zapotlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Zapotlán el Grande

Lic. Psic. José Antonio Álvarez Moreno.

Lic. Erika Alejandra González Sastre.

Rocío Yolanda Aguilar Peralta.

Lic. Silvia Lorena Rodríguez Sandoval

Lic. Judith Marlene Romero Bocanegra.

Región Sanitaria VII Autlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Autlán de Navarro.

Mtro. Jorge Jiménez Aguilar

Lic. T.S. Griselda Bartolo Ramos.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de La Huerta.

Lic. Refugio Covarrubias Romero

Lic. José Octavio Guerrero Tejeda.

Región Sanitaria VIII Puerto Vallarta.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Puerto Vallarta.

Mtra. Lorena Tirado Fuentes.

Lic. TS. Xochiquetzal Pedro Gutiérrez.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Mascota.

Lic. José Benito González Garibaldi.

María de los Ángeles Ramírez Fuentes

Lic. Ana Genoveva Robles Gavilán

Región Sanitaria IX Ameca.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Ameca

Ing. Sergio Raúl Orozco Andalón

Lic. Carmen Dolores Becerra Ávila.

Lic. TS. Luz Marina Medina Nuño.

Lic. Francisco Javier Calata Padilla.

Región Sanitaria X Zapopan.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Zapopan I.

Dra. Laura Graciela Torres Rodríguez.

Brenda Martínez Prado.

María Magdalena Negrete Solorio.

José Francisco Pérez y Pérez

Centro Nueva Vida de Zapopan II.

Lic. Claudia Lara Sánchez

Lic. TS. Irma Aracely Almaral Rodríguez.

Lic. Judith Velazco Gibbens

Lic. Fernando Navarro Angulo

Katya Flores Olvera

Región Sanitaria XI Tlaquepaque.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tlaquepaque

Lic. TS. Jeannie Oseguera Jiménez.

Lic. TS. Araceli Carrillo Ramírez.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tlajomulco.

Mtro. Raúl Rosete Ramírez.

Jorge Antonio Hernández García.

Región Sanitaria XII Tonalá.

Centro Nueva Vida de Tonalá I.

Lic. Sergio Martínez Arellano.

Lic. Constanza Moreno Torres

Lic. TS. Martha Leonor Hernández Orozco.

Centro Nueva Vida de Tonalá II.

Lic. Gustavo Guzmán Félix.

Lic. TS. Cindy Adriana Ríos Hernández.

Lic. TS. Sonia Karina Fregoso Flores.

Lic. Carlos Nabor Aguilera Romo

Región Sanitaria XIII Guadalajara.

Centro de Atención Primaria en Adicciones Guadalajara

Lic. Adalberto Muñoz Márquez

Lic. María del Pilar Magaña Domínguez

Lic. TS. Araceli Ramos Corona

Secretariado Técnico

Dr. Luis Javier Robles Arellano.

Dra. Gloria Gómez Sandoval.

Lic. María Patricia Carlín Sánchez.

Lic. Alejandra Gutiérrez Miramontes

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández

Tec. Claudia Mónica Prado Palacios



SALUD



SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES EN JALISCO SISVEA

RESULTADOS 2017

PRESENTACIÓN

El uso y abuso de sustancias adictivas es un fenómeno que ha presentado comportamientos con incrementos en todo el país incluyendo en nuestro Estado, de acuerdo a la Encuesta del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017), donde se reporta que la incidencia acumulada en el consumo de drogas ilegales en población de 12 a 65 años a nivel nacional alcanzó el 9.9% y en Jalisco el 15.3%, en el uso de marihuana el 12.2%, cocaína el 6.9%, y los estimulantes de tipo anfetamínico el 2%, colocando a nuestro estado los primeros lugares de porcentaje en el consumo.

El uso de sustancias adictivas es un problema de salud pública que tiene cambios constantes y con características específicas en cada estado tanto en los tipos de drogas y patrón de consumo, vías de administración así como los nombres, lugares donde se adquieren y consumen.

Ante este reto el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SISVEA) de las adicciones busca aportar datos relacionados con estas sustancias en personas que presentan problemas de consumo y necesitan atención para su consumo.

El SISVEA nace en el año de 1990 con el objetivo de contar con un diagnóstico actualizado, anual de los indicadores de salud relacionados con el uso y abuso de drogas.

En 1994 la NOM 017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica establece que este sistema es parte del SINAVE y la notificación adquiere un carácter obligatorio de los casos atendidos en las entidades federativas.

En el año 2009 debido a las necesidades de contar con un nuevo sistema informático que estuviera acorde con un nuevo sistema informático se integra el Instituto Nacional de Salud Pública en la generación y modificación del Sistema de tecnología de captura y análisis, herramienta que nos permite realizar análisis específicos en cada una de las áreas que coordinan los registros y captura de información.

El programa ha evolucionado en la información como la fusión de cédulas de Hospitales Psiquiátricos, Alcohol y Tabaco en el Indicador de Tratamiento y Rehabilitación en el año 2010 así como el Sistema de Captura, en el año 2017 también se modifican la cédula de los 4 indicadores que lo conforman.

En 2017 la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informa que solo se deberá contar con información de los Centros de Tratamiento no Gubernamentales, lo cual limita a este programa para contar con información de las 13 Regiones Sanitarias

El SISVEA, cuenta con la información de cuatro indicadores de los cuales dos se aplican en las 13 Regiones Sanitarias del Estado. Nos permite identificar el perfil sociodemográfico del usuario, las tendencias de consumo y vías de administración, el patrón de consumo por sexo, escolaridad y grupo de edad.

El SISVEA es un fuente de información para los tomadores de decisiones y desarrolladores de programas preventivos en localidades, municipios así como para el Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas (OMEXTAD) que tiene como objetivo contar con un diagnóstico epidemiológico oportuno y confiable en el ámbito de las adicciones, desde municipio, región sanitaria y estado y a nivel nacional.

El SISVEA continúa siendo un referente en información en materia de adicciones ya que ninguna otra fuente de información tiene acceso a población tan específica como los usuarios de drogas con adicciones severas.

JUSTIFICACIÓN

El consumo de sustancias adictivas se tiene repercusiones en la salud física y mental, además se asocia a problemas sociales como violencia familiar, violencia social, además se asocia a la morbimortalidad en la población y sobre todo en la juventud y adolescencia.

En las tendencias en la incidencia acumulada reportadas en la ENCODAT 2016 – 2017, Jalisco se encuentra ubicado dentro de los primeros 5 lugares en consumo de drogas ilegales, cualquier droga y marihuana. Sin embargo en el uso de estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) es de observar que las tendencias tienden a reducirse, e incluso en los menores de 17 años no se reportaron consumo en el patrón de consumo último año.

En las tendencias entre las encuestas 2008, 2011 y 2016-2017 se aprecian cambios significativos en estas sustancias, sin embargo la información se genera cada 5 años en promedio desde que se inició con la Encuesta Nacional Contra las Adicciones. (ENA)

Como se mencionó anteriormente el fenómeno adictivo es un problema de salud pública en movimiento constante en los tipos de drogas, formas de presentación, vías de administración, mezclas y situaciones de riesgo, enfermedades situaciones de urgencias y mortalidad especialmente por accidentes, homicidios y suicidios.

Para intervenir de manera más eficaz a este complejo fenómeno es necesaria información actualizada sobre el problema y así direccionar o redirigir las estrategias de intervención tanto en prevención, tratamiento, rehabilitación pero también sobre capacitación.

El SISVEA se desarrolla en la Dirección General de Epidemiología en el año 1991, integrado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE. Los datos registrados aportan información además de conocer lo que sucede en Jalisco y sus Regiones a conocer el comportamiento a nivel nacional, e internacional.

Los resultados que se dan a conocer a los a todos los sectores de la población a través de información electrónica para el desarrollo de programas que dirigidos a prevenir el uso y abuso de sustancias adictivas acordes a las necesidades de cada una de las regiones del estado de Jalisco.

La importancia de la permanencia del sistema estriba en que ha generado información desde el año de 1994, por lo que contamos con información epidemiológica desde hace ya 20 años y publicado en el portal del CECAJ desde el año 2002.

Hasta el momento se cuenta con la participación de 119 Instituciones y Organismos Civiles que colaboran con el SISVEA; 103 en el Indicador de Tratamiento y Rehabilitación, 32 en el indicador de Puesto Centinela de Urgencias, el Centro de Observación y Clasificación de Menores Infractores y el Servicio Médico Forense de Zona Metropolitana de Guadalajara.

Es importante mantener este Programa funcionado de manera permanente para lograr una vigilancia epidemiológica del Estado sobre el comportamiento del fenómeno adictivo. Asimismo, mantener capacitado a nuestros recursos humanos para que tengan mejores oportunidades de tratar el problema de manera profesional tanto en el ámbito preventivo, curativo y de reinserción social.

Este sistema se apega al **Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030**, el cual tiene el propósito de mejorar la salud de los Jaliscienses con servicios basados en la equidad, calidad, calidez y humanismo y con plena participación de la sociedad civil organizada.

El Secretariado Técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, coordina y opera este Sistema, lo cual garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados y promueve la continuidad, ya que es un procedimiento de concentración de información que tiene como premisa la actualización de los datos; nos queda claro que no basta contar con la información científica, sino saber qué hacer con ella para que ésta cumpla su cometido primordial para la planeación de programas de prevención y la toma de decisiones en Jalisco y en nuestro país.

MÉTODO

El SISVEA es un Programa bien establecido que se aplica en todo el País, en Jalisco este se aplica desde hace años, aplica el indicador de consumo de drogas en las 13 Regiones Sanitarias que conforman el Estado, dándonos así un panorama epidemiológico, Estatal, Regional y Local de la dimensión del problema.

Estas Regiones son estudiadas a través de los **Centros de Atención Primaria en Adicciones**, quienes tienen la coordinación de los establecimientos que brindan atención en adicciones en la Región Sanitaria donde se encuentran ubicados.

El SISVEA cuenta con cuatro indicadores que buscan información de tipo socio demográfico como son: el patrón de consumo, sustancia y edades de inicio y la morbimortalidad relacionada con las sustancias de abuso.

Las cédulas se aplican por personal capacitado, exclusivamente en Centros de Tratamiento para enfermos de Alcoholismo, Tabaquismo y Farmacodependencia, en el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico de Menores Infractores, Hospitales Psiquiátricos, Servicio Médico Forense y para el indicador "Puesto Centinela de Urgencias" se aplican en Hospitales que cuenten con servicios de urgencias médico-quirúrgicas; para cada uno de ellos se cuenta con una cédula específica.

Las cédulas en este 2017 se actualizaron a nivel nacional y se han estado aplicando desde marzo 2017 a la fecha en los cuatro indicadores, así mismo el programa de captura a CT_SISVEA, la información que se envía a la Dirección General de Epidemiología se excluye la información de los Centros de Atención Primaria en Adicciones y los Centros de Integración Juvenil sin embargo se incluyen en esta edición para continuar contando con información que represente a la mayor parte del estado y a sus regiones sanitarias.

Una vez capturadas se revisa la base de datos la cual es enviada a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien almacena y procesa el SISVEA con resultados nacionales.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Contar con un diagnóstico actualizado, periódico, oportuno y confiable, que nos permita conocer las situaciones asociadas directa o indirectamente con el uso y abuso del consumo de sustancias que causan adicción en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en las Regiones del Estado para contar con un panorama general en Jalisco y contribuir con información a nivel nacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Mantener un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, como un sistema único y de información continua para contar con un diagnóstico actualizado de las adicciones en Jalisco u sus Regiones.
- Generar información periódica y ágil sobre la prevalencia, incidencia y características del consumo de alcohol, tabaco, drogas médicas e ilícitas.
- Detectar con oportunidad los cambios en los patrones de consumo de alcohol, tabaco y drogas tanto médicas como ilegales.
- Identificar los patrones de riesgo de morbilidad asociados al uso y abuso en el consumo de alcohol, tabaco y drogas médicas e ilícitas.
- Registrar el consumo de drogas o mezclas nuevas.
- Generar hipótesis y proponer protocolos de investigación epidemiológica asociados al consumo de sustancias adictivas.

ESTRATEGIAS

- Para todos los indicadores y estrategias desarrolladas se aplica la siguiente metodología:
- Se asesoró y capacitó a todas las Instituciones y Organismos que nutren este Sistema.
- Los Centros de Atención Primaria en Adicciones, recaban información de los centros de tratamiento que se encuentran ubicados dentro del área de competencia, quienes capacitan y recaban las cédulas generadas por cada establecimiento, entregando acuse de recibo.
- Las cédulas específicas para cada indicador son llenadas por personal capacitado de las Instituciones y Organismos no Gubernamentales y se aplican a los pacientes que acuden de los diferentes Establecimientos que colaboran con el SISVEA.
- Para el caso del indicador de mortalidad, la cédula se llena por un médico capacitado y se obtiene la información de los registros del Servicio Médico Forense.
- El proceso de los fluidos corporales para detectar sustancias adictivas lo realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de donde se toman los resultados.
- Las cédulas se recaban en forma mensual en las oficinas del CECAJ y CAPA`s quienes revisan que esté llena de manera completa y correcta.
- Las cédulas se codifican de acuerdo al manual del SISVEA 2017, el cual es utilizado en toda la República y la información se captura en el equipo de cómputo utilizando el programa Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones y con tablas dinámicas del programa de Excel.
- La información se revisa y corrige, para tener una base de datos correcta y confiable.
- La información capturada se envía mensualmente por vía electrónica a la Dirección General de Epidemiología en la Ciudad de México.
- Se informa por escrito de los avances en forma mensual al Secretario Técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.
- Se realiza el informe por escrito de los resultados arrojados al finalizar el año de estudio.
- Se retroalimenta con el análisis de resultados arrojados por el SISVEA a las autoridades del Estado, las Instituciones y Organismos que nutren el Sistema.
- Los resultados se difunden a nivel Regional, Estatal y Nacional en forma anual.
- El proceso se evalúa de acuerdo a los criterios del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Programa “Caminando a la Excelencia” en forma mensual.

INDICADORES DEL SISVEA

Los objetivos estratégicos se logran a través de los siguientes indicadores.

- Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales (alcohol, tabaco y drogas médicas e ilícitas).
- Enfermedades y lesiones de causa externa. (Puesto Centinela de Urgencias Médicas)
- Mortalidad en individuos usuarios de drogas. (Forense)
- Consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilícitas en Menores Infractores.

ACCIONES

Indicador:

Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales.

Se captó la población que acude a los diferentes Establecimientos que brindan Tratamiento y Rehabilitación por consumo de sustancias adictivas, permitiendo así conocer el perfil socio demográfico de los usuarios de drogas, el patrón de consumo, edad de inicio, tipo de droga utilizada y droga de mayor impacto, situaciones de consumo de riesgo, como compartir jeringas, lugares donde las consiguen y consumen con mayor frecuencia.

La información fue obtenida a través de la aplicación de la cédula específica a los pacientes que ingresan a los Establecimientos de Tratamiento que están en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM 028 para el Control de las Adicciones (NOM 028-SSA2-1999) por presentar problemas con el uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, por el personal de cada Centro, éstos a su vez han sido capacitados y asesorados en forma permanente por el personal del SISVEA y de Centros de Atención Primaria de Adicciones.

Las cédulas se recabaron en forma mensual por personal del CECAJ a través de visitas y/o citas mensuales, para el caso de los Establecimientos que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los recaban los Centros de Atención Primaria en Adicciones ubicados en la Región Sanitaria según le corresponda.

Indicador:

Puesto Centinela de Urgencias: enfermedades y lesiones de causa externa.

Este indicador se realizó dos veces durante el año, con una periodicidad semestral.

Se aplicó durante una semana tipo. (Semana donde no contenga algún día festivo o puente).

Se incluyeron las Unidades Médicas que cuenten con un servicio urgencias.

Se captaron a todos los pacientes que ingresaron a las Unidades de Urgencias entre el rango de edad de 5 años o mayores, conociendo así, la relación existente entre el uso y abuso de sustancias adictivas y las lesiones de causa externa y enfermedades asociadas, captadas en los Centros de Urgencias Médicas de las 13 Regiones Sanitarias.

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS CIVILES QUE PARTICIPAN EN EL SISVEA POR INDICADOR

Indicador “Tratamiento y Rehabilitación”

1. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Ameca.
2. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Arandas
3. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Autlán
4. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Colotlán
5. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Lagos de Moreno
6. Centro de Atención Primaria en Adiciones de La Huerta
7. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Mascota
8. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Ocotlán
9. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Puerto Vallarta
10. Centro de Atención Primaria en Adiciones de San Juan de los Lagos
11. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Tamazula
12. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Tepatitlán
13. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Tlajomulco
14. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Tonalá I
15. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Tonalá II
16. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Tlaquepaque
17. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Zapopan I
18. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Zapopan II
19. Centro de Atención Primaria en Adiciones de Zapotlán el Grande
20. Centro de Atención Primaria en Adicciones Guadalajara.
21. Centro de Tratamiento y Rehabilitación la Perla de Occidente Femenil
22. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 16
23. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 4
24. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 13
25. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 9
26. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 8
27. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Perla de Occidente Ampliación 3
28. Centro de Tratamiento y Rehabilitación “Hacienda del Lago” A.C.
29. Instituto de formación Integral Barrios Unidos A. C.
30. Centro de Tratamiento y Rehabilitación “Camino Nuevo”
31. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Sol, Amor y Esperanza. A.C.
32. Centro de Tratamiento y Rehabilitación “Integración en Recuperación para Alcohólicos y Drogadictos de Jalisco, (IRA) A. C.
33. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Nueva Fuerza de Vida. A. C.

34. Centro de Tratamiento y Rehabilitación “Drogadictos Anónimos, A. C. (Grupo Providencia)
35. Centro de Desarrollo para Jóvenes “Señor de la Misericordia A. C.
36. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Para Enfermos Alcohólicos y Drogadictos A. C.
37. Centro de Integración Juvenil Zapotlán el Grande. A. C.
38. Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas A. C. Comunidad Terapéutica.
39. Grupo Unido Interesado en Adicciones A.C. GUIA
40. Comunidad Terapéutica Las Hojas A. C.
41. Centro de Integración Juvenil Guadalajara Sur. A.C.
42. Centro de Integración Juvenil Guadalajara Centro A.C.
43. Centro de Integración Juvenil Tlaquepaque. A.C.
44. Centro de Integración Juvenil Puerto Vallarta. A.C.
45. Centro de Integración Juvenil A.C. Kena Moreno.
46. Centro de Tratamiento y Rehabilitación “Clínica Minnesota” A.C.
47. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Casa Nazareth.
48. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Juventud sin Adicciones. A. C.
49. CREAD Republica Mexicana. A. C.
50. Centro de Tratamiento y Rehabilitación. Agua Viva A. C.
51. Centro de Tratamiento y Rehabilitación La Próxima Frontera A. C. unidades: Agua Blanca, Ahualulco del Mercado y Tonalá.
52. Centro de Tratamiento “Guerra Cristiana” A. C.
53. Centro de Tratamiento La Casa de mi padre A. C.
54. Casa Hogar Hombres en Victoria A. C.
55. Grupo MIDRASH. A. C. Unidades Femenil y Varonil.
56. Centro de Tratamiento y Rehabilitación Majonica Samael. A.C.
57. Grupo Jóvenes Vida Nueva A. C.
58. CREAD Zona 1 A. C. de Cuitzeo.
59. CREAD Zona 1 A. C. Chapala.
60. CREAD Zona 1 A. C. Atotonilco.
61. CREAD A. C. de Poncitlán.
62. CRREAD de Michoacán A. C.
63. Grupo Jóvenes Alcohólicos y Adictos Guadalajara A. C.
64. Grupo Fortaleza de Vida A. C. Varonil
65. Grupo Fortaleza de Vida A. C. Femenil
66. Centro de Tratamiento Volver a Nacer A. C.
67. Cristo Esperanza de Vida Nueva A. C.
68. Camina hacia una vida nueva con Cristo A. C.
69. CREEAD Polariss A.C. Varonil

70. CREAD Polariss A.C. Femenil.
71. Nacer en una Fuente de Amor. A.C.
72. Grupo Bendita Libertad A. C.
73. Grupo Jalisco sin Adicciones A.C.
74. Grupo Nuevo Amanecer A. C.
75. Comunidad Terapéutica Tlakati A.C.
76. Comunidad Terapéutica Guerreros de la Luz A. C.
77. Grupo Gama y Zafiro A. C. Unidad Tlaquepaque
78. Grupo Gama y Zafiro A. C. Unidad Zapopan
79. Infinita Necesidad de Amor A. C. Unidad Cuitláhuac
80. Infinita Necesidad de Amor A. C. Unidad Obregón
81. Tepatitlán Empezado a Vivir A. C.
82. Grupo Jóvenes de Tepatitlán A. C
83. CREAD de Tepatitlán.
84. Grupo Fortaleza de Vida A. C. Unidades Varonil y Femenil
85. El Sendero, Fuente de Amor y Servicio A. C. Matriz y Sucursal
86. Centro de Desarrollo para las Mujeres “Nuestra Señora de la Luz. A. C.
87. Misión y vida A. C.
88. CAPPA, Centro de Apoyo a Personas con Problemas de Adicción A. C.
89. Regresando a Dios A. C.
90. Obra Social Hacienda de la Esperanza. A. C.
91. Quinta Sobriedad Emocional A. C.
92. Centro de Tratamiento Under The Tree de Jocotepec.
93. Comunidad Terapéutica GAMAN A.C.
94. Grupo Jóvenes Progreso A.C.
95. Nueva Gente San Juan. A. C.
96. Centro de Tratamiento “México me necesita” A. C.
97. Grupo Reto a la Esperanza A.C.
98. CREAD del Pacífico A.C. Matriz y Sucursal
99. CREAD de Tonalá San Benito de Abad. A. C.
100. Campo Renacimiento A. C.
101. Albergue Zapopan Femenil. A. C.
102. Comunidad Terapéutica Regresando a la Luz A. C.
103. Módulo de Tratamiento para las Adicciones Comisaría de Prisión Preventiva.
104. Clínica Samaria S. A. de C. V.
105. Grupo Generando Familias A. C.

106. Centro de Tratamiento Agua Viva. A. C.
107. Comunidad Terapéutica Ser Libre encontrando el Camino A. C.
108. CAIJE Comunidad Juvenil Terapéutica Libertad y Sentido A. C.
109. Centro de Tratamiento Esperanza de Vivir Libre A. C.
110. Comunidad Terapéutica GAMAN de Ocotlán. A. C.
111. Centro de Tratamiento Libertad para la Libertad A.C.
112. Movimiento Metropolitano de Alcohólicos y Drogadictos A. C.
113. Clínica de Salvación para Alcohólicos y Drogadictos de Occiania A.C.
114. Generaciones en Victoria A. C.
115. Comunidad Terapéutica “La Visión del Mañana” A. C.
116. Comunidad Terapéutica Bettaniia A. C.

Indicador “Puesto Centinela de Urgencias”.

Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cruz Roja Mexicana Delegación Guadalajara.

Cruz Roja Mexicana Unidad Toluquilla.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Ruiz Sánchez”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Rivas Souza”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Delgadillo Araujo”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Leonardo Oliva”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Ernesto Arias”.

Servicios de Salud de El Salto y Majadas.

Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco de Zúñiga.

Servicios Médicos Municipales de Tlaquepaque.

Servicios Médicos Municipales de Tonalá.

Servicios de Salud de Zapopan Unidad Norte.

Servicios de Salud de Zapopan Unidad Sur.

Servicios de Salud de Zapopan Unidad Villas de Guadalupe.

Servicios de Salud de Zapopan, Unidad Federalismo.

Colotlán.

Hospital de Primer Contacto de Colotlán

Hospital de Primer Contacto de Huejuquilla

Lagos de Moreno.

Cruz Roja Delegación Lagos de Moreno.

Clínica No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social

San Juan de los Lagos.

Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan de los Lagos.

Hospital Comunitario de San Juan de los Lagos

Tepatitlán de Morelos.

Hospital Sagrado Corazón de Arandas

Tamazula de Gordiano.

Hospital Comunitario de Tamazula

Unidad IMSS No 15

Zapotlán el Grande.

Cruz Roja Mexicana

Hospital Regional Zapotlán el Grande.

Hospital Regional de Zona No. 9 del IMSS

Autlán de Navarro.

Hospital de Primer Contacto la Huerta.

Hospital de Primer Contacto de Casimiro Castillo.

Puerto Vallarta.

Hospital de Primer Contacto Mascota

Cruz Roja Mexicana Vallarta

Hospital Regional de la Secretaria de Salud

Servicios Médicos Municipales

Ameca.

Hospital Regional de Ameca

Cruz Roja de Ameca

Indicador “Consejo de Menores”

Centro de Observación y Clasificación de Menores Infractores del Estado de Jalisco.

Indicador “Forense”

Servicio Médico Forense.

El proceso de la información se captura y analiza utilizando el Programa del SISVEA, el cual nos permite la impresión de tablas y con el programa de Excel el cual nos permite hacer el cruce de una o más variables.

Indicador: Mortalidad en individuos usuarios de drogas.

La información se obtuvo de los registros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de la ciudad de Guadalajara.

La muestra para el proceso del tamiz toxicológico se obtuvo por el médico forense y fue procesado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Se capturaron todos los cadáveres que al momento de fallecer tuvieran como edad mínima 5 años de edad, independientemente de la causa de muerte y que presentaron algún nivel de sustancias adictivas en fluidos corporales. Se buscan niveles de alcohol, cocaína, anfetaminas, cannabinoides, opio y derivados, solventes volátiles y tranquilizantes.

La información se recabó por personal del Secretariado Técnico del CECAJ, en forma semanal.

Indicador: Consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilícitas en grupos de riesgo.

Se define como grupo de riesgo a los menores infractores.

Se recabó la información de los menores que ingresaron al Centro de Observación de Menores Infractores, este indicador nos permite conocer cuántas y el tipo de infracciones que fueron relacionadas con el uso y abuso de sustancias adictivas, así como el perfil socio demográfico y psicológico.

Durante el año 2017 se ve restringida la información por la Ley de Protección a los menores de edad por lo que en el 2017 no contamos con información suficiente para realizar análisis del indicador.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES EN JALISCO

RESULTADOS 2017

Indicador: Tratamiento y Rehabilitación

Durante el 2017 se registraron un total de 5,115 pacientes atendidos por establecimientos especializados en adicciones que se encuentran en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 028-SSA2-2009, quienes son asesorados y guiados para dicho cumplimiento.

Los datos referidos en este documento representan a pacientes con problemas en el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que acuden a recibir tratamiento y se hará la descripción a través de cuadros. La información obtenida fue mediante cédulas específicas por cada uno de los indicadores, por lo que se describirá el número de los casos atendidos y sus proporciones porcentuales. A continuación, la siguiente información:

- **PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO**

Información sobre el Estado y municipio de residencia, la edad, sexo, embarazo, actividad principal que desempeña, estado civil, escolaridad en su grado máximo de estudios y centro de tratamiento en el cual se ingresa.

- **EN ANTECEDENTES DE BÚSQUEDA DE APOYO**

Se pregunta el número de tratamientos que ha recibido durante los últimos 12 meses y durante toda su vida, así como la forma en que acude al Centro, si es de manera voluntaria, por indicación médica no psiquiátrica, por indicación psiquiátrica, por amigos o familiares, por indicación legal, por indicación de la escuela o trabajo y otros motivos.

- **PATRÓN DE CONSUMO**

Se busca saber la droga de inicio y droga de impacto, así como el historial del consumo de drogas durante toda su vida, el consumo durante el último año, edad en que la usó por primera vez, formas y vías de administración de la droga y por último, forma de consumo actual.

- **LA DROGA DE IMPACTO**

Es la sustancia que el paciente acude a solicitar o a recibir tratamiento, buscando además edad de inicio, vía de administración, entidad y municipio de consumo.

- **CONDUCTAS DE RIESGO**

Sobre el consumo de drogas por vía parenteral, el riesgo de compartir jeringas para el uso de éstas, así como el uso de jeringa nueva durante último consumo, la combinación de sustancias adictivas, conducción bajo el influjo de alcohol o drogas y padecimientos médicos relacionados con el uso de drogas.

- **DISPONIBILIDAD DE SUSTANCIAS O DROGAS**

Preguntamos los lugares que con mayor frecuencia consigue las sustancias adictivas como en su propia casa, se la llevan a su casa, en casa de algún amigo o familiar, en la calle, en antros y bares, en fiestas y reuniones, en la escuela, en el trabajo, en tiendas cercanas a su domicilio, en parques, picaderos y otros sitios.

- **LUGARES DONDE ACOSTUMBRA A CONSUMIR LA DROGA DE IMPACTO**

Como en su propia casa, en casa de algún amigo o familiar, en la vía pública (calles, parques, etc.), antros/bares, fiestas o reuniones, la escuela, el trabajo, picaderos y en pocos casos, el que no sabe o no responde.

- **EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA A LA DROGA DE IMPACTO**

En la cual se evalúan durante los últimos 12 meses de consumo los siguientes criterios diagnósticos: tolerancia, compulsión, control de consumo, abstinencia, reducción progresiva y uso persistente. A continuación, se describe cada uno de ellos:

Tolerancia

- Uso de mayor cantidad de droga para lograr el efecto deseado.
- Menor efecto con la misma dosis que antes.
- Si se dio cuenta que necesita mayor cantidad de droga para sentir el mismo efecto.

Consumo compulsivo

- Deseo fuerte de consumir la drogas y no puede evitar hacerlo.
- Deseo fuerte de consumo que no puede pensar en otra cosa.

Dificultad para controlar el consumo

- Quiere o ha intentado dejar de consumir o disminuir la cantidad y si ha logrado hacerlo por lo menos durante un mes.
- Periodos en que usó la droga en mayor cantidad y tiempo de lo que se proponía y se le hizo difícil suspender el consumo antes de estar intoxicado.

Abstinencia

- Horas o días siguientes de suspender o reducir el consumo se presentaron síntomas abstinencia.
- Uso de otras sustancias para reducir o curar los síntomas de abstinencia.

Reducción Progresiva

- Ha habido ocasiones que dedica mucho tiempo en conseguir la droga.

- Ha pasado mucho tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos de la droga.
- Reducción de actividades importantes sea sociales, familiares o compromisos por el uso de drogas.

Uso Persistente

- Ha tenido problemas de salud como sobredosis accidental, tos persistente, convulsiones, infecciones como hepatitis, SIDA, problemas cardiacos relacionados con el consumo de drogas.
- Continúa el uso a pesar de presentar estos problemas de salud.
- Ha tenido problemas psicológicos o sociales asociados al consumo de drogas como depresión, paranoia, fracasos laborales o escolares, conflictos familiares, actos de violencia y accidentes.
- Continúa consumiendo a pesar de los problemas antes descritos.

Los resultados se presentan en Tablas, con números y porcentajes de la información general, por Región Sanitaria y por género.

El personal del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea) y de los Centros de Atención Primaria de Adicciones (Capa) del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (Cecaj), coordinan la productividad y control de calidad del llenado de las cédulas.

Cabe señalar que en las regiones de Colotlán y Puerto Vallarta no cuentan con establecimientos que cumplan con los criterios de la **NOM 028-SSA2-2009 para la Prevención y Control de las Adicciones**.

**SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE LAS ADICCIONES EN JALISCO
RESULTADOS 2017
GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

RESULTADOS GENERALES

Cuadro No. 1 NÚMERO DE PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN EL ESTADO DE JALISCO SEGÚN REGIÓN SANITARIA Y GÉNERO			
Región Sanitaria	General	Masculino	Femenino
I Colotlán	0	0	0
II Lagos de Moreno	75	56	19
III Tepatitlán	290	254	36
IV La Barca	861	816	45
V Tamazula	11	11	0
VI Zapotlán el Grande	176	138	38
VII Autlán de Navarro	116	96	20
VIII Puerto Vallarta	0	0	0
IX Ameca	100	84	16
X Zapopan	1209	971	238
XI Tonalá	406	350	56
XII Tlaquepaque	901	873	28
XIII Guadalajara	970	840	130
Total	5,115	4,489	626

Cuadro No. 2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE PREFIEREN EL ANONIMATO SEGÚN REGIÓN SANITARIA

Anónimo	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
Número	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Si	17,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	1,7%	0,9%		1,0%	15,0%	4,2%	52,9%	19,1%
No	83,0%		100,0%	100,0%	99,7%	100,0%	98,3%	99,1%		99,0%	85,0%	95,8%	47,1%	80,9%

Cuadro No. 3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN REGIÓN SANITARIA Y GÉNERO

Sexo	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
Número	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Masculino	87.8%		74,7%	87,6%	94,8%	100,0%	78,4%	82,8%		84,0%	80,3%	86,2%	96,9%	86,6%
Femenino	12.2%		25,3%	12,4%	5,2%	0,0%	21,6%	17,2%		16,0%	19,7%	13,8%	3,1%	13,4%

Cuadro No. 4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN REGIÓN SANITARIA Y GRUPO DE EDAD

Edad Actual	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
5 a 9	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
10 a 14	2,9%		2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	3,6%	8,9%	2,1%	4,9%
15 a 19	18,9%		38,7%	7,2%	14,6%	27,3%	9,7%	16,4%		12,0%	21,3%	28,8%	20,6%	18,7%
20 a 24	21,9%		12,0%	25,2%	27,2%	18,2%	25,6%	19,8%		23,0%	19,5%	21,4%	21,5%	19,9%
25 a 29	14,8%		6,7%	16,2%	15,4%	0,0%	19,9%	18,1%		15,0%	15,3%	13,3%	14,7%	13,4%
30 a 34	11,6%		14,7%	12,8%	12,4%	0,0%	14,2%	14,7%		15,0%	10,9%	8,1%	11,9%	11,0%
35 a 39	9,6%		8,0%	9,7%	11,0%	0,0%	9,7%	14,7%		13,0%	9,9%	8,6%	9,1%	8,1%
40 a 44	7,2%		9,3%	10,7%	7,3%	9,1%	10,2%	5,2%		6,0%	6,5%	5,2%	7,9%	6,5%
45 a 49	5,8%		0,0%	9,7%	6,4%	18,2%	4,5%	6,9%		7,0%	5,3%	3,0%	5,4%	6,6%
50 a 54	3,3%		2,7%	3,8%	3,4%	9,1%	2,8%	1,7%		3,0%	3,6%	2,2%	2,6%	4,2%
55 a 59	2,3%		2,7%	3,4%	1,5%	9,1%	2,3%	0,9%		4,0%	2,0%	0,0%	2,8%	3,7%
60 a 64	0,9%		1,3%	1,4%	0,2%	9,1%	0,6%	0,0%		2,0%	1,3%	0,2%	0,7%	1,1%
65 a >	0,8%		1,3%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	1,7%		0,0%	0,7%	0,2%	0,8%	1,6%

Cuadro No. 5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA

Estado de Residencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
Número	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Aguascalientes	0,3%		0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Baja California Norte	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Campeche	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Coahuila	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Colima	0,6%		0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	9,7%	0,0%		0,0%	0,3%	0,5%	0,2%	0,3%
Ciudad de México	0,2%		0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,8%	0,0%
Durango	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
Guanajuato	0,7%		0,0%	0,7%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%		2,0%	1,3%	0,0%	0,2%	0,1%
Guerrero	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hidalgo	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%
Jalisco	93,8%		100,0%	97,6%	87,3%	100,0%	88,1%	98,3%		97,0%	93,3%	96,1%	95,9%	96,0%
Estado de México	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,7%	0,2%	0,6%	0,2%
Michoacán	1,8%		0,0%	0,7%	6,5%	0,0%	1,7%	0,0%		0,0%	0,6%	0,5%	1,8%	0,8%
Nayarit	0,4%		0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,6%	0,0%		1,0%	0,7%	1,0%	0,1%	0,3%
Nuevo León	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Oaxaca	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Puebla	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%
Querétaro	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Quintana Roo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
San Luis Potosí	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sinaloa	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%
Sonora	0,3%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,7%	0,0%	0,9%
Tabasco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlaxcala	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veracruz	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	0,0%
Zacatecas	0,3%		0,0%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,5%	0,2%	0,3%

Cuadro No. 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA

Municipio de residencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Acatic	0,4%		0,0%	3,4%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,1%	0,2%
Acatlán de Juárez	0,2%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,7%	0,1%
Ahualulco del Mercado	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		14,0%	0,1%	0,5%	0,0%	0,0%
Amacueca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%
Amatitán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ameca	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%		9,0%	0,2%	0,0%	0,4%	0,7%
Arandas	0,6%		0,0%	6,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,5%	0,0%	0,1%
Arenal	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,9%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,3%
Atemajac de Brizuela	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atengo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Atotonilco el Alto	0,4%		0,0%	1,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
Atoyac	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Autlán de Navarro	2,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,2%	75,9%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%
Ayotlán	0,2%		0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Ayutla	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,9%		0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%
La Barca	0,6%		0,0%	0,7%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
Bolaños	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Cabo Corrientes	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Casimiro Castillo	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,9%		0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%
Cihuatlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	1,7%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán El Grande	0,9%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	23,9%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Cocula	0,3%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	1,7%		5,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%
Colotlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%
Cuautitlán de García Barragán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuautla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Cuquío	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Chapala	1,7%		0,0%	0,3%	9,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,4%	0,0%
Degollado	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ejutla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Etzatlán	0,4%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		14,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%

Cuadro No. 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA

Municipio de residencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
El Grullo	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%	11,2%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%
Guachinango	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Guadalajara	21,7%		0,0%	6,9%	4,8%	0,0%	2,3%	0,9%		4,0%	11,7%	11,3%	24,1%	65,4%
Huejuquilla el Alto	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
La Huerta	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ixtlahuacán de los Membrillos	0,7%		0,0%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,0%	0,2%	0,7%	0,3%
Ixtlahuacán del Río	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Jalostotitlán	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jamay	0,3%		0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jesús María	0,1%		0,0%	1,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jilotlán de los Dolores	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jocotepec	0,9%		0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,6%	0,5%	0,1%	0,2%
Juanacatlán	0,1%		0,0%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%
Juchitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lagos de Moreno	0,4%		1,3%	3,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%
El Limón	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Magdalena	0,1%		0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mascota	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Mazamitla	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ocotlán	4,3%		0,0%	0,3%	24,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%
Pihuamo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Poncitlán	1,6%		0,0%	0,7%	8,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,3%	0,1%
Puerto Vallarta	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,2%	0,2%	0,0%
Quitupan	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
El Salto	1,2%		0,0%	0,7%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,7%	4,4%	0,9%
San Juan de los Lagos	1,8%		98,7%	5,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
San Julián	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Marcos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Hidalgo	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		4,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA

Municipio de residencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
San Miguel el Alto	0,2%		0,0%	2,4%	0,2%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gómez Farías	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Sayula	0,4%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	6,8%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%
Tala	0,8%		0,0%	1,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		9,0%	1,4%	0,0%	0,4%	0,4%
Talpa de Allende	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Tamazula de Gordiano	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Tapalpa	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Tecalitlán	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tecolotlán	0,1%		0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Techaluta de Montenegro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Tenamaxtlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocuitatlán de Corona	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Tepatitlán de Morelos	2,7%		0,0%	42,1%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,7%	0,1%	0,0%
Tequila	0,5%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		10,0%	0,7%	0,0%	0,1%	0,5%
Teuchitlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tizapán el Alto	0,1%		0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlajomulco de Zúñiga	3,4%		0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,6%	0,0%		2,0%	2,8%	1,7%	9,9%	3,5%
Tlaquepaque	8,5%		0,0%	1,7%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	4,6%	3,4%	33,6%	5,2%
Tomatlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Tonalá	5,5%		0,0%	7,2%	2,8%	100,0%	0,0%	0,0%		0,0%	3,1%	21,7%	6,3%	4,5%
Tonaya	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tototlán	0,4%		0,0%	0,3%	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxcacuesco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxcueca	0,1%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxpan	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Unión de San Antonio	0,0%		0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Unión de Tula	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Guadalupe	0,1%		0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA

Municipio de residencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Villa Corona	0,1%		0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Yahualica de González Gallo	0,1%		0,0%	1,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacoalco de Torres	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%		0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,6%
Zapopan	24,0%		0,0%	1,0%	9,1%	0,0%	2,8%	0,0%		15,0%	63,4%	46,8%	9,7%	8,9%
Zapotiltic	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,5%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,3%
Zapotitlán de Vadillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán del Rey	0,2%		0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Zapotlanejo	0,9%		0,0%	3,4%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,0%	4,7%	0,4%	0,2%
San Ignacio Cerro Gordo	0,1%		0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Municipios de Otros Estados	6,2%		0,0%	2,4%	12,7%	0,0%	11,9%	1,7%		3,0%	6,7%	3,9%	4,1%	4,0%

Cuadro No. 7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL Y REGIÓN SANITARIA

Ocupación Principal	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Estudiante de tiempo completo	9,3%		13,3%	2,8%	2,7%	0,0%	5,1%	11,2%		6,0%	12,7%	25,4%	4,9%	11,2%
Estudiante con actividad laboral	3,8%		17,3%	1,7%	1,6%	0,0%	4,5%	5,2%		2,0%	4,5%	4,2%	4,3%	3,7%
Tiene empleo estable > 6 meses	40,4%		30,7%	50,3%	47,7%	36,4%	55,7%	41,4%		40,0%	40,8%	26,8%	40,2%	34,1%
Tiene menos de 6 meses	16,2%		12,0%	15,2%	21,0%	36,4%	4,5%	13,8%		30,0%	12,7%	12,6%	21,2%	14,6%
Desempleado (busca empleo)	12,5%		5,3%	17,2%	13,4%	18,2%	9,1%	9,5%		5,0%	10,8%	6,9%	14,5%	14,9%
Desocupado (no busca empleo)	12,0%		8,0%	4,5%	5,3%	9,1%	14,2%	12,1%		10,0%	13,8%	21,9%	10,0%	15,7%
Hogar	2,9%		8,0%	3,8%	1,3%	0,0%	6,3%	4,3%		2,0%	4,1%	1,7%	1,4%	3,2%
Pensionado	0,7%		0,0%	1,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,9%		5,0%	0,6%	0,2%	0,7%	0,9%
No aplica	0,2%		0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,4%	0,4%
Otra	1,9%		5,3%	2,4%	6,2%	0,0%	0,6%	0,9%		0,0%	0,0%	0,2%	2,2%	0,9%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,2%		0,0%	0,7%	0,5%	0,0%	0,0%	0,9%		0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%

**Cuadro No. 8 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS Y
REGIÓN SANITARIA**

Grado Máximo de Estudios	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Primaria	24,9%		34,7%	37,6%	26,5%	36,4%	14,2%	19,8%		16,0%	20,8%	16,5%	30,6%	25,8%
Secundaria	45,5%		41,3%	36,9%	54,8%	63,6%	38,6%	37,9%		48,0%	41,7%	52,5%	45,4%	43,7%
Escolaridad Técnica	3,4%		1,3%	3,4%	3,6%	0,0%	1,7%	2,6%		3,0%	2,9%	2,0%	5,5%	3,1%
Bachillerato	17,8%		21,3%	13,4%	10,6%	0,0%	33,5%	26,7%		20,0%	23,2%	21,4%	11,0%	19,5%
Licenciatura	5,4%		0,0%	4,5%	2,8%	0,0%	10,8%	7,8%		9,0%	9,4%	5,2%	2,8%	4,4%
Maestría Doctorado Especialidad	0,6%		0,0%	1,0%	0,5%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,9%	0,5%	0,3%	0,7%
No sabe leer ni escribir	1,2%		0,0%	2,8%	0,5%	0,0%	0,6%	1,7%		3,0%	0,4%	0,7%	2,6%	1,4%
Sabe leer y escribir	0,8%		1,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%		0,0%	0,7%	1,2%	1,3%	1,0%
No aplica	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,2%		0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,9%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%

Cuadro No. 9 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ESTADO CIVIL Y REGIÓN SANITARIA														
Estado Civil	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Soltero	58,1%		58,7%	44,5%	55,9%	63,6%	49,4%	58,6%		52,0%	61,5%	72,2%	55,9%	58,4%
Casado	17,5%		26,7%	31,4%	21,1%	27,3%	19,9%	18,1%		24,0%	15,6%	10,6%	15,2%	15,8%
Unión Libre	14,7%		12,0%	9,7%	15,3%	9,1%	19,9%	11,2%		13,0%	12,8%	12,6%	18,0%	15,8%
Separado	5,8%		1,3%	11,4%	2,8%	0,0%	3,4%	6,9%		2,0%	6,2%	3,9%	7,4%	6,7%
Divorciado	2,5%		1,3%	2,4%	2,3%	0,0%	5,1%	1,7%		8,0%	3,1%	0,7%	1,9%	2,4%
Viudo	0,5%		0,0%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,9%		1,0%	0,8%	0,0%	0,4%	0,9%
No aplica	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,7%		0,0%	0,3%	2,3%	0,0%	2,3%	2,6%		0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,1%

Cuadro No. 10 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ANTECEDENTE DE TRATAMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO Y REGIÓN SANITARIA														
Búsqueda de Apoyo	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Primera vez en el año	61,2%		57,3%	46,6%	71,1%	63,6%	58,0%	59,5%		62,0%	61,9%	74,6%	56,4%	56,0%
Ya había acudido en este año	38,8%		42,7%	53,4%	28,9%	36,4%	42,0%	40,5%		38,0%	38,1%	25,4%	43,6%	44,0%

Cuadro No. 11 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE HA RECIBIDO TRATAMIENTO Y REGIÓN SANITARIA

Número de veces	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Primera Vez	61,2%		57,3%	46,6%	71,1%	63,6%	58,0%	59,5%		62,0%	61,9%	74,6%	56,4%	56,0%
2 a 4	31,5%		37,3%	46,9%	21,7%	18,2%	36,9%	33,6%		35,0%	31,1%	20,7%	35,2%	35,5%
5 a >	7,2%		5,3%	6,6%	7,2%	18,2%	5,1%	6,9%		3,0%	7,0%	4,7%	8,4%	8,6%

Cuadro No. 12 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN FORMA EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO Y REGIÓN SANITARIA

Forma que acude al centro	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Voluntariamente	55,3%		50,7%	56,6%	32,5%	45,5%	55,1%	75,0%		29,0%	67,1%	81,0%	48,4%	57,0%
Indicación médica no psiquiátrica	3,0%		1,3%	0,7%	7,7%	0,0%	0,0%	1,7%		0,0%	1,6%	0,0%	0,4%	6,3%
Indicación médica psiquiátrica	1,4%		0,0%	0,3%	3,1%	0,0%	1,1%	0,9%		0,0%	1,2%	0,0%	0,6%	2,4%
Lo llevaron amigos o familiares	32,7%		6,7%	40,7%	47,5%	45,5%	35,2%	5,2%		71,0%	23,3%	11,3%	45,0%	27,1%
Indicación Legal	3,0%		6,7%	0,7%	6,9%	9,1%	6,8%	11,2%		0,0%	1,8%	1,5%	2,3%	1,3%
Escuela o trabajo	2,8%		10,7%	0,3%	0,6%	0,0%	0,6%	2,6%		0,0%	3,6%	5,9%	1,0%	4,9%
Otra (s)	1,3%		24,0%	0,0%	1,3%	0,0%	0,6%	0,9%		0,0%	1,3%	0,2%	2,0%	0,2%
No sabe	0,2%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
No responde	0,2%		0,0%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	2,6%		0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,2%

Cuadro No. 13 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN DROGA DE INICIO Y REGIÓN SANITARIA

Drogas de inicio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Alcohol	36,2%		46,7%	38,6%	36,5%	54,5%	31,8%	59,5%		50,0%	37,1%	41,1%	30,6%	32,6%
Marihuana	16,3%		12,0%	11,7%	18,7%	0,0%	16,5%	10,3%		15,0%	15,7%	14,5%	18,5%	16,2%
Inhalantes	3,3%		1,3%	1,4%	0,9%	0,0%	1,1%	4,3%		0,0%	4,7%	3,2%	5,4%	2,9%
Alucinógenos	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%
Heroína	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Opio/Morfina	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Cocaína	2,0%		0,0%	1,0%	1,4%	0,0%	5,1%	0,9%		12,0%	1,6%	3,0%	1,7%	2,1%
Tranquilizantes	0,6%		0,0%	1,7%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,7%	0,7%	0,3%	1,0%
Barbitúricos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Anfetaminas	0,3%		5,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,6%
Anticolinérgicos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Tabaco	33,4%		33,3%	40,7%	18,5%	18,2%	33,0%	22,4%		16,0%	36,4%	34,5%	39,0%	38,2%
Antidepresivos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros Psicotrópicos	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Pasta Base	0,3%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,9%
Metanfetamina Cristal	7,3%		0,0%	4,5%	23,2%	27,3%	12,5%	2,6%		3,0%	3,1%	2,0%	3,9%	4,8%
Flunitracepam	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Crack	0,2%		1,3%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,5%	0,2%	0,2%
Refractil ofteno	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 14 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO Y REGIÓN SANITARIA

Edad de Inicio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
5 a 9	6,7%		10,7%	6,6%	3,3%	0,0%	2,3%	9,5%		5,0%	5,4%	6,7%	8,3%	10,4%
10 a 14	47,1%		53,3%	47,2%	24,9%	36,4%	40,9%	55,2%		42,0%	52,8%	56,2%	51,7%	51,8%
15 a 19	35,5%		33,3%	38,3%	42,4%	54,5%	42,0%	29,3%		42,0%	35,3%	31,3%	34,5%	30,4%
20 a 24	6,7%		1,3%	5,2%	19,7%	0,0%	7,4%	4,3%		5,0%	3,8%	4,9%	3,4%	4,0%
25 a 29	1,9%		1,3%	0,7%	4,9%	0,0%	3,4%	1,7%		4,0%	1,3%	0,7%	1,1%	1,1%
30 a 34	1,0%		0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	1,1%	0,0%		1,0%	0,7%	0,0%	0,4%	0,9%
35 a 39	0,6%		0,0%	2,1%	0,9%	9,1%	1,1%	0,0%		1,0%	0,2%	0,2%	0,1%	0,6%
40 a 44	0,2%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	1,1%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,4%
45 a 49	0,2%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%
50 a 54	0,1%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
55 a 59	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60 a 64	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65 a >	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 15 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA

Drogas de impacto	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Alcohol	21,2%		24,0%	30,3%	20,8%	45,5%	16,5%	39,7%		30,0%	17,5%	28,6%	18,3%	20,1%
Marihuana	13,7%		12,0%	10,3%	6,2%	0,0%	6,3%	11,2%		8,0%	16,7%	21,4%	14,5%	16,1%
Inhalantes	2,7%		0,0%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	4,1%	1,2%	4,0%	4,7%
Alucinógenos	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		2,0%	0,5%	0,2%	0,2%	0,3%
Heroína	0,4%		0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	1,2%	0,2%	0,1%	0,2%
Opio/Morfina	0,2%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Cocaína	3,5%		2,7%	3,8%	2,3%	0,0%	2,3%	0,0%		5,0%	5,5%	3,4%	2,9%	3,2%
Tranquilizantes	1,1%		0,0%	1,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	1,4%	0,5%	1,9%	1,3%
Barbitúricos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Anfetaminas	0,6%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	2,6%	0,0%	0,1%	0,0%
Anticolinérgicos	0,0%		1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tabaco	3,0%		16,0%	1,4%	0,1%	0,0%	1,7%	2,6%		0,0%	3,2%	3,7%	2,7%	5,5%
Antidepresivos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros Psicotrópicos	0,1%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Pasta Base	0,9%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	1,1%	0,2%	0,9%	2,3%
Metanfetamina Cristal	50,7%		42,7%	51,7%	68,9%	45,5%	72,2%	46,6%		52,0%	43,5%	38,2%	52,7%	43,5%
Flunitracepam	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Crack	1,6%		1,3%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	2,2%	2,2%	1,6%	2,6%
Refractil ofteno	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 16 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ESTADO DONDE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA

Estado de consumo	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Aguascalientes	0,3%		0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Baja California	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,4%
Baja California Sur	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Campeche	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%
Coahuila	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Colima	0,6%		0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	9,7%	0,0%		0,0%	0,3%	0,5%	0,2%	0,3%
Chiapas	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chihuahua	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ciudad de México	0,2%		0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,8%	0,0%
Durango	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Guanajuato	0,8%		0,0%	0,7%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%		2,0%	1,3%	0,0%	0,2%	0,3%
Guerrero	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Hidalgo	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%
Jalisco	93,9%		100,0%	98,3%	87,3%	100,0%	86,9%	100,0%		97,0%	93,9%	96,8%	96,1%	94,6%
Estado de México	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,2%	0,6%	0,2%
Michoacán	1,7%		0,0%	0,0%	6,4%	0,0%	2,3%	0,0%		0,0%	0,3%	0,5%	1,7%	0,8%
Morelos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nayarit	0,4%		0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,6%	0,0%		1,0%	0,7%	0,7%	0,0%	0,3%
Nuevo León	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Oaxaca	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Puebla	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Querétaro	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Quintana Roo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
San Luis Potosí	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sinaloa	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,4%
Sonora	0,3%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,7%	0,0%	1,2%
Tabasco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Tamaulipas	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlaxcala	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veracruz	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacatecas	0,3%		0,0%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%

Cuadro No. 17 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Acatic	0,4%		0,0%	3,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,3%
Acatlán de Juárez	0,2%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,7%	0,1%
Ahualulco del Mercado	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		14,0%	0,0%	0,5%	0,1%	0,0%
Amacueca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%
Amatitán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Ameca	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%		9,0%	0,2%	0,0%	0,4%	0,7%
San Juanito de Escobedo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arandas	0,6%		0,0%	6,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,5%	0,0%	0,1%
El Arenal	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,9%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,3%
Atemajac de Brizuela	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atengo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Atenguillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atotonilco el Alto	0,4%		0,0%	1,4%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Atoyac	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Autlán de Navarro	2,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,7%	76,7%		0,0%	0,3%	0,2%	0,0%	0,2%
Ayotlán	0,2%		0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
Ayutla	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,9%		0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%
La Barca	0,6%		0,0%	0,7%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Bolaños	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Cabo Corrientes	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Casimiro Castillo	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,9%		0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%
Cihuatlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	1,7%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán El Grande	0,9%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	22,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Cocula	0,3%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	1,7%		5,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Colotlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%
Concepción de Buenos Aires	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuatitlán de García Barragán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 17 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Cuautla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuquío	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Chapala	1,8%		0,0%	0,3%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%
Chimaltitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chiquilistlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Degollado	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ejutla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Encarnación de Díaz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Etzatlán	0,4%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		13,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%
El Grullo	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%	11,2%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Guachinango	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guadalajara	21,5%		0,0%	5,5%	4,9%	0,0%	1,7%	1,7%		4,0%	11,2%	11,8%	22,9%	66,1%
Hostotipaquillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejúcar	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejuquilla el Alto	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huerta	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ixtlahuacán de los Membrillos	0,7%		0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,0%	0,2%	0,7%	0,3%
Ixtlahuacán del Río	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Jalostotitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jamay	0,3%		0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jesús María	0,1%		0,0%	1,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jilotlán de los Dolores	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jocotepec	0,9%		0,0%	0,0%	3,9%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,6%	0,5%	0,1%	0,2%
Juanacatlán	0,1%		0,0%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%
Juchitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lagos de Moreno	0,3%		1,3%	3,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%
El Limón	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Magdalena	0,1%		0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Santa María del Oro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 17 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Manzanilla de la Paz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mascota	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Mazamitla	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mexxicacán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mezquitic	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mixtlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ocotlán	4,3%		0,0%	0,3%	24,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%
Ojuelos de Jalisco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pihuamo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Poncitlán	1,6%		0,0%	0,7%	8,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%
Puerto Vallarta	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,2%	0,3%	0,0%
Villa Purificación	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Quitupan	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
El Salto	1,2%		0,0%	0,7%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	1,0%	4,4%	0,6%
San Cristóbal de la Barranca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Diego de Alejandría	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Juan de los Lagos	1,8%		97,3%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
San Julián	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Marcos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Bolaños	0,0%		1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Hidalgo	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		4,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Miguel el Alto	0,2%		0,0%	2,4%	0,2%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gómez Farías	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
San Sebastián del Oeste	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Santa María de los Ángeles	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sayula	0,3%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	6,3%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%

Cuadro No. 17 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Tala	0,8%		0,0%	1,0%	0,2%	0,0%	0,6%	0,0%		10,0%	1,3%	0,0%	0,4%	0,4%
Talpa de Allende	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tamazula de Gordiano	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tapalpa	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%
Tecalitlán	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tecolotlán	0,1%		0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Techaluta de Montenegro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Tenamaxtlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocaltiche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocuitatlán de Corona	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Tepatitlán de Morelos	2,9%		0,0%	45,5%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,7%	0,1%	0,0%
Tequila	0,5%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		10,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,4%
Teuchitlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tizapán el Alto	0,1%		0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlajomulco de Zúñiga	3,3%		0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,6%	0,0%		2,0%	2,6%	2,0%	9,5%	3,3%
Tlaquepaque	8,4%		0,0%	2,4%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	4,1%	3,2%	34,9%	4,3%
Tolimán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Tomatlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tonalá	5,4%		0,0%	7,2%	2,8%	90,9%	0,0%	0,0%		0,0%	2,5%	21,9%	6,3%	4,5%
Tonaya	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tonila	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Totatiche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tototlán	0,4%		0,0%	0,3%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Tuxcacuesco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxcueca	0,1%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxpan	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%

Cuadro No. 17 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Unión de San Antonio	0,0%		0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Unión de Tula	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Guadalupe	0,1%		0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Juárez	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Gabriel	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Corona	0,1%		0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Villa Guerrero	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Hidalgo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cañadas de Obregón	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Yahualica de González Gallo	0,1%		0,0%	1,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacoalco de Torres	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,4%
Zapopan	24,8%		0,0%	1,0%	9,1%	0,0%	2,8%	0,0%		15,0%	66,1%	46,8%	10,0%	8,9%
Zapotiltic	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%
Zapotitlán de Vadillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán del Rey	0,2%		0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Zapotlanejo	1,0%		0,0%	3,1%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	0,0%	4,9%	0,4%	0,3%
San Ignacio Cerro Gordo	0,1%		0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Municipios de Otros Estados	6,2%		0,0%	1,7%	12,7%	0,0%	13,1%	0,0%		3,0%	6,1%	3,2%	4,0%	5,4%

**Cuadro No. 18 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN USO DE DROGAS INYECTADAS
GENERAL Y REGIÓN SANITARIA**

Uso de drogas inyectadas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Si	4,4%		5,3%	6,6%	1,7%	0,0%	2,8%	3,4%		4,0%	3,6%	3,7%	6,8%	5,5%
No	95,6%		94,7%	93,4%	98,3%	100,0%	97,2%	96,6%		96,0%	96,4%	96,3%	93,2%	94,5%

**Cuadro No. 19 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS INYECTADAS QUE COMPARTEN JERINGAS
Y POR REGIÓN SANITARIA**

Ha compartido jeringas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	224	0	4	19	15	0	5	4	0	4	44	15	61	53
Si	74,6%		75,0%	78,9%	80,0%		60,0%	50,0%		75,0%	86,4%	73,3%	77,0%	62,3%
No	25,0%		25,0%	21,1%	13,3%		40,0%	25,0%		25,0%	15,9%	26,7%	23,0%	37,7%
No sabe	1,3%		0,0%	0,0%	6,7%		0,0%	25,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%

**Cuadro No. 20 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS INYECTADAS CON JERINGA SIN USO
PREVIO Y REGIÓN SANITARIA**

Uso de jeringa nueva en la última dosis	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	224	0	4	19	15	0	5	4	0	4	44	15	61	53
Si	29,9%		50,0%	26,3%	60,0%		20,0%	25,0%		0,0%	31,8%	46,7%	23,0%	26,4%
No	69,6%		50,0%	68,4%	40,0%		80,0%	75,0%		100,0%	70,5%	53,3%	73,8%	75,5%
No sabe	0,9%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%
No responde	0,4%		0,0%	5,3%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 21 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS QUE CONSUMEN DROGAS COMBINADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Combina Drogas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Si	51,0%		60,0%	65,5%	34,7%	9,1%	54,5%	46,6%		42,0%	51,9%	39,7%	60,4%	56,9%
No	49,0%		40,0%	34,5%	65,3%	90,9%	45,5%	53,4%		58,0%	48,1%	60,3%	39,6%	43,1%

Cuadro No. 22 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE REPORTAN HABER CONDUCIDO UN VEHÍCULO DE MOTOR BAJO EFECTO DE DROGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Conducción bajo efecto de drogas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Si	41,0%		49,3%	69,3%	55,9%	18,2%	58,0%	54,3%		45,0%	32,8%	19,5%	37,0%	37,1%
No	48,8%		48,0%	14,8%	36,6%	36,4%	26,1%	37,9%		38,0%	60,5%	65,0%	46,6%	57,2%
No sabe	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%
No responde	10,1%		2,7%	15,9%	7,5%	45,5%	15,9%	7,8%		17,0%	6,6%	15,5%	16,3%	5,5%

Cuadro No. 23 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE PADECEN ALGUNA ENFERMEDAD ASOCIADA AL CONSUMO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Padece alguna enfermedad	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Si	4,9%		1,3%	10,7%	2,7%	0,0%	8,5%	8,6%		3,0%	6,9%	3,9%	2,0%	5,1%
No	95,1%		98,7%	89,3%	97,3%	100,0%	91,5%	91,4%		97,0%	93,1%	96,1%	98,0%	94,9%

Cuadro No. 24 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS, LUGAR DONDE CONSIGUE LA DROGA DE MAYOR IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Lugar donde la consigue la droga de impacto	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
En su propia casa	11,4%		9,3%	11,4%	8,1%	18,2%	15,9%	12,9%		13,0%	10,8%	30,3%	7,4%	10,0%
Se la llevan a su casa	8,0%		1,3%	10,7%	7,8%	18,2%	9,1%	11,2%		15,0%	7,4%	8,9%	8,9%	5,9%
En casa de un amigo o familiar	8,6%		10,7%	7,9%	10,8%	9,1%	4,5%	8,6%		9,0%	8,3%	7,9%	9,8%	6,9%
En la calle	40,3%		4,0%	18,6%	42,6%	54,5%	41,5%	14,7%		50,0%	41,5%	33,5%	47,3%	44,0%
En antros y bares	3,3%		0,0%	6,6%	3,6%	0,0%	0,6%	2,6%		3,0%	5,0%	3,2%	1,6%	2,5%
En fiestas y reuniones	2,3%		9,3%	1,7%	0,9%	0,0%	1,1%	10,3%		1,0%	3,6%	2,5%	0,8%	2,1%
En la escuela	0,4%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,3%	1,0%
En el trabajo	1,5%		2,7%	3,1%	0,2%	0,0%	0,6%	3,4%		1,0%	2,0%	0,7%	1,1%	2,3%
En tiendas cercanas a mi casa	16,0%		60,0%	33,8%	10,0%	0,0%	10,8%	19,0%		7,0%	16,5%	8,1%	18,9%	14,4%
Parques	0,9%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,6%	0,0%		1,0%	2,1%	2,2%	0,1%	0,7%
Picaderos	6,6%		0,0%	3,1%	15,7%	0,0%	14,2%	16,4%		0,0%	1,7%	2,2%	3,3%	9,5%
Otro	0,3%		2,7%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,4%
No sabe	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
No responde	0,4%		0,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,6%	0,9%		0,0%	0,7%	0,2%	0,1%	0,3%

Cuadro No. 25 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS, LUGAR DONDE CONSUME LA DROGA DE MAYOR IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Donde la consume	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
La tiene en su casa	34,1%		49,3%	60,7%	23,3%	63,6%	25,0%	39,7%		32,0%	34,6%	28,6%	35,0%	36,4%
En casa de un amigo o familiar	19,1%		22,7%	13,4%	23,5%	18,2%	14,2%	17,2%		20,0%	18,6%	30,3%	17,0%	15,4%
En la vía pública (calles, parques)	28,4%		13,3%	11,0%	30,8%	9,1%	6,8%	19,0%		42,0%	28,9%	17,2%	37,5%	32,2%
En antros y bares	4,0%		1,3%	3,8%	5,2%	9,1%	2,3%	2,6%		1,0%	4,2%	9,4%	1,8%	3,3%
En fiestas y reuniones	4,5%		9,3%	1,0%	5,0%	0,0%	4,5%	9,5%		2,0%	6,8%	7,6%	2,3%	2,3%
En la escuela	0,7%		0,0%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	1,0%	0,7%	0,6%	1,1%
En el trabajo	3,1%		4,0%	4,5%	2,9%	0,0%	7,4%	3,4%		2,0%	3,1%	2,0%	2,2%	3,6%
En picaderos	5,0%		0,0%	1,0%	8,6%	0,0%	39,2%	6,9%		0,0%	1,7%	3,0%	2,9%	4,7%
Otro	0,7%		0,0%	3,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,9%		1,0%	0,4%	1,0%	0,6%	0,8%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,4%		0,0%	0,7%	0,5%	0,0%	0,6%	0,9%		0,0%	0,7%	0,2%	0,2%	0,2%

Cuadro No. 26 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN DROGAS DE MAYOR CONSUMO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Droga	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepetitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	5,115	0	75	290	861	11	176	116	0	100	1,209	406	901	970
Alcohol	72,5%		92,0%	83,8%	55,4%	63,6%	63,1%	92,2%		74,0%	79,4%	81,0%	68,1%	74,1%
Marihuana	58,6%		69,3%	44,8%	44,1%	45,5%	45,5%	67,2%		42,0%	65,6%	66,5%	63,0%	62,0%
Inhalantes	18,1%		13,3%	7,9%	4,2%	9,1%	4,0%	4,3%		9,0%	21,9%	17,7%	30,5%	22,8%
Alucinógenos	3,9%		2,7%	2,8%	2,1%	0,0%	1,7%	3,4%		8,0%	4,6%	3,7%	4,3%	5,1%
Heroína	1,8%		0,0%	1,0%	1,5%	0,0%	1,7%	2,6%		2,0%	1,9%	4,4%	1,2%	1,5%
Opio/Morfina	0,7%		1,3%	0,0%	0,7%	0,0%	1,7%	0,0%		0,0%	1,5%	1,0%	0,2%	0,4%
Cocaína	32,9%		29,3%	29,7%	17,2%	18,2%	26,7%	40,5%		44,0%	40,5%	38,7%	35,7%	32,8%
Tranquilizantes	10,1%		26,7%	14,5%	2,1%	0,0%	5,7%	6,9%		3,0%	12,3%	3,9%	14,2%	12,6%
Barbitúricos	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	2,2%	0,0%	0,0%
Anfetaminas	2,5%		57,3%	1,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		8,0%	3,1%	1,0%	0,4%	2,7%
Anticolinérgicos	0,1%		2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Tabaco	59,6%		80,0%	70,7%	24,0%	27,3%	49,4%	80,2%		43,0%	68,5%	64,3%	66,5%	68,1%
Antidepresivos	0,3%		0,0%	0,7%	0,1%	0,0%	1,7%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,7%
Otros Psicotrópicos	0,8%		0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,6%	1,0%	1,3%	1,8%
Pasta Base	4,7%		0,0%	0,0%	0,8%	18,2%	0,0%	0,0%		2,0%	5,4%	3,0%	6,7%	9,4%
Metanfetamina Cristal	62,5%		1,3%	65,9%	75,8%	54,5%	79,0%	68,1%		71,0%	58,3%	51,7%	66,7%	55,9%
Flunitracepam	0,8%		0,0%	0,7%	0,3%	9,1%	0,6%	0,0%		0,0%	0,7%	0,7%	1,9%	0,4%
Crack	6,6%		8,0%	3,1%	2,8%	0,0%	0,6%	0,9%		4,0%	8,5%	9,4%	7,3%	9,1%
Refractilofeno	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 27 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL ALCOHOL ES LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

ALCOHOL	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	1,082	0	18	88	179	5	29	46	0	30	211	116	165	195
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	79,7%		94,4%	85,2%	79,3%	100,0%	79,3%	73,9%		93,3%	84,8%	80,2%	81,2%	67,7%
Menor efecto que antes	58,3%		83,3%	83,0%	38,5%	40,0%	27,6%	76,1%		46,7%	66,8%	69,0%	69,7%	40,5%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	55,2%		88,9%	81,8%	34,6%	40,0%	24,1%	73,9%		50,0%	65,9%	52,6%	66,7%	40,5%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	68,4%		88,9%	80,7%	70,9%	60,0%	75,9%	60,9%		96,7%	72,5%	66,4%	61,8%	57,4%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	41,8%		83,3%	75,0%	29,6%		10,3%	56,5%		50,0%	43,1%	37,9%	48,5%	30,3%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	70,0%		88,9%	77,3%	70,9%	40,0%	86,2%	87,0%		96,7%	66,8%	62,9%	69,7%	62,1%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	50,5%		77,8%	86,4%	30,7%	60,0%	34,5%	71,7%		40,0%	51,2%	44,8%	58,8%	44,1%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	69,6%		77,8%	77,3%	75,4%	60,0%	48,3%	69,6%		96,7%	71,1%	60,3%	78,2%	55,9%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	47,2%		83,3%	77,3%	27,4%	20,0%	48,3%	71,7%		43,3%	46,0%	48,3%	53,9%	39,0%

Cuadro No. 27 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL ALCOHOL ES LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

ALCOHOL	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	1,082	0	18	88	179	5	29	46	0	30	211	116	165	195
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	53,1%		83,3%	35,2%	68,7%	80,0%	41,4%	30,4%		83,3%	55,9%	53,4%	46,1%	48,7%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	45,1%		72,2%	78,4%	26,8%	20,0%	62,1%	39,1%		40,0%	49,3%	42,2%	60,0%	29,2%
Descuido de actividades	51,5%		88,9%	94,3%	33,0%	60,0%	27,6%	45,7%		50,0%	56,9%	48,3%	65,5%	34,9%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	49,5%		72,2%	59,1%	55,9%	80,0%	27,6%	37,0%		70,0%	47,4%	52,6%	49,7%	40,0%
Continuó usando a pesar de esos problemas	43,7%		66,7%	54,5%	40,2%	60,0%	20,7%	37,0%		66,7%	39,3%	35,3%	57,6%	39,0%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	71,4%		88,9%	89,8%	70,9%	60,0%	55,2%	84,8%		73,3%	72,0%	66,4%	83,0%	53,8%
Continúa usando a pesar de esos problemas	63,6%		77,8%	87,5%	53,1%	60,0%	69,0%	82,6%		76,7%	61,1%	51,7%	77,0%	52,3%

Cuadro No. 29 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA MARIHUANA ES LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

MARIHUANA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	700	0	9	30	53	0	11	13	0	8	202	87	131	156
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	72,0%		100,0%	66,7%	96,2%		72,7%	53,8%		75,0%	62,4%	87,4%	73,3%	67,3%
Menor efecto que antes	55,0%		100,0%	63,3%	47,2%		54,5%	61,5%		37,5%	52,5%	77,0%	55,0%	44,9%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	49,1%		100,0%	76,7%	45,3%		45,5%	61,5%		12,5%	47,5%	60,9%	46,6%	41,0%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	59,3%		100,0%	56,7%	88,7%		72,7%	53,8%		50,0%	55,9%	59,8%	53,4%	56,4%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	40,3%		100,0%	70,0%	41,5%		45,5%	53,8%		37,5%	38,6%	48,3%	31,3%	34,6%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	63,3%		88,9%	70,0%	75,5%		63,6%	69,2%		87,5%	62,9%	47,1%	67,2%	60,9%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	50,9%		100,0%	90,0%	41,5%		27,3%	76,9%			51,5%	48,3%	45,8%	50,6%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	52,3%		100,0%	46,7%	79,2%		45,5%	38,5%		87,5%	44,6%	57,5%	51,1%	49,4%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	40,1%		100,0%	63,3%	35,8%		63,6%	38,5%		25,0%	33,2%	41,4%	43,5%	38,5%

Cuadro No. 29 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA MARIHUANA ES LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

MARIHUANA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	700	0	9	30	53	0	11	13	0	8	202	87	131	156
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	49,7%		100,0%	33,3%	79,2%		54,5%	23,1%		50,0%	46,0%	54,0%	42,7%	50,0%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	37,9%		100,0%	66,7%	35,8%		36,4%	23,1%		25,0%	35,6%	35,6%	38,9%	34,6%
Descuido de actividades	48,1%		88,9%	80,0%	30,2%		45,5%	46,2%		37,5%	48,0%	51,7%	46,6%	46,2%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	39,3%		88,9%	56,7%	60,4%		45,5%	15,4%		50,0%	36,6%	50,6%	31,3%	30,8%
Continuó usando a pesar de esos problemas	36,3%		88,9%	53,3%	35,8%			30,8%		12,5%	29,2%	44,8%	38,9%	36,5%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	63,9%		100,0%	83,3%	73,6%		63,6%	76,9%		37,5%	65,8%	62,1%	67,9%	50,0%
Continúa usando a pesar de esos problemas	54,3%		100,0%	80,0%	49,1%		54,5%	69,2%		37,5%	54,5%	49,4%	62,6%	43,6%

Cuadro No. 31 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LOS INHALANTES SON LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

INHALANTES	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	140	0	0	2	1	0	0	0	0	0	50	5	36	46
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	75,7%			50,0%	100,0%						92,0%	80,0%	75,0%	58,7%
Menor efecto que antes	57,9%			50,0%	100,0%						68,0%	60,0%	55,6%	47,8%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	59,3%			50,0%	100,0%						70,0%	60,0%	58,3%	47,8%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	64,3%			50,0%	100,0%						74,0%	80,0%	52,8%	60,9%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	42,1%			50,0%	100,0%						46,0%	40,0%	36,1%	41,3%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	60,7%			50,0%							72,0%	60,0%	72,2%	41,3%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	53,6%			50,0%	100,0%						64,0%	40,0%	61,1%	37,0%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	64,3%			50,0%	100,0%						62,0%	80,0%	63,9%	65,2%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	44,3%			50,0%	100,0%						48,0%	20,0%	52,8%	34,8%

Cuadro No. 31 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LOS INHALANTES SON LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

INHALANTES	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	140	0	0	2	1	0	0	0	0	0	50	5	36	46
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	56,4%			50,0%							64,0%	100,0%	50,0%	50,0%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	45,7%				100,0%						68,0%	20,0%	38,9%	30,4%
Descuido de actividades	56,4%			50,0%	100,0%						70,0%	40,0%	69,4%	32,6%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	42,9%				100,0%						52,0%	60,0%	44,4%	30,4%
Continuó usando a pesar de esos problemas	49,3%				100,0%						50,0%	40,0%	61,1%	41,3%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	74,3%			50,0%	100,0%						78,0%	80,0%	80,6%	65,2%
Continúa usando a pesar de esos problemas	70,7%			50,0%	100,0%						70,0%	80,0%	75,0%	67,4%

Cuadro No. 33 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA COCAÍNA ES LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

COCAÍNA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	179	0	2	11	20	0	4	0	0	5	66	14	26	31
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	80,4%		100,0%	90,9%	85,0%		100,0%			100,0%	80,3%	71,4%	65,4%	83,9%
Menor efecto que antes	58,7%		100,0%	72,7%	60,0%					40,0%	68,2%	64,3%	53,8%	41,9%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	60,9%		100,0%	90,9%	60,0%					40,0%	62,1%	64,3%	61,5%	54,8%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	64,8%		100,0%	72,7%	75,0%		100,0%			80,0%	68,2%	42,9%	46,2%	64,5%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	47,5%		100,0%	54,5%	45,0%					60,0%	54,5%	21,4%	50,0%	41,9%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	66,5%		100,0%	81,8%	65,0%		100,0%			80,0%	65,2%	57,1%	53,8%	71,0%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	48,6%		100,0%	54,5%	35,0%					60,0%	48,5%	35,7%	38,5%	71,0%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	62,0%		100,0%	63,6%	80,0%		50,0%			60,0%	60,6%	50,0%	50,0%	67,7%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	49,2%		100,0%	63,6%	40,0%		50,0%			40,0%	51,5%	21,4%	53,8%	51,6%

Cuadro No. 33 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA COCAÍNA ES LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

COCAÍNA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	179	0	2	11	20	0	4	0	0	5	66	14	26	31
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	46,9%		100,0%	45,5%	60,0%		50,0%			80,0%	33,3%	50,0%	50,0%	54,8%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	45,3%		100,0%	72,7%	35,0%		50,0%			40,0%	53,0%	7,1%	42,3%	41,9%
Descuido de actividades	50,3%		100,0%	90,9%	30,0%					40,0%	51,5%	35,7%	65,4%	45,2%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	39,7%		100,0%	45,5%	45,0%					60,0%	50,0%	28,6%	23,1%	29,0%
Continuó usando a pesar de esos problemas	36,9%		100,0%	36,4%	20,0%					40,0%	45,5%	28,6%	34,6%	35,5%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	69,3%		100,0%	90,9%	65,0%		50,0%			80,0%	75,8%	50,0%	57,7%	67,7%
Continúa usando a pesar de esos problemas	58,1%		100,0%	72,7%	45,0%		75,0%			60,0%	63,6%	50,0%	46,2%	58,1%

Cuadro No. 35 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL TABACO ES LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

TABACO	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	154	0	12	4	1	0	3	3	0	0	39	15	24	53
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	66,2%		100,0%	75,0%	100,0%		100,0%	100,0%			61,5%	86,7%	62,5%	52,8%
Menor efecto que antes	52,6%		100,0%	25,0%				100,0%			30,8%	93,3%	66,7%	43,4%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	50,0%		100,0%	75,0%				100,0%			28,2%	86,7%	54,2%	41,5%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	51,3%		91,7%	50,0%	100,0%		100,0%	100,0%			51,3%	40,0%	41,7%	43,4%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	40,3%		91,7%	25,0%				66,7%			25,6%	73,3%	50,0%	28,3%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	50,6%		83,3%	75,0%	100,0%		100,0%	100,0%			53,8%	40,0%	50,0%	35,8%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	36,4%		91,7%	50,0%				33,3%			30,8%	46,7%	33,3%	28,3%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	44,8%		91,7%	75,0%	100,0%		66,7%	100,0%			46,2%	26,7%	45,8%	30,2%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	35,7%		83,3%	25,0%			33,3%	33,3%			30,8%	46,7%	50,0%	20,8%

Cuadro No. 35 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL TABACO ES LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

TABACO	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	154	0	12	4	1	0	3	3	0	0	39	15	24	53
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	36,4%		83,3%	50,0%	100,0%		66,7%	100,0%			25,6%	53,3%	41,7%	18,9%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	26,0%		83,3%	75,0%			33,3%	33,3%			15,4%	33,3%	25,0%	15,1%
Descuido de actividades	36,4%		83,3%	100,0%				100,0%			20,5%	33,3%	45,8%	28,3%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	33,8%		83,3%	75,0%	100,0%			66,7%			28,2%	46,7%	25,0%	22,6%
Continuó usando a pesar de esos problemas	31,2%		83,3%	75,0%				33,3%			28,2%	40,0%	25,0%	20,8%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	42,9%		83,3%	75,0%	100,0%		66,7%	100,0%			41,0%	53,3%	45,8%	22,6%
Continúa usando a pesar de esos problemas	38,3%		83,3%	75,0%			100,0%	66,7%			35,9%	20,0%	54,2%	20,8%

Cuadro No. 37 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LAS METANFETAMINAS SON LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

METANFETAMINA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	2,591	0	32	150	593	5	127	54	0	52	526	155	475	422
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	79,1%		96,9%	82,7%	83,8%	100,0%	90,6%	90,7%		84,6%	80,6%	67,1%	75,6%	70,6%
Menor efecto que antes	52,2%		96,9%	76,7%	29,3%	40,0%	42,5%	85,2%		28,8%	64,8%	58,7%	65,7%	40,5%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	50,5%		96,9%	86,0%	28,7%	80,0%	43,3%	87,0%		28,8%	61,0%	56,8%	58,5%	40,3%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	70,7%		96,9%	80,7%	79,1%	80,0%	89,8%	74,1%		73,1%	75,7%	61,3%	55,6%	61,1%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	43,3%		96,9%	78,0%	25,6%	20,0%	38,6%	74,1%		34,6%	55,1%	49,7%	43,2%	33,4%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	70,5%		93,8%	78,7%	77,7%	60,0%	86,6%	79,6%		86,5%	66,9%	54,8%	69,1%	59,7%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	49,0%		93,8%	76,0%	29,0%	20,0%	41,7%	68,5%		23,1%	58,9%	47,1%	54,5%	49,3%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	73,4%		93,8%	76,0%	82,3%	60,0%	70,9%	81,5%		76,9%	74,0%	68,4%	71,4%	61,6%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	47,9%		90,6%	71,3%	26,6%	20,0%	55,1%	74,1%		26,9%	54,9%	52,3%	57,1%	42,9%

Cuadro No. 37 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LAS METANFETAMINAS SON LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

METANFETAMINA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	2,591	0	32	150	593	5	127	54	0	52	526	155	475	422
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	61,8%		93,8%	51,3%	76,4%	60,0%	73,2%	61,1%		69,2%	60,3%	51,0%	49,5%	58,1%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	45,5%		96,9%	73,3%	25,3%	40,0%	52,0%	57,4%		28,8%	54,8%	50,3%	53,1%	37,2%
Descuido de actividades	51,9%		93,8%	85,3%	28,0%	40,0%	44,1%	70,4%		42,3%	64,1%	56,8%	65,9%	39,1%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	52,1%		90,6%	60,0%	57,3%	80,0%	39,4%	42,6%		63,5%	56,7%	45,8%	46,1%	45,5%
Continuó usando a pesar de esos problemas	46,1%		93,8%	56,0%	30,4%	80,0%	32,3%	44,4%		51,9%	52,7%	45,8%	52,8%	48,8%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	76,0%		96,9%	90,7%	78,8%	100,0%	81,1%	87,0%		86,5%	76,0%	65,8%	77,1%	63,5%
Continúa usando a pesar de esos problemas	67,2%		93,8%	90,7%	51,9%	60,0%	85,8%	87,0%		75,0%	70,3%	64,5%	72,8%	60,0%

**SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE LAS ADICCIONES EN JALISCO
RESULTADOS 2017**

SEXO MASCULINO Y POR REGIÓN SANITARIA

Cuadro No. 39: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR USO DE DROGAS SEGÚN ANONIMATO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Anónimo	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Si	16,5%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	1,4%	1,0%		1,2%	12,5%	4,9%	51,8%	17,3%
No	83,5%		100,0%	100,0%	99,6%	100,0%	98,6%	99,0%		98,8%	87,5%	95,1%	48,2%	82,7%

Cuadro No. 40: PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR USO DE DROGAS SEGÚN EDAD EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGION SANITARIA

Edad Actual	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
5 a 9	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
10 a 14	2,4%		3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	3,0%	8,0%	1,9%	3,8%
15 a 19	17,5%		35,7%	5,9%	14,5%	27,3%	10,1%	15,6%		10,7%	18,1%	27,1%	20,0%	17,5%
20 a 24	21,8%		10,7%	24,0%	26,5%	18,2%	24,6%	14,6%		20,2%	19,5%	22,0%	22,0%	20,4%
25 a 29	15,1%		8,9%	14,6%	15,6%	0,0%	18,8%	19,8%		15,5%	16,2%	13,4%	14,9%	14,0%
30 a 34	12,1%		16,1%	13,8%	12,4%	0,0%	13,0%	15,6%		14,3%	11,4%	9,4%	12,3%	12,1%
35 a 39	9,9%		7,1%	10,2%	11,5%	0,0%	10,1%	15,6%		14,3%	10,6%	8,6%	8,8%	8,5%
40 a 44	7,6%		10,7%	12,2%	7,6%	9,1%	10,1%	5,2%		6,0%	7,4%	5,4%	7,9%	7,0%
45 a 49	6,3%		0,0%	10,6%	6,5%	18,2%	5,8%	8,3%		8,3%	6,1%	2,9%	5,6%	7,0%
50 a 54	3,3%		3,6%	3,1%	3,3%	9,1%	3,6%	2,1%		3,6%	3,6%	2,6%	2,6%	3,7%
55 a 59	2,4%		1,8%	3,9%	1,5%	9,1%	2,2%	1,0%		4,8%	2,2%	0,0%	2,5%	3,7%
60 a 64	0,9%		0,0%	1,6%	0,2%	9,1%	0,7%	0,0%		2,4%	1,5%	0,3%	0,6%	1,0%
65 a >	0,6%		1,8%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	2,1%		0,0%	0,4%	0,3%	0,8%	1,2%
S/D	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 41: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA

Residencia Estado	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Aguascalientes	0,3%		0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Baja California Norte	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Baja California Sur	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Campeche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Coahuila	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Colima	0,7%		0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	11,6%	0,0%		0,0%	0,4%	0,6%	0,2%	0,4%
Chiapas	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ciudad de México	0,2%		0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,8%	0,0%
Durango	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%
Guanajuato	0,8%		0,0%	0,8%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%		2,4%	1,6%	0,0%	0,2%	0,1%
Guerrero	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hidalgo	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Jalisco	93,6%		100,0%	97,2%	87,6%	100%	87,0%	97,9%		96,4%	93,0%	95,7%	95,8%	95,6%
Estado de México	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,5%	0,3%	0,6%	0,2%
Michoacán	1,9%		0,0%	0,8%	6,4%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,6%	0,6%	1,8%	1,0%
Nayarit	0,5%		0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,7%	0,0%		1,2%	0,8%	1,1%	0,1%	0,4%
Nuevo León	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Oaxaca	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Puebla	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
Querétaro	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Quintana Roo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
San Luis Potosí	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sinaloa	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%
Sonora	0,3%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,6%	0,0%	1,1%
Tabasco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Tamaulipas	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlaxcala	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veracruz	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,5%	0,0%	0,1%	0,0%
Yucatán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacatecas	0,3%		0,0%	0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,5%	0,6%	0,2%	0,4%
Otro País	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 42: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA

Residencia Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Acatic	0,4%		0,0%	3,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	0,1%
Acatlán de Juárez	0,2%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,7%	0,0%
Ahualulco del Mercado	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		14,3%	0,1%	0,6%	0,0%	0,0%
Amacueca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%
Amatitán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ameca	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%		6,0%	0,2%	0,0%	0,5%	0,7%
San Juanito	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arandas	0,5%		0,0%	6,3%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,1%
El Arenal	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,4%
Atemajac de Brizuela	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atengo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Atenguillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atotonilco el Alto	0,4%		0,0%	1,2%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
Atoyac	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Autlán de Navarro	2,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,4%	72,9%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%
Ayotlán	0,2%		0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Ayutla	0,2%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%
La Barca	0,6%		0,0%	0,4%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
Bolaños	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Cabo Corrientes	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Casimiro Castillo	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	1,0%		0,0%	0,1%	0,3%	0,2%	0,0%
Cihuatlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	2,1%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán El Grande	0,8%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	22,5%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Cocula	0,3%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	2,1%		4,8%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%
Colotlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,3%	0,2%	0,0%
Concepción de Buenos Aires	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuatitlán de García	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuatla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Cuquío	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Chapala	1,9%		0,0%	0,4%	9,9%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,5%	0,0%
Chimaltitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chiquilistlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Degollado	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ejutla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Encarnación de Díaz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Etzatlán	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		15,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,4%
El Grullo	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	12,5%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,4%
Guachinango	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Guadala-jara	21,5%		0,0%	6,3%	4,8%	0,0%	2,2%	0,0%		3,6%	9,9%	12,3%	24,1%	65,8%
Hostotipaquillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejúcar	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejuquilla el Alto	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
La Huerta	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ixtlahuacán de los Membrillos	0,7%		0,0%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,0%	0,3%	0,7%	0,2%
Ixtlahuacán del Río	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Jalostotitlán	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jamay	0,3%		0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jesús María	0,1%		0,0%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jilotlán de los Dolores	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jocotepec	1,0%		0,0%	0,0%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,7%	0,6%	0,1%	0,2%
Juanacatlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%
Juchitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lagos de Moreno	0,3%		0,0%	3,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,2%	0,0%
El Limón	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Magdalena	0,1%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Santa María del Oro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Manzanilla de la Paz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mascota	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Mazamitla	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mexxicacán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mezquitic	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Mixtlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ocotlán	4,6%		0,0%	0,4%	24,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,2%
Ojuelos de Jalisco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pihuamo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Poncitlán	1,8%		0,0%	0,8%	8,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,3%	0,0%
Puerto Vallarta	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,3%	0,2%	0,0%
Villa Purificación	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Quitupan	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
El Salto	1,3%		0,0%	0,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,9%	4,4%	1,0%
San Cristóbal de la Barranca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Diego de Alejandría	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Juan de los Lagos	1,6%		100,0%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
San Julián	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Marcos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Bolaños	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Hidalgo	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Miguel el Alto	0,1%		0,0%	1,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gómez Farías	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
San Sebastián del Oeste	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Santa María de los Ángeles	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sayula	0,3%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	7,2%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
Tala	0,8%		0,0%	1,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		8,3%	1,5%	0,0%	0,5%	0,5%
Talpa de Allende	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Tamazula de Gordiano	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Tapalpa	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Tecalitlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tecolotlán	0,1%		0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Techaluta de Montenegro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tenamaxtlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Teocaltiche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocuitatlán de Corona	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Tepatlán de Morelos	2,8%		0,0%	45,3%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,9%	0,1%	0,0%
Tequila	0,5%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		11,9%	0,4%	0,0%	0,1%	0,5%
Teuchtlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tizapán el Alto	0,1%		0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlajomulco de Zúñiga	3,6%		0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,7%	0,0%		1,2%	2,8%	2,0%	10,2%	3,3%
Tlaquepaque	9,0%		0,0%	1,6%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	4,7%	3,7%	33,2%	5,4%
Tolimán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Tomatlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Tonalá	4,8%		0,0%	7,9%	2,0%	100,0%	0,0%	0,0%		0,0%	1,3%	20,9%	6,1%	3,5%
Tonaya	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tonila	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Totatiche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tototlán	0,4%		0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxcacuesco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxcueca	0,1%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxpan	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,4%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Unión de San Antonio	0,0%		0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Unión de Tula	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Guadalupe	0,1%		0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Juárez	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Gabriel	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Corona	0,2%		0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Villa Guerrero	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Hidalgo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cañadas de Obregón	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Yahualica de González Gallo	0,1%		0,0%	2,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacoalco de Torres	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%		0,0%	0,1%	0,3%	0,2%	0,7%
Zapopan	23,7%		0,0%	0,0%	9,4%	0,0%	3,6%	0,0%		15,5%	67,0%	44,3%	10,0%	9,2%
Zapotiltic	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,4%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,4%

Zapotitlán de Vadillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán del Rey	0,2%		0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Zapotlanejo	1,0%		0,0%	3,9%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,0%	5,1%	0,2%	0,2%
San Ignacio Cerro Gordo	0,1%		0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Municipios de Otros Estados	6,4%		0,0%	2,8%	12,4%	0,0%	13,0%	2,1%		3,6%	7,0%	4,3%	4,2%	4,4%

Cuadro No. 43 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Ocupación Principal	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Estudiante de tiempo completo	7,9%		10,7%	0,8%	2,5%	0,0%	4,3%	10,4%		7,1%	11,1%	21,7%	4,4%	9,9%
Estudiante con actividad laboral	3,7%		17,9%	1,6%	1,7%	0,0%	2,2%	5,2%		1,2%	4,5%	4,3%	4,4%	3,7%
Tiene empleo estable > 6 meses	43,3%		33,9%	53,9%	49,6%	36,4%	63,0%	47,9%		44,0%	44,9%	29,1%	41,0%	37,3%
Tiene menos de 6 meses	16,8%		16,1%	16,5%	20,6%	36,4%	3,6%	14,6%		31,0%	12,7%	11,7%	21,6%	15,7%
Desempleado (busca empleo)	13,2%		7,1%	19,3%	13,0%	18,2%	10,9%	10,4%		6,0%	11,8%	8,0%	14,9%	15,4%
Desocupado (no busca empleo)	11,5%		10,7%	2,8%	5,3%	9,1%	15,2%	9,4%		4,8%	13,3%	24,3%	9,7%	15,2%
Hogar	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,3%	0,7%	1,1%
Pensionado	0,6%		0,0%	1,2%	0,2%	0,0%	0,0%	1,0%		6,0%	0,7%	0,3%	0,6%	0,6%
No aplica	0,2%		0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,4%
Otra	2,0%		3,6%	2,8%	6,5%	0,0%	0,7%	1,0%		0,0%	0,0%	0,3%	2,3%	0,7%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,2%		0,0%	0,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%

Cuadro No. 44 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Grado Máximo de Estudios	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Primaria	25,2%		39,3%	39,8%	26,1%	36,4%	14,5%	21,9%		16,7%	20,2%	17,7%	30,7%	25,0%
Secundaria	45,6%		37,5%	37,8%	55,3%	63,6%	39,1%	36,5%		45,2%	41,1%	50,9%	45,4%	44,3%
Escolaridad Técnica	3,5%		1,8%	3,5%	3,3%	0,0%	1,4%	1,0%		3,6%	3,2%	2,0%	5,6%	3,0%
Bachillerato	17,8%		19,6%	9,4%	10,8%	0,0%	36,2%	26,0%		19,0%	25,5%	21,1%	10,9%	20,1%
Licenciatura	5,0%		0,0%	4,7%	2,8%	0,0%	8,7%	8,3%		10,7%	9,1%	5,4%	2,9%	3,6%
Maestría doctorado Especialidad	0,6%		0,0%	1,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,6%	0,6%	0,3%	0,8%
No sabe leer ni escribir	1,2%		0,0%	3,1%	0,4%	0,0%	0,0%	2,1%		3,6%	0,1%	0,9%	2,5%	1,7%
Sabe leer y escribir	0,7%		1,8%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%		0,0%	0,2%	1,4%	1,3%	1,2%
No aplica	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,3%		0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%

Cuadro No. 45 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Estado Civil	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Soltero	57,1%		57,1%	42,9%	55,8%	63,6%	48,6%	56,3%		47,6%	59,6%	71,4%	55,7%	57,4%
Casado	18,4%		28,6%	33,9%	21,4%	27,3%	24,6%	20,8%		26,2%	16,7%	11,1%	15,0%	16,5%
Unión Libre	14,9%		10,7%	8,7%	15,4%	9,1%	13,8%	9,4%		14,3%	13,2%	13,7%	18,4%	16,4%
Separado	5,8%		1,8%	11,4%	2,6%	0,0%	3,6%	7,3%		2,4%	6,5%	3,7%	7,6%	6,5%
Divorciado	2,5%		1,8%	2,4%	2,5%	0,0%	6,5%	2,1%		8,3%	3,2%	0,0%	1,8%	2,4%
Viudo	0,4%		0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	1,0%		1,2%	0,7%	0,0%	0,3%	0,7%
No aplica	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,8%		0,0%	0,4%	2,2%	0,0%	2,9%	3,1%		0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%

Cuadro No. 46 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN ANTECEDENTE DE BÚSQUEDA DE APOYO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Búsqueda de Apoyo	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Primera vez en el año	59,5%		55,4%	42,9%	71,1%	63,6%	53,6%	56,3%		59,5%	59,8%	72,3%	56,0%	52,9%
Ya había acudido en este año	40,5%		44,6%	57,1%	28,9%	36,4%	46,4%	43,8%		40,5%	40,2%	27,7%	44,0%	47,1%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 47 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE HA RECIBIDO TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Número de veces	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Primera Vez	59,5%		55,4%	42,9%	71,1%	63,6%	53,6%	56,3%		59,5%	59,8%	72,3%	56,0%	52,9%
2 a 4	32,7%		39,3%	50,0%	22,3%	18,2%	40,6%	36,5%		36,9%	32,1%	22,6%	35,4%	37,5%
5 a >	7,7%		5,4%	7,1%	6,6%	18,2%	5,8%	7,3%		3,6%	8,0%	5,1%	8,6%	9,6%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 48 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN LA FORMA EN QUE ACUDE A TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Forma que acude	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Voluntariamente	55,3%		51,8%	50,8%	33,2%	45,5%	65,9%	75,0%		31,0%	69,0%	81,7%	48,1%	57,7%
Indicación médica no psiquiátrica	2,9%		1,8%	0,8%	8,1%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	1,4%	0,0%	0,3%	4,9%
Indicación médica psiquiátrica	1,2%		0,0%	0,4%	2,7%	0,0%	0,7%	1,0%		0,0%	1,3%	0,0%	0,3%	1,8%
Lo llevaron amigos o familiares	33,4%		7,1%	46,1%	47,4%	45,5%	29,0%	5,2%		69,0%	21,2%	11,4%	45,7%	28,3%
Indicación Legal	2,9%		5,4%	0,8%	6,4%	9,1%	2,9%	13,5%		0,0%	2,1%	1,4%	2,3%	1,3%
Escuela o trabajo	2,7%		10,7%	0,4%	0,6%	0,0%	0,7%	3,1%		0,0%	3,6%	5,1%	0,9%	5,0%
Otra (s)	1,3%		23,2%	0,0%	1,3%	0,0%	0,7%	1,0%		0,0%	1,2%	0,3%	1,9%	0,1%
No sabe	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%
No responde	0,2%		0,0%	0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,2%

**Cuadro No. 49 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN DROGA DE INICIO, GENERAL
Y POR REGIÓN SANITARIA**

Drogas de inicio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Alcohol	35,8%		44,6%	36,6%	37,1%	54,5%	29,7%	59,4%		50,0%	37,0%	39,4%	30,6%	32,6%
Marihuana	16,6%		14,3%	13,0%	18,9%	0,0%	18,1%	10,4%		15,5%	15,7%	16,0%	18,7%	15,6%
Inhalantes	3,1%		0,0%	1,6%	0,7%	0,0%	1,4%	4,2%		0,0%	4,2%	3,1%	5,5%	2,9%
Alucinógenos	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%
Heroína	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Opio/Morfina	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cocaína	2,1%		0,0%	1,2%	1,5%	0,0%	6,5%	1,0%		11,9%	1,6%	2,6%	1,7%	2,3%
Tranquilizantes	0,4%		0,0%	1,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,9%	0,3%	0,6%
Barbitúricos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Anfetaminas	0,3%		5,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,4%	0,2%	0,0%	0,1%	0,6%
Anticolinérgicos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Tabaco	33,4%		35,7%	40,9%	17,8%	18,2%	32,6%	21,9%		15,5%	37,4%	34,6%	38,7%	38,8%
Antidepresivos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros Psicotrópicos	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
Pasta Base	0,3%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,2%	0,0%	0,1%	1,1%
Metanfetamina Cristal	7,6%		0,0%	5,1%	23,3%	27,3%	11,6%	3,1%		2,4%	3,1%	2,3%	3,9%	5,0%
Flunitracepam	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Crack	0,2%		0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,6%	0,2%	0,1%
Refractil ofteno	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 50 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN EDAD DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Edad de Inicio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
5 a 9	6,8%		8,9%	7,5%	3,3%	0,0%	2,9%	9,4%		4,8%	5,0%	6,6%	8,4%	11,0%
10 a 14	46,6%		53,6%	46,1%	24,9%	36,4%	43,5%	55,2%		41,7%	52,4%	56,3%	51,8%	51,4%
15 a 19	35,9%		37,5%	37,8%	42,4%	54,5%	41,3%	28,1%		42,9%	36,3%	31,1%	34,7%	30,7%
20 a 24	6,9%		0,0%	5,5%	19,5%	0,0%	4,3%	5,2%		4,8%	4,0%	4,9%	3,3%	4,2%
25 a 29	1,9%		0,0%	0,8%	5,1%	0,0%	3,6%	2,1%		4,8%	1,0%	0,9%	0,9%	1,1%
30 a 34	0,9%		0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	1,4%	0,0%		1,2%	0,5%	0,0%	0,5%	0,6%
35 a 39	0,6%		0,0%	2,4%	0,9%	9,1%	0,7%	0,0%		0,0%	0,3%	0,3%	0,1%	0,7%
40 a 44	0,2%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	1,4%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,2%
45 a 49	0,2%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%
50 a 54	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
55 a 59	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60 a 64	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65 a >	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 51 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Drogas de impacto	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Alcohol	21,6%		21,4%	31,9%	20,7%	45,5%	13,0%	44,8%		34,5%	18,3%	26,3%	18,8%	21,2%
Marihuana	13,5%		12,5%	10,2%	5,9%	0,0%	6,5%	11,5%		7,1%	16,6%	22,6%	14,3%	15,7%
Inhalantes	2,6%		0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	3,3%	1,4%	4,1%	5,0%
Alucinógenos	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		2,4%	0,5%	0,3%	0,2%	0,2%
Heroína	0,5%		0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	1,3%	0,3%	0,1%	0,2%
Opio/Morfina	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Cocaína	3,5%		3,6%	3,9%	2,5%	0,0%	2,9%	0,0%		6,0%	5,5%	3,1%	2,5%	3,3%
Tranquilizantes	0,8%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,6%	1,9%	0,8%
Barbitúricos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Anfetaminas	1,2%		46,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	3,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Anticolinérgicos	0,0%		1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tabaco	2,3%		14,3%	1,6%	0,1%	0,0%	2,2%	3,1%		0,0%	2,5%	2,6%	2,1%	4,0%
Antidepresivos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros Psicotrópicos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Pasta Base	1,0%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	1,1%	0,3%	0,9%	2,6%
Metanfetamina Cristal	51,0%		0,0%	51,6%	69,1%	45,5%	73,9%	40,6%		47,6%	44,3%	40,0%	53,2%	44,5%
Flunitracepam	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Crack	1,5%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	2,3%	2,6%	1,6%	2,0%
Refractil ofteno	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 52 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN ESTADO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Estado	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Aguascalientes	0,3%		0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Baja California	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,5%
Baja California Sur	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Campeche	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%
Coahuila	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Colima	0,7%		0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	11,6%	0,0%		0,0%	0,4%	0,6%	0,2%	0,4%
Chiapas	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ciudad de México	0,2%		0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,8%	0,0%
Durango	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Guanajuato	0,9%		0,0%	0,8%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%		2,4%	1,6%	0,0%	0,2%	0,4%
Guerrero	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Hidalgo	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Jalisco	93,6%		100,0%	98,0%	87,6%	100%	87,0%	100%		96,4%	93,4%	96,9%	96,0%	94,0%
Estado de México	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,2%
Michoacán	1,8%		0,0%	0,0%	6,3%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,3%	0,6%	1,7%	1,0%
Morelos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nayarit	0,4%		0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,7%	0,0%		1,2%	0,8%	0,9%	0,0%	0,4%
Nuevo León	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Oaxaca	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Puebla	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Querétaro	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Quintana Roo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
San Luis Potosí	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sinaloa	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Sonora	0,3%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	1,4%
Tabasco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Tamaulipas	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veracruz	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacatecas	0,3%		0,0%	0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,5%	0,3%	0,2%	0,4%
Otro País	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 53 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Acatic	0,4%		0,0%	2,8%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,1%	0,2%
Acatlán de Juárez	0,2%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,7%	0,0%
Ahualulco del Mercado	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		14,3%	0,0%	0,6%	0,1%	0,0%
Amacueca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%
Amatitán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Ameca	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%		6,0%	0,2%	0,0%	0,5%	0,7%
San Juanito de Escobedo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arandas	0,5%		0,0%	6,3%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,1%
El Arenal	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,4%
Atemajac de Brizuela	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atengo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Atenguillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atotonilco el Alto	0,4%		0,0%	1,6%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Atoyac	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Autlán de Navarro	2,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,4%	75,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%
Ayotlán	0,2%		0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
Ayutla	0,2%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%
La Barca	0,6%		0,0%	0,4%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Bolaños	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Cabo Corrientes	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Casimiro Castillo	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	1,0%		0,0%	0,1%	0,3%	0,2%	0,0%
Cihuatlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	2,1%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán El Grande	0,8%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	21,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Cocula	0,3%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	2,1%		4,8%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Colotlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,3%	0,2%	0,0%
Concepción de Buenos Aires	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuatitlán de García Barragán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 53 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Cuautla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuquío	0,1%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Chapala	2,0%		0,0%	0,4%	10,3%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%
Chimaltitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chiquilistlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Degollado	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ejutla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Encarnación de Díaz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Etzatlán	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		14,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,4%
El Grullo	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	11,5%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Guachinango	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guadalajara	21,4%		0,0%	5,1%	4,9%	0,0%	2,2%	1,0%		3,6%	9,8%	12,9%	22,8%	66,7%
Hostotipaquillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejúcar	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejuquilla el Alto	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
La Huerta	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ixtlahuacán de los Membrillos	0,7%		0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,0%	0,3%	0,7%	0,2%
Ixtlahuacán del Río	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Jalostotitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jamay	0,3%		0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jesús María	0,1%		0,0%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jilotlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jocotepec	1,0%		0,0%	0,0%	4,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,7%	0,6%	0,1%	0,2%
Juanacatlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%
Juchitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lagos de Moreno	0,3%		0,0%	2,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,2%	0,0%
El Limón	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Magdalena	0,1%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Santa María del Oro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Manzanilla de la Paz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 53 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Mascota	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mazamitla	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mexxicacán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mezquitic	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mixtlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ocotlán	4,6%		0,0%	0,4%	24,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,2%
Ojuelos de Jalisco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pihuamo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Poncitlán	1,8%		0,0%	0,8%	8,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	0,0%	0,3%	0,0%
Puerto Vallarta	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,3%	0,3%	0,0%
Villa Purificación	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Quitupan	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
El Salto	1,3%		0,0%	0,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,3%	1,1%	4,5%	0,6%
San Cristóbal de la Barranca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Diego de Alejandría	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Juan de los Lagos	1,6%		100,0%	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
San Julián	0,0%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Marcos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Bolaños	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Hidalgo	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Miguel el Alto	0,1%		0,0%	1,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gómez Farías	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
San Sebastián del Oeste	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Santa María de los Ángeles	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sayula	0,3%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	6,5%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
Tala	0,8%		0,0%	1,2%	0,2%	0,0%	0,7%	0,0%		9,5%	1,4%	0,0%	0,5%	0,5%

Cuadro No. 53 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Talpa de Allende	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tamazula de Gordiano	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tapalpa	0,1%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Tecalitlán	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tecolotlán	0,1%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Techaluta de Montenegro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tenamaxtlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocaltiche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocuitatlán de Corona	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Tepatitlán de M	3,1%		0,0%	49,2%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,9%	0,1%	0,0%
Tequila	0,4%		0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%		11,9%	0,4%	0,0%	0,0%	0,4%
Teuchitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tizapán el Alto	0,1%		0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlajomulco de Zúñiga	3,4%		0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,7%	0,0%		1,2%	2,4%	2,3%	9,7%	3,1%
Tlaquepa-que	8,8%		0,0%	2,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	4,1%	3,1%	34,4%	4,4%
Tolimán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Tomatlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tonalá	4,8%		0,0%	7,9%	2,0%	90,9%	0,0%	0,0%		0,0%	1,0%	22,3%	6,3%	3,3%
Tonaya	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tonila	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Totatiche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tototlán	0,4%		0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Tuxcacuesco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxcueca	0,1%		0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxpan	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,4%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Unión de San Antonio	0,0%		0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 53 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Unión de Tula	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Guadalupe	0,1%		0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Juárez	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Gabriel	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Corona	0,2%		0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Villa Guerrero	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Hidalgo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cañadas de Obregón	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Yahualica de González Gallo	0,1%		0,0%	2,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacoalco de Torres	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%		0,0%	0,0%	0,3%	0,2%	0,5%
Zapopan	24,3%		0,0%	0,0%	9,4%	0,0%	3,6%	0,0%		15,5%	69,3%	44,0%	10,3%	9,2%
Zapotiltic	0,4%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,1%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,4%
Zapotitlán de Vadillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán del Rey	0,2%		0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Zapotlanejo	1,0%		0,0%	3,5%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,0%	5,4%	0,2%	0,4%
San Ignacio Cerro Gordo	0,1%		0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Municipios de Otros Estados	6,4%		0,0%	2,0%	12,4%	0,0%	13,0%	0,0%		3,6%	6,6%	3,1%	4,0%	6,0%

Cuadro No. 54 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO POR USO DE DROGAS INYECTADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Uso de drogas inyectadas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Si	4,4%		7,1%	5,9%	1,6%	0,0%	2,2%	4,2%		3,6%	3,5%	4,3%	6,9%	5,7%
No	95,6%		92,9%	94,1%	98,4%	100,0%	97,8%	95,8%		96,4%	96,5%	95,7%	93,1%	94,3%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 55 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO QUE COMPARTE JERINGAS CON EL USO DE DROGAS INYECTADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Comparte jeringas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	199		4	19	15	0	5	4	0	3	34	15	60	48
Si	74,4%		75,0%	80,0%	76,9%		66,7%	50,0%		66,7%	82,4%	73,3%	78,3%	64,6%
No	25,1%		25,0%	20,0%	15,4%		33,3%	25,0%		33,3%	20,6%	26,7%	21,7%	35,4%
No sabe	1,5%		0,0%	0,0%	7,7%		0,0%	25,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%
No responde	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 56 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN ESTADO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Usó jeringa nueva	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	199		4	19	15	0	5	4	0	3	34	15	60	48
Si	31,7%		50,0%	26,7%	53,8%		33,3%	25,0%		0,0%	38,2%	46,7%	23,3%	29,2%
No	67,8%		50,0%	66,7%	46,2%		66,7%	75,0%		100,0%	64,7%	53,3%	73,3%	72,9%
No sabe	1,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%
No responde	0,5%		0,0%	6,7%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 57 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO CONSUMO DE DROGAS COMBINADO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Combina Drogas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Si	50,6%		64,3%	62,6%	35,0%	9,1%	58,0%	44,8%		40,5%	47,4%	43,1%	61,1%	58,1%
No	49,4%		35,7%	37,4%	65,0%	90,9%	42,0%	55,2%		59,5%	52,6%	56,9%	38,9%	41,9%

Cuadro No. 58 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO QUE CONDUCEN BAJO EL EFECTO DE DROGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Conducción bajo efecto de drogas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Si	43,3%		57,1%	73,6%	56,0%	18,2%	60,9%	58,3%		48,8%	34,7%	20,0%	38,0%	41,0%
No	46,3%		41,1%	9,8%	36,2%	36,4%	23,9%	35,4%		33,3%	58,7%	64,3%	45,5%	53,0%
No sabe	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%
No responde	10,3%		1,8%	16,5%	7,8%	45,5%	15,2%	6,3%		17,9%	6,5%	15,7%	16,4%	5,8%

Cuadro No. 59 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO REFIEREN PADECER UNA ENFERMEDAD ASOCIADA AL CONSUMO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Padece alguna enfermedad	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
Si	4,2%		1,8%	9,8%	2,8%	0,0%	3,6%	8,3%		2,4%	6,0%	4,0%	2,1%	4,2%
No	95,8%		98,2%	90,2%	97,2%	100,0%	96,4%	91,7%		97,6%	94,0%	96,0%	97,9%	95,8%

Cuadro No. 60 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO LUGAR DONDE CONSIGUE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Donde consigue la droga de impacto	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
En su propia casa	11,0%		8,9%	11,4%	8,1%	18,2%	19,6%	11,5%		13,1%	10,4%	29,4%	7,2%	9,0%
Se la llevan a su casa	8,0%		1,8%	10,2%	8,1%	18,2%	9,4%	8,3%		15,5%	7,9%	7,7%	8,8%	5,8%
En casa de un amigo o familiar	8,0%		8,9%	6,3%	10,8%	9,1%	0,7%	8,3%		9,5%	6,9%	8,6%	9,6%	6,0%
En la calle	41,8%		3,6%	18,5%	43,3%	54,5%	50,7%	16,7%		47,6%	42,7%	34,9%	48,2%	45,6%
En antros y bares	3,5%		0,0%	7,1%	3,8%	0,0%	0,7%	3,1%		3,6%	5,7%	3,1%	1,6%	2,7%
En fiestas y reuniones	1,9%		7,1%	1,2%	1,0%	0,0%	1,4%	11,5%		1,2%	3,0%	1,7%	0,7%	1,8%
En la escuela	0,3%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	1,1%
En el trabajo	1,4%		3,6%	3,5%	0,2%	0,0%	0,0%	3,1%		1,2%	1,5%	0,9%	1,1%	2,3%
En tiendas cercanas a mi casa	15,8%		64,3%	35,0%	9,4%	0,0%	1,4%	22,9%		7,1%	17,2%	8,3%	18,6%	14,4%
Parques	0,9%		0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	2,4%	2,6%	0,1%	0,7%
Picaderos	6,7%		0,0%	3,5%	15,1%	0,0%	15,9%	13,5%		0,0%	1,0%	2,3%	3,4%	10,2%
Otro	0,2%		1,8%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,1%	0,3%	0,2%	0,2%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
No responde	0,3%		0,0%	1,2%	0,1%	0,0%	0,0%	1,0%		0,0%	0,7%	0,3%	0,1%	0,1%

Cuadro No. 61 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO LUGAR DONDE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Donde consume la droga de impacto	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
La tiene en su casa	33,9%		46,4%	61,0%	23,8%	63,6%	21,7%	40,6%		33,3%	35,2%	29,7%	34,5%	35,2%
En casa de un amigo o familiar	18,5%		25,0%	12,2%	23,7%	18,2%	7,2%	16,7%		19,0%	17,8%	30,3%	17,2%	14,4%
En la vía pública (calles, parques)	29,2%		16,1%	11,8%	30,9%	9,1%	5,1%	20,8%		41,7%	29,2%	16,9%	37,9%	33,8%
En antros y bares	3,9%		1,8%	3,1%	4,5%	9,1%	2,9%	3,1%		1,2%	4,8%	9,1%	1,7%	3,1%
En fiestas y reuniones	4,1%		7,1%	1,2%	5,3%	0,0%	4,3%	10,4%		1,2%	5,8%	6,3%	2,3%	2,4%
En la escuela	0,6%		0,0%	0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	1,0%	0,6%	0,5%	1,1%
En el trabajo	3,3%		3,6%	5,1%	2,7%	0,0%	8,7%	3,1%		2,4%	3,3%	2,3%	2,3%	4,0%
En picaderos	5,4%		0,0%	1,2%	8,5%	0,0%	50,0%	5,2%		0,0%	1,5%	3,4%	2,9%	5,1%
Otro	0,6%		0,0%	2,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%	0,5%	1,1%	0,6%	0,7%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,4%		0,0%	0,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,7%	0,3%	0,2%	0,1%

Cuadro No. 62 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN EDAD DE INICIO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Edad de Inicio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	4,489	0	56	254	816	11	138	96	0	84	971	350	873	840
5 a 9	3,0%		8,3%	2,5%	1,2%			4,7%			3,4%	6,5%	3,0%	2,8%
10 a 14	30,1%		41,7%	32,1%	10,7%		27,8%	44,2%		37,9%	32,0%	45,7%	30,5%	33,1%
15 a 19	47,7%		50,0%	49,4%	48,5%	80,0%	50,0%	30,2%		44,8%	51,1%	35,9%	51,2%	48,9%
20 a 24	12,9%			13,6%	24,9%		5,6%	14,0%		13,8%	9,6%	12,0%	9,8%	9,6%
25 a 29	3,3%			1,2%	8,9%		11,1%	2,3%		3,4%	1,1%		1,8%	3,9%
30 a 34	1,5%			1,2%	1,8%		5,6%	2,3%			1,1%		2,4%	1,7%
35 a 39	0,7%				1,8%	20,0%					1,7%			
40 a 44	0,4%				1,2%								1,2%	
45 a 49	0,1%							2,3%						
50 a 54	0,2%				1,2%									
55 a 59														
60 a 64														
65 a >														

Cuadro No. 63 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

ALCOHOL	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	969	0	12	81	169	5	18	43	0	29	178	92	164	178
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	80,7%		91,7%	85,2%	80,5%	100,0%	100,0%	72,1%		93,1%	88,8%	78,3%	81,7%	68,0%
Menor efecto que antes	58,6%		75,0%	84,0%	40,2%	40,0%	33,3%	74,4%		48,3%	68,5%	66,3%	70,1%	39,9%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	55,3%		83,3%	84,0%	36,1%	40,0%	22,2%	72,1%		51,7%	65,7%	51,1%	67,1%	39,9%

Cuadro No. 63 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

ALCOHOL	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	969	0	12	81	169	5	18	43	0	29	178	92	164	178
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	69,1%		91,7%	81,5%	71,6%	60,0%	100,0%	62,8%		96,6%	75,3%	62,0%	62,2%	57,9%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	42,0%		83,3%	77,8%	30,8%		16,7%	58,1%		51,7%	41,6%	34,8%	48,8%	29,8%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	70,2%		91,7%	77,8%	71,6%	40,0%	83,3%	88,4%		96,6%	67,4%	62,0%	70,1%	61,8%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	51,3%		75,0%	90,1%	32,0%	60,0%	22,2%	74,4%		41,4%	51,1%	45,7%	59,1%	44,9%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	70,6%		83,3%	77,8%	76,3%	60,0%	50,0%	67,4%		96,6%	73,0%	58,7%	78,7%	56,2%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	48,3%		83,3%	79,0%	29,0%	20,0%	66,7%	69,8%		44,8%	47,2%	50,0%	54,3%	39,3%
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	54,2%		91,7%	38,3%	69,2%	80,0%	55,6%	32,6%		82,8%	58,4%	48,9%	46,3%	50,0%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	46,1%		75,0%	81,5%	28,4%	20,0%	72,2%	41,9%		41,4%	50,0%	42,4%	60,4%	29,8%
Descuido de actividades	52,3%		100,0%	97,5%	33,1%	60,0%	22,2%	46,5%		51,7%	56,7%	50,0%	65,9%	35,4%

Cuadro No. 65 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

MARIHUANA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	604	0	7	26	48	0	9	11	0	6	161	79	125	132
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	74,0%		100,0%	61,5%	97,9%		88,9%	45,5%		83,3%	66,5%	86,1%	73,6%	69,7%
Menor efecto que antes	56,3%		100,0%	57,7%	52,1%		66,7%	54,5%		33,3%	56,5%	75,9%	54,4%	45,5%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	50,5%		100,0%	73,1%	50,0%		55,6%	54,5%		16,7%	50,9%	58,2%	46,4%	43,2%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	61,6%		100,0%	50,0%	89,6%		88,9%	45,5%		66,7%	61,5%	63,3%	54,4%	56,8%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	41,6%		100,0%	69,2%	45,8%		55,6%	45,5%		33,3%	41,0%	49,4%	29,6%	37,9%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	63,4%		100,0%	69,2%	75,0%		55,6%	63,6%		83,3%	63,4%	46,8%	68,8%	60,6%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	51,0%		100,0%	92,3%	45,8%		33,3%	72,7%			53,4%	45,6%	44,8%	50,0%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	54,0%		100,0%	46,2%	79,2%		55,6%	36,4%		83,3%	47,2%	60,8%	50,4%	51,5%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	41,7%		100,0%	57,7%	39,6%		77,8%	36,4%		33,3%	35,4%	39,2%	43,2%	42,4%

Cuadro No. 65 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

MARIHUANA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa- que	Guadala- jara
	604	0	7	26	48	0	9	11	0	6	161	79	125	132
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	52,3%		100,0%	30,8%	79,2%		66,7%	18,2%		66,7%	51,6%	57,0%	42,4%	53,0%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	39,4%		100,0%	61,5%	39,6%		44,4%	18,2%		33,3%	37,9%	32,9%	38,4%	40,2%
Descuido de actividades	49,3%		85,7%	76,9%	33,3%		44,4%	36,4%		33,3%	49,7%	50,6%	47,2%	50,8%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	40,1%		85,7%	53,8%	64,6%		44,4%	9,1%		66,7%	38,5%	51,9%	30,4%	31,1%
Continuó usando a pesar de esos problemas	36,9%		85,7%	50,0%	37,5%			27,3%		16,7%	28,6%	44,3%	40,0%	38,6%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	65,1%		100,0%	80,8%	75,0%		66,7%	72,7%		33,3%	68,3%	63,3%	67,2%	52,3%
Continúa usando a pesar de esos problemas	55,8%		100,0%	80,8%	47,9%		55,6%	63,6%		33,3%	55,9%	53,2%	63,2%	46,2%

Cuadro No. 67 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

INHALANTES	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	117	0	0	1	1	0	0	0	0	0	32	5	36	42
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	71,8%				100,0%						90,6%	80,0%	75,0%	54,8%
Menor efecto que antes	59,0%			100,0%	100,0%						81,3%	60,0%	55,6%	42,9%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	61,5%			100,0%	100,0%						87,5%	60,0%	58,3%	42,9%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	65,8%			100,0%	100,0%						81,3%	80,0%	52,8%	61,9%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	45,3%			100,0%	100,0%						62,5%	40,0%	36,1%	38,1%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	58,1%			100,0%							65,6%	60,0%	72,2%	40,5%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	54,7%			100,0%	100,0%						71,9%	40,0%	61,1%	35,7%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	60,7%				100,0%						53,1%	80,0%	63,9%	61,9%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	46,2%				100,0%						62,5%	20,0%	52,8%	31,0%

Cuadro No. 67 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

INHALANTES	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	117	0	0	1	1	0	0	0	0	0	32	5	36	42
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	56,4%										62,5%	100,0%	50,0%	54,8%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	45,3%				100,0%						78,1%	20,0%	38,9%	28,6%
Descuido de actividades	56,4%				100,0%						78,1%	40,0%	69,4%	31,0%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	42,7%				100,0%						59,4%	60,0%	44,4%	26,2%
Continuó usando a pesar de esos problemas	52,1%				100,0%						62,5%	40,0%	61,1%	38,1%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	73,5%				100,0%						81,3%	80,0%	80,6%	61,9%
Continúa usando a pesar de esos problemas	70,1%				100,0%						71,9%	80,0%	75,0%	64,3%

Cuadro No. 69 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

COCAÍNA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	155	0	2	10	20	0	4	0	0	5	53	11	22	28
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	81,9%		100,0%	90,0%	85,0%		100,0%			100,0%	86,8%	63,6%	63,6%	82,1%
Menor efecto que antes	59,4%		100,0%	70,0%	60,0%					40,0%	75,5%	54,5%	50,0%	42,9%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	61,3%		100,0%	90,0%	60,0%					40,0%	67,9%	54,5%	59,1%	53,6%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	68,4%		100,0%	80,0%	75,0%		100,0%			80,0%	73,6%	45,5%	50,0%	64,3%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	51,0%		100,0%	60,0%	45,0%					60,0%	62,3%	27,3%	50,0%	42,9%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	66,5%		100,0%	80,0%	65,0%		100,0%			80,0%	67,9%	45,5%	45,5%	75,0%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	49,0%		100,0%	60,0%	35,0%					60,0%	52,8%	27,3%	31,8%	71,4%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	62,6%		100,0%	70,0%	80,0%		50,0%			60,0%	66,0%	36,4%	45,5%	64,3%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	51,0%		100,0%	70,0%	40,0%		50,0%			40,0%	58,5%	27,3%	50,0%	46,4%

Cuadro No. 69 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

COCAÍNA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	155	0	2	10	20	0	4	0	0	5	53	11	22	28
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	48,4%		100,0%	50,0%	60,0%		50,0%			80,0%	35,8%	36,4%	50,0%	57,1%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	47,1%		100,0%	80,0%	35,0%		50,0%			40,0%	56,6%	9,1%	45,5%	39,3%
Descuido de actividades	51,0%		100,0%	90,0%	30,0%					40,0%	56,6%	36,4%	68,2%	39,3%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	41,9%		100,0%	50,0%	45,0%					60,0%	56,6%	27,3%	22,7%	28,6%
Continuó usando a pesar de esos problemas	39,4%		100,0%	40,0%	20,0%					40,0%	52,8%	36,4%	36,4%	32,1%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	69,7%		100,0%	90,0%	65,0%		50,0%			80,0%	77,4%	54,5%	59,1%	64,3%
Continúa usando a pesar de esos problemas	59,4%		100,0%	70,0%	45,0%		75,0%			60,0%	66,0%	54,5%	54,5%	53,6%

Cuadro No. 71 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

TABACO	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	104	0	8	4	1	0	3	3	0	0	24	9	18	34
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	71,2%		100,0%	75,0%	100,0%		100,0%	100,0%			58,3%	88,9%	61,1%	67,6%
Menor efecto que antes	55,8%		100,0%	25,0%				100,0%			29,2%	88,9%	66,7%	55,9%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	53,8%		100,0%	75,0%				100,0%			29,2%	88,9%	50,0%	52,9%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	57,7%		87,5%	50,0%	100,0%		100,0%	100,0%			54,2%	44,4%	44,4%	55,9%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	40,4%		87,5%	25,0%				66,7%			25,0%	77,8%	44,4%	32,4%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	52,9%		75,0%	75,0%	100,0%		100,0%	100,0%			45,8%	44,4%	50,0%	44,1%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	38,5%		87,5%	50,0%				33,3%			29,2%	55,6%	33,3%	35,3%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	50,0%		87,5%	75,0%	100,0%		66,7%	100,0%			54,2%	11,1%	50,0%	38,2%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	40,4%		87,5%	25,0%			33,3%	33,3%			37,5%	55,6%	50,0%	26,5%
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	37,5%		75,0%	50,0%	100,0%		66,7%	100,0%			25,0%	33,3%	44,4%	23,5%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	28,8%		75,0%	75,0%			33,3%	33,3%			20,8%	33,3%	22,2%	20,6%
Descuido de actividades	42,3%		75,0%	100,0%				100,0%			25,0%	44,4%	50,0%	35,3%

Cuadro No. 73 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

METANFETAMINA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	2,289	0	0	131	564	5	102	39	0	40	430	140	464	374
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	79,1%			83,2%	83,9%	100,0%	98,0%	89,7%		82,5%	82,1%	64,3%	75,4%	70,3%
Menor efecto que antes	52,4%			77,1%	30,3%	40,0%	42,2%	84,6%		37,5%	69,1%	55,0%	65,5%	41,7%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	50,9%			86,3%	29,3%	80,0%	44,1%	87,2%		37,5%	65,3%	53,6%	58,8%	42,8%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	70,8%			81,7%	79,8%	80,0%	95,1%	71,8%		70,0%	77,4%	60,7%	55,4%	61,8%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	43,5%			79,4%	26,2%	20,0%	40,2%	71,8%		45,0%	59,5%	48,6%	42,7%	35,8%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	69,4%			75,6%	78,2%	60,0%	85,3%	82,1%		82,5%	64,9%	52,9%	69,0%	58,8%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	49,5%			79,4%	30,0%	20,0%	43,1%	76,9%		30,0%	60,9%	46,4%	54,5%	51,3%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	73,5%			74,0%	82,3%	60,0%	77,5%	84,6%		77,5%	75,1%	67,9%	71,1%	60,7%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	48,8%			74,8%	27,7%	20,0%	57,8%	74,4%		32,5%	59,8%	51,4%	56,7%	45,2%

Cuadro No. 73 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

METANFETAMINA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	2,289	0	0	131	564	5	102	39	0	40	430	140	464	374
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	62,2%			49,6%	76,8%	60,0%	82,4%	66,7%		72,5%	61,6%	48,6%	49,8%	58,6%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	45,8%			73,3%	26,6%	40,0%	52,9%	56,4%		32,5%	58,1%	50,7%	53,4%	38,2%
Descuido de actividades	51,6%			84,7%	29,1%	40,0%	41,2%	64,1%		42,5%	66,3%	56,4%	65,5%	40,4%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	51,8%			65,6%	58,3%	80,0%	40,2%	41,0%		60,0%	56,7%	45,0%	45,9%	44,4%
Continuó usando a pesar de esos problemas	45,5%			61,1%	31,2%	80,0%	33,3%	41,0%		55,0%	52,3%	43,6%	52,6%	47,9%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	75,5%			89,3%	79,1%	100,0%	83,3%	87,2%		85,0%	75,6%	66,4%	76,9%	62,3%
Continúa usando a pesar de esos problemas	66,0%			89,3%	52,0%	60,0%	86,3%	84,6%		80,0%	68,8%	64,3%	72,6%	59,1%

**SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE LAS ADICCIONES EN JALISCO
RESULTADOS 2017**

SEXO FEMENINO Y POR REGIÓN SANITARIA

Cuadro No. 75 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE PREFIEREN EL ANONIMATO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Anónimo	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Si	20,1%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	25,2%	0,0%	89,3%	30,8%
No	79,9%		100%	100%	100%		97,4%	100%		100%	74,8%	100%	10,7%	69,2%

Cuadro No. 76 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON EMBARAZO DURANTE EL TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Embarazo	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Si	2,4%		0,0%	0,0%	2,2%		2,6%	5,0%		12,5%	2,1%	3,6%	0,0%	2,3%
No	96,5%		94,7%	100,0%	93,3%		97,4%	95,0%		87,5%	97,9%	89,3%	100,0%	97,7%
No respuesta	1,1%		5,3%	0,0%	4,4%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	7,1%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 77 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN EDAD EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Edad de afluencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
5 a 9	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10 a 14	6,5%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	6,3%	14,3%	7,1%	12,3%
15 a 19	29,1%		47,4%	16,7%	17,8%		7,9%	20,0%		18,8%	34,5%	39,3%	39,3%	26,2%
20 a 24	22,4%		15,8%	33,3%	40,0%		28,9%	45,0%		37,5%	19,7%	17,9%	7,1%	16,9%
25 a 29	12,5%		0,0%	27,8%	13,3%		23,7%	10,0%		12,5%	11,8%	12,5%	7,1%	9,2%
30 a 34	7,7%		10,5%	5,6%	13,3%		18,4%	10,0%		18,8%	8,8%	0,0%	0,0%	3,8%
35 a 39	7,3%		10,5%	5,6%	2,2%		7,9%	10,0%		6,3%	7,1%	8,9%	17,9%	6,2%
40 a 44	3,7%		5,3%	0,0%	2,2%		10,5%	5,0%		6,3%	2,9%	3,6%	7,1%	3,1%
45 a 49	2,4%		0,0%	2,8%	4,4%		0,0%	0,0%		0,0%	2,1%	3,6%	0,0%	3,8%
50 a 54	3,7%		0,0%	8,3%	4,4%		0,0%	0,0%		0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	7,7%
55 a 59	2,2%		5,3%	0,0%	2,2%		2,6%	0,0%		0,0%	1,3%	0,0%	10,7%	3,8%
60 a 64	1,0%		5,3%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	3,6%	2,3%
65 a >	1,6%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	4,6%

Cuadro No. 78 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Residencia Estado	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Aguascalientes	0,3%		0,0%	0,0%	4,4%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Baja California	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Baja California Sur	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Campeche	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Coahuila	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Colima	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chiapas	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chihuahua	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ciudad de México	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Durango	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Guanajuato	0,2%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guerrero	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hidalgo	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%
Jalisco	95,7%		100,0%	100,0%	82,2%		92,1%	100,0%		100,0%	94,5%	98,2%	100,0%	98,5%
Estado de México	0,6%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Michoacán	1,1%		0,0%	0,0%	8,9%		5,3%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Morelos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nayarit	0,2%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nuevo León	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Oaxaca	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Puebla	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Querétaro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Quintana Roo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Luis Potosí	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sinaloa	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Sonora	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%
Tabasco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veracruz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Yucatán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacatecas	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 79 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio de Residencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Acatic	0,5%		0,0%	5,6%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Acatlán de Juárez	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Ahualulco del Mercado	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amacueca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amatitán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ameca	0,8%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
San Juanito de Escobedo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arandas	1,0%		0,0%	8,3%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
El Arenal	0,2%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atemajac de Brizuela	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atengo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atenguillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atotonilco el Alto	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atoyac	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Autlán de Navarro	3,7%		0,0%	0,0%	0,0%		13,2%	90,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ayotlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ayutla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
La Barca	0,6%		0,0%	2,8%	6,7%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bolaños	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cabo Corrientes	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Casimiro Castillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cihuatlán	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán El Grande	1,8%		0,0%	0,0%	0,0%		28,9%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cocula	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Colotlán	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Concepción de Buenos Aires	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuatitlán de García Barragán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 79 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio de Residencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Cuatla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuquío	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chapala	0,3%		0,0%	0,0%	4,4%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chimaltitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chiquilistlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Degollado	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ejutla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Encarnación de Díaz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Etzatlán	0,3%		0,0%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
El Grullo	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%		5,3%	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guachinango	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guadala-jara	23,2%		0,0%	11,1%	4,4%		2,6%	5,0%		6,3%	18,9%	5,4%	25,0%	62,3%
Hostotipaquillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejúcar	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejuquilla el Alto	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huerta	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ixtlahuacán de los Membrillos	0,3%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Ixtlahuacán del Río	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Jalostotitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jamay	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jesús María	0,3%		0,0%	5,6%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jilotlán de los Dolores	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jocotepec	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Juanacatlán	0,2%		0,0%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Juchitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lagos de Moreno	0,6%		5,3%	8,3%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
El Limón	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Magdalena	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Santa María del Oro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 79 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio de Residencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Manzanilla de la Paz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mascota	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Mexxicacán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mezquitic	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mixtlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ocotlán	2,1%		0,0%	0,0%	24,4%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,8%
Ojuelos de Jalisco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pihuamo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Poncitlán	0,8%		0,0%	0,0%	8,9%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Puerto Vallarta	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Purificación	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Quitupan	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
El Salto	0,6%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	7,1%	0,8%
San Cristóbal de la Barranca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Diego de Alejandría	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Juan de los Lagos	3,4%		94,7%	8,3%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Julián	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Marcos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Bolaños	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Hidalgo	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Miguel el Alto	0,6%		0,0%	8,3%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gómez Farías	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Sebastián del Oeste	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Santa María de los Ángeles	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sayula	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%		5,3%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%

Cuadro No. 79 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio de Residencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Tala	0,6%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		12,5%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Talpa de Allende	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tamazula de Gordiano	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tapalpa	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Tecalitlán	0,8%		0,0%	0,0%	0,0%		13,2%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Techaluta de Montenegro	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Tenamaxtlán	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocaltiche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocuitatlán de Corona	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tepatitlán de Morelos	1,8%		0,0%	19,4%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Tequila	0,8%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,8%
Teuchitlán	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tizapán el Alto	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlajomulco de Zúñiga	2,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	2,9%	0,0%	0,0%	4,6%
Tlaquepa-que	4,8%		0,0%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	4,2%	1,8%	46,4%	3,8%
Tolimán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tomatlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tonalá	10,7%		0,0%	2,8%	17,8%		0,0%	0,0%		0,0%	10,1%	26,8%	14,3%	11,5%
Tonaya	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Tonila	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Totatiche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tototlán	0,5%		0,0%	2,8%	4,4%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxcacuesco	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxcueca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxpan	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Unión de San Antonio	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 79 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio de Residencia	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Unión de Tula	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Guadalupe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Juárez	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Gabriel	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Corona	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Hidalgo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cañadas de Obregón	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Yahualica de González Gallo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacoalco de Torres	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapopan	26,4%		0,0%	8,3%	2,2%		0,0%	0,0%		12,5%	48,3%	62,5%	0,0%	6,9%
Zapotiltic	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		5,3%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotitlán de Vadillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán del Rey	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlanejo	0,6%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	1,8%	7,1%	0,0%
San Ignacio Cerro Gordo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Municipios de Otros Estados	4,3%		0,0%	0,0%	17,8%		7,9%	0,0%		0,0%	5,5%	1,8%	0,0%	1,5%

Cuadro No. 80 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Ocupación Principal	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Estudiante de tiempo completo	19,6%		21,1%	16,7%	6,7%		7,9%	15,0%		0,0%	18,9%	48,2%	21,4%	20,0%
Estudiante con actividad laboral	4,6%		15,8%	2,8%	0,0%		13,2%	5,0%		6,3%	4,2%	3,6%	3,6%	3,8%
Tiene empleo estable > 6 meses	19,3%		21,1%	25,0%	13,3%		28,9%	10,0%		18,8%	23,9%	12,5%	14,3%	13,8%
Tiene menos de 6 meses	12,1%		0,0%	5,6%	28,9%		7,9%	10,0%		25,0%	12,6%	17,9%	7,1%	7,7%
Desempleado (busca empleo)	7,0%		0,0%	2,8%	20,0%		2,6%	5,0%		0,0%	6,3%	0,0%	3,6%	12,3%
Desocupado (no busca empleo)	15,2%		0,0%	16,7%	6,7%		10,5%	25,0%		37,5%	16,0%	7,1%	17,9%	18,5%
Hogar	19,6%		31,6%	30,6%	24,4%		28,9%	25,0%		12,5%	17,6%	10,7%	25,0%	16,9%
Pensionado	0,8%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	3,1%
No aplica	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	0,8%
Otra	0,8%		10,5%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	5,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,8%

Cuadro No. 81 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Grado Máximo de Estudios	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Primaria	23,2%		21,1%	22,2%	33,3%		13,2%	10,0%		12,5%	23,5%	8,9%	28,6%	30,8%
Secundaria	44,7%		52,6%	30,6%	46,7%		36,8%	45,0%		62,5%	44,1%	62,5%	46,4%	40,0%
Escolaridad Técnica	3,0%		0,0%	2,8%	8,9%		2,6%	10,0%		0,0%	1,7%	1,8%	3,6%	3,8%
Bachillerato	17,7%		26,3%	41,7%	6,7%		23,7%	30,0%		25,0%	13,4%	23,2%	14,3%	15,4%
Licenciatura	8,1%		0,0%	2,8%	2,2%		18,4%	5,0%		0,0%	10,9%	3,6%	0,0%	10,0%
Maestría doctorado Especialidad	1,0%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%
No sabe leer ni escribir	1,1%		0,0%	0,0%	2,2%		2,6%	0,0%		0,0%	1,7%	0,0%	3,6%	0,0%
Sabe leer y escribir	1,1%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	2,5%	0,0%	3,6%	0,0%
No aplica	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
No responde	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 82 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ESTADO CIVIL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Estado Civil	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Soltero	66,0%		63,2%	55,6%	57,8%		52,6%	70,0%		75,0%	68,9%	76,8%	64,3%	64,6%
Casado	11,2%		21,1%	13,9%	15,6%		2,6%	5,0%		12,5%	10,9%	7,1%	21,4%	10,8%
Unión Libre	13,1%		15,8%	16,7%	13,3%		42,1%	20,0%		6,3%	11,3%	5,4%	3,6%	11,5%
Separado	5,6%		0,0%	11,1%	6,7%		2,6%	5,0%		0,0%	5,0%	5,4%	3,6%	7,7%
Divorciado	2,4%		0,0%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	2,5%	5,4%	3,6%	2,3%
Viudo	1,3%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	1,3%	0,0%	3,6%	2,3%
No aplica	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,5%		0,0%	0,0%	4,4%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%

Cuadro No. 83 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON ANTECEDENTE DE BÚSQUEDA DE APOYO PARA TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Búsqueda de Apoyo	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Primera vez en el año	73,5%		63,2%	72,2%	71,1%		73,7%	75,0%		75,0%	70,2%	89,3%	67,9%	76,2%
Ya había acudido en este año	26,5%		36,8%	27,8%	28,9%		26,3%	25,0%		25,0%	29,8%	10,7%	32,1%	23,8%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 84 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE ACUDE A TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Número de veces	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Primera Vez	73,5%		63,2%	72,2%	71,1%		73,7%	75,0%		75,0%	70,2%	89,3%	67,9%	76,2%
2 a 4	22,8%		31,6%	25,0%	11,1%		23,7%	20,0%		25,0%	26,9%	8,9%	28,6%	22,3%
5 a >	3,7%		5,3%	2,8%	17,8%		2,6%	5,0%		0,0%	2,9%	1,8%	3,6%	1,5%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 85 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN FORMA DE ACUDIR A TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Forma que acude al centro	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Voluntariamente	55,1%		47,4%	97,2%	20,0%		15,8%	75,0%		18,8%	59,2%	76,8%	57,1%	52,3%
Indicación médica no psiquiátrica	4,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	5,0%		0,0%	2,1%	0,0%	3,6%	15,4%
Indicación médica psiquiátrica	2,7%		0,0%	0,0%	11,1%		2,6%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	7,1%	6,2%
Lo llevaron amigos o familiares	27,6%		5,3%	2,8%	48,9%		57,9%	5,0%		81,3%	31,9%	10,7%	21,4%	19,2%
Indicación Legal	3,7%		10,5%	0,0%	15,6%		21,1%	0,0%		0,0%	0,8%	1,8%	3,6%	1,5%
Escuela o trabajo	3,8%		10,5%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	3,8%	10,7%	3,6%	4,6%
Otra (s)	1,8%		26,3%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	1,7%	0,0%	3,6%	0,8%
No sabe	0,5%		0,0%	0,0%	4,4%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	15,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 86 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN DROGA DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Drogas de inicio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Alcohol	39,1%		52,6%	52,8%	24,4%		39,5%	60,0%		50,0%	37,8%	51,8%	32,1%	32,3%
Marihuana	14,1%		5,3%	2,8%	15,6%		10,5%	10,0%		12,5%	16,0%	5,4%	14,3%	20,0%
Inhalantes	4,3%		5,3%	0,0%	4,4%		0,0%	5,0%		0,0%	6,7%	3,6%	3,6%	3,1%
Alucinógenos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Heroína	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Opio/Morfina	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Cocaína	1,4%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		12,5%	1,3%	5,4%	0,0%	0,8%
Tranquilizantes	2,1%		0,0%	5,6%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	3,8%
Barbitúricos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anfetaminas	0,3%		5,3%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Anticolinérgicos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tabaco	33,2%		26,3%	38,9%	31,1%		34,2%	25,0%		18,8%	32,4%	33,9%	46,4%	34,6%
Antidepresivos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros Psicotrópicos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pasta Base	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Metanfetamina Cristal	4,8%		0,0%	0,0%	22,2%		15,8%	0,0%		6,3%	2,9%	0,0%	3,6%	3,8%
Flunitracepam	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Crack	0,3%		5,3%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Refractilofeno	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 87 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN EDAD DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Edad de Inicio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
5 a 9	6,1%		15,8%	0,0%	2,2%		0,0%	10,0%		6,3%	6,7%	7,1%	7,1%	6,9%
10 a 14	50,3%		52,6%	55,6%	24,4%		31,6%	55,0%		43,8%	54,2%	55,4%	50,0%	53,8%
15 a 19	32,9%		21,1%	41,7%	42,2%		44,7%	35,0%		37,5%	31,5%	32,1%	28,6%	28,5%
20 a 24	5,9%		5,3%	2,8%	24,4%		18,4%	0,0%		6,3%	2,9%	5,4%	7,1%	3,1%
25 a 29	1,9%		5,3%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	2,5%	0,0%	7,1%	1,5%
30 a 34	1,3%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	3,1%
35 a 39	0,5%		0,0%	0,0%	2,2%		2,6%	0,0%		6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
40 a 44	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	1,5%
45 a 49	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
50 a 54	0,3%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
55 a 59	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60 a 64	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65 a >	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 88 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Drogas de impacto	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Alcohol	18,1%		31,6%	19,4%	22,2%		28,9%	15,0%		6,3%	13,9%	42,9%	3,6%	13,1%
Marihuana	15,3%		10,5%	11,1%	11,1%		5,3%	10,0%		12,5%	17,2%	14,3%	21,4%	18,5%
Inhalantes	3,7%		0,0%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	7,6%	0,0%	0,0%	3,1%
Alucinógenos	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,8%
Heroína	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Opio/Morfina	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Cocaína	3,8%		0,0%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	5,5%	5,4%	14,3%	2,3%
Tranquilizantes	3,2%		0,0%	8,3%	2,2%		0,0%	0,0%		6,3%	3,8%	0,0%	0,0%	4,6%
Barbitúricos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anfetaminas	1,1%		26,3%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Anticolinérgicos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tabaco	8,0%		21,1%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	6,3%	10,7%	21,4%	14,6%
Antidepresivos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros Psicotrópicos	0,2%		0,0%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pasta Base	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Metanfetamina Cristal	43,3%		5,3%	52,8%	64,4%		65,8%	75,0%		75,0%	40,3%	26,8%	39,3%	36,9%
Flunitracepam	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Crack	2,2%		5,3%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	6,2%
Refractil ofteno	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 89 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ESTADO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Estado	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Aguascalientes	0,3%		0,0%	0,0%	4,4%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Baja California	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Baja California Sur	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Campeche	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Coahuila	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Colima	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chiapas	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chihuahua	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ciudad de México	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Durango	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Guanajuato	0,2%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guerrero	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hidalgo	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%
Jalisco	95,7%		100,0%	100,0%	82,2%		86,8%	100,0%		100,0%	95,8%	96,4%	100,0%	98,5%
Estado de México	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Michoacán	1,3%		0,0%	0,0%	8,9%		7,9%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Morelos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nayarit	0,2%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nuevo León	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Oaxaca	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Puebla	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Querétaro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Quintana Roo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Luis Potosí	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sinaloa	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Sonora	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Tabasco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tamaulipas	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlaxcala	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacatecas	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otro País	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 90 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Acatic	0,5%		0,0%	5,6%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Acatlán de Juárez	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Ahualulco del Mercado	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amacueca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amatitán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ameca	0,8%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
San Juanito de Escobedo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arandas	1,0%		0,0%	8,3%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
El Arenal	0,2%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atemajac de Brizuela	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atengo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atenguillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atotonilco el Alto	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atoyac	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Autlán de Navarro	3,5%		0,0%	0,0%	0,0%		10,5%	85,0%		0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%
Ayotlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ayutla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
La Barca	0,6%		0,0%	2,8%	6,7%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bolaños	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cabo Corrientes	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Casimiro Castillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cihuatlán	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán El Grande	1,6%		0,0%	0,0%	0,0%		26,3%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cocula	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Colotlán	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Concepción de Buenos Aires	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuatitlán de García Barragán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 90 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Cuautla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuquío	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chapala	0,3%		0,0%	0,0%	4,4%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chimaltitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chiquilistlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Degollado	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ejutla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Encarnación de Díaz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Etzatlán	0,3%		0,0%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
El Grullo	0,6%		0,0%	0,0%	0,0%		5,3%	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guachinango	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guadala-jara	22,2%		0,0%	8,3%	4,4%		0,0%	5,0%		6,3%	17,2%	5,4%	25,0%	62,3%
Hostotipaquillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejúcar	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejuquilla el Alto	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
La Huerta	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ixtlahuacán de los Membrillos	0,3%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Ixtlahuacán del Río	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Jalostotitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jamay	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jesús María	0,3%		0,0%	5,6%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jilotlán de los Dolores	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jocotepec	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Juanacatlán	0,2%		0,0%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Juchitlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lagos de Moreno	0,6%		5,3%	8,3%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
El Limón	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Magdalena	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Santa María del Oro	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 90 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Manzanilla de la Paz	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mascota	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Mazamitla	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mexxicacán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mezquitic	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mixtlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ocotlán	2,1%		0,0%	0,0%	24,4%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,8%
Ojuelos de Jalisco	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pihuamo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Poncitlán	0,6%		0,0%	0,0%	8,9%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Puerto Vallarta	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Purificación	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Quitupan	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
El Salto	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	3,6%	0,8%
San Cristóbal de la Barranca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Diego de Alejandría	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Juan de los Lagos	3,2%		89,5%	8,3%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Julián	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Marcos	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Bolaños	0,2%		5,3%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Hidalgo	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Miguel el Alto	0,6%		0,0%	8,3%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gómez Farías	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Sebastián del Oeste	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Santa María de los Ángeles	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sayula	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%		5,3%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%

Cuadro No. 90 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Tala	0,6%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		12,5%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Talpa de Allende	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tamazula de Gordiano	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tapalpa	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Tecalitlán	1,0%		0,0%	0,0%	0,0%		15,8%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tecolotlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Techaluta de Montenegro	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Tenamaxtlán	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocaltiche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocuitatlán de Corona	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tepatitlán de Morelos	1,8%		0,0%	19,4%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Tequila	0,8%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,8%
Teuchitlán	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tizapán el Alto	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlajomulco de Zúñiga	2,6%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		6,3%	3,4%	0,0%	3,6%	4,6%
Tlaquepa-que	5,3%		0,0%	5,6%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	4,2%	3,6%	50,0%	3,8%
Tolimán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tomatlán	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tonalá	9,3%		0,0%	2,8%	17,8%		0,0%	0,0%		0,0%	8,4%	19,6%	7,1%	12,3%
Tonaya	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Tonila	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Totatiche	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tototlán	0,5%		0,0%	2,8%	4,4%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxcacuesco	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxcueca	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tuxpan	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 90 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Municipio	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Unión de San Antonio	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Unión de Tula	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Guadalupe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle de Juárez	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Gabriel	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Corona	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Guerrero	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Hidalgo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cañadas de Obregón	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Yahualica de González Gallo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacoalco de Torres	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapopan	28,3%		0,0%	8,3%	2,2%		0,0%	0,0%		12,5%	52,9%	64,3%	0,0%	6,9%
Zapotiltic	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		5,3%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotitlán de Vadillo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán del Rey	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlanejo	0,6%		0,0%	0,0%	2,2%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	1,8%	7,1%	0,0%
San Ignacio Cerro Gordo	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Municipios de Otros Estados	4,5%		0,0%	0,0%	17,8%		13,2%	0,0%		0,0%	4,2%	3,6%	3,6%	1,5%

Cuadro No. 91 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON USO DE DROGAS INYECTADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Uso de drogas inyectadas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Si	4,0%		0,0%	11,1%	4,4%		5,3%	0,0%		6,3%	4,2%	0,0%	3,6%	3,8%
No	96,0%		100,0%	88,9%	95,6%		94,7%	100,0%		93,8%	95,8%	100,0%	96,4%	96,2%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 92 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE COMPARTE JERINGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Ha compartido jeringas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tlaquepaque	Tonalá	Guadalajara
	25	0	0	4	2	0	2	0	0	1	10	1	0	5
Si	76,0%			75,0%	100,0%		50,0%			100,0%	100,0%		0,0%	40,0%
No	24,0%			25,0%	0,0%		50,0%			0,0%	0,0%		100,0%	60,0%
No sabe	0,0%			0,0%	0,0%		0,0%			0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
No responde	0,0%			0,0%	0,0%		0,0%			0,0%	0,0%		0,0%	0,0%

Cuadro No. 93 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS USO DE JERINGA SIN USO PREVIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Usa jeringa sin uso previo	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	25	0	0	4	2	0	2	0	0	1	10	1	0	5
Si	16,0%			25,0%	100,0%		0,0%			0,0%	10,0%		0,0%	0,0%
No	84,0%			75,0%	0,0%		100,0%			100,0%	90,0%		100,0%	100,0%
No sabe	0,0%			0,0%	0,0%		0,0%			0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
No responde	0,0%			0,0%	0,0%		0,0%			0,0%	0,0%		0,0%	0,0%

Cuadro No. 94 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE CONSUME DROGAS COMBINADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Combina Drogas	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Si	54,3%		47,4%	86,1%	28,9%		42,1%	55,0%		50,0%	70,2%	17,9%	39,3%	49,2%
No	45,7%		52,6%	13,9%	71,1%		57,9%	45,0%		50,0%	29,8%	82,1%	60,7%	50,8%

Cuadro No. 95 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE HAN CONDUCIDO BAJO EFECTO DE DROGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Conducción bajo efecto de drogas	Estatad	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Si	25,1%		26,3%	38,9%	53,3%		47,4%	35,0%		25,0%	24,8%	16,1%	3,6%	12,3%
No	66,8%		68,4%	50,0%	44,4%		34,2%	50,0%		62,5%	68,1%	69,6%	82,1%	84,6%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	8,1%		5,3%	11,1%	2,2%		18,4%	15,0%		12,5%	7,1%	14,3%	14,3%	3,1%

Cuadro No. 96 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ASOCIADA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Padece alguna enfermedad	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
Si	9,6%		0,0%	16,7%	0,0%		26,3%	10,0%		6,3%	10,5%	3,6%	0,0%	10,8%
No	90,4%		100,0%	83,3%	100,0%		73,7%	90,0%		93,8%	89,5%	96,4%	100,0%	89,2%

Cuadro No. 97 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS LUGAR DONDE CONSIGUE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Lugar donde consigue la droga de impacto	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
En su propia casa	14,5%		10,5%	11,1%	8,9%		2,6%	20,0%		12,5%	12,2%	35,7%	14,3%	16,2%
Se la llevan a su casa	7,8%		0,0%	13,9%	2,2%		7,9%	25,0%		12,5%	5,5%	16,1%	10,7%	6,2%
En casa de un amigo o familiar	12,9%		15,8%	19,4%	11,1%		18,4%	10,0%		6,3%	13,9%	3,6%	14,3%	13,1%
En la calle	29,7%		5,3%	19,4%	31,1%		7,9%	5,0%		62,5%	36,6%	25,0%	17,9%	33,8%
En antros y bares	1,4%		0,0%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	2,1%	3,6%	0,0%	0,8%
En fiestas y reuniones	5,0%		15,8%	5,6%	0,0%		0,0%	5,0%		0,0%	6,3%	7,1%	3,6%	3,8%
En la escuela	0,5%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	7,1%	0,8%
En el trabajo	2,2%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	5,0%		0,0%	3,8%	0,0%	0,0%	2,3%
En tiendas cercanas a mi casa	17,4%		47,4%	25,0%	20,0%		44,7%	0,0%		6,3%	13,9%	7,1%	28,6%	14,6%
Parques	0,6%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,8%
Picaderos	6,1%		0,0%	0,0%	26,7%		7,9%	30,0%		0,0%	4,2%	1,8%	0,0%	4,6%
Otro	0,6%		5,3%	2,8%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%
No sabe	0,3%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%
No responde	0,8%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	0,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	1,5%

Cuadro No. 98 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS LUGAR DONDE CONSUME, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

Lugar donde consume la droga de impacto	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepaque	Guadalajara
	626	0	19	36	45	0	38	20	0	16	238	56	28	130
La tiene en su casa	35,6%		57,9%	58,3%	15,6%		36,8%	35,0%		25,0%	31,9%	21,4%	50,0%	43,8%
En casa de un amigo o familiar	22,8%		15,8%	22,2%	20,0%		39,5%	20,0%		25,0%	21,8%	30,4%	10,7%	21,5%
En la vía pública (calles, parques)	22,5%		5,3%	5,6%	28,9%		13,2%	10,0%		43,8%	27,3%	19,6%	25,0%	21,5%
En antros y bares	4,5%		0,0%	8,3%	17,8%		0,0%	0,0%		0,0%	1,7%	10,7%	3,6%	4,6%
En fiestas y reuniones	7,2%		15,8%	0,0%	0,0%		5,3%	5,0%		6,3%	10,9%	16,1%	3,6%	1,5%
En la escuela	1,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,8%	1,8%	3,6%	1,5%
En el trabajo	2,1%		5,3%	0,0%	6,7%		2,6%	5,0%		0,0%	2,5%	0,0%	0,0%	0,8%
En picaderos	2,7%		0,0%	0,0%	11,1%		0,0%	15,0%		0,0%	2,1%	0,0%	3,6%	2,3%
Otro	0,8%		0,0%	5,6%	0,0%		0,0%	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%
No sabe	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No responde	0,8%		0,0%	0,0%	0,0%		2,6%	5,0%		0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,8%

Cuadro No. 99 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

ALCOHOL	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	113	0	6	7	10	0	11	3	0	1	33	24	1	17
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	70,8%		100,0%	85,7%	60,0%		45,5%	100,0%		100,0%	63,6%	87,5%		64,7%
Menor efecto que antes	55,8%		100,0%	71,4%	10,0%		18,2%	100,0%			57,6%	79,2%		47,1%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	54,0%		100,0%	57,1%	10,0%		27,3%	100,0%			66,7%	58,3%		47,1%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	61,9%		83,3%	71,4%	60,0%		36,4%	33,3%		100,0%	57,6%	83,3%		52,9%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	39,8%		83,3%	42,9%	10,0%			33,3%			51,5%	50,0%		35,3%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	68,1%		83,3%	71,4%	60,0%		90,9%	66,7%		100,0%	63,6%	66,7%		64,7%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	43,4%		83,3%	42,9%	10,0%		54,5%	33,3%			51,5%	41,7%		35,3%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	61,1%		66,7%	71,4%	60,0%		45,5%	100,0%		100,0%	60,6%	66,7%		52,9%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	38,1%		83,3%	57,1%			18,2%	100,0%			39,4%	41,7%		35,3%

Cuadro No. 99 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

ALCOHOL	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	113	0	6	7	10	0	11	3	0	1	33	24	1	17
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	44,2%		66,7%		60,0%		18,2%			100,0%	42,4%	70,8%		35,3%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	36,3%		66,7%	42,9%			45,5%				45,5%	41,7%		23,5%
Descuido de actividades	44,2%		66,7%	57,1%	30,0%		36,4%	33,3%			57,6%	41,7%		29,4%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	36,3%		66,7%		40,0%		27,3%	66,7%			36,4%	54,2%		17,6%
Continuó usando a pesar de esos problemas	27,4%		66,7%		30,0%		9,1%	66,7%			33,3%	29,2%		17,6%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	64,6%		66,7%	71,4%	60,0%		45,5%	100,0%		100,0%	78,8%	62,5%		47,1%
Continúa usando a pesar de esos problemas	54,9%		66,7%	71,4%	50,0%		54,5%	100,0%		100,0%	75,8%	29,2%		35,3%

Cuadro No. 101 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

MARIHUANA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	96	0	2	4	5	0	2	2	0	2	41	8	6	24
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	59,4%		100,0%	100,0%	80,0%			100,0%		50,0%	46,3%	100,0%	66,7%	54,2%
Menor efecto que antes	46,9%		100,0%	100,0%				100,0%		50,0%	36,6%	87,5%	66,7%	41,7%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	40,6%		100,0%	100,0%				100,0%			34,1%	87,5%	50,0%	29,2%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	44,8%		100,0%	100,0%	80,0%			100,0%			34,1%	25,0%	33,3%	54,2%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	32,3%		100,0%	75,0%				100,0%		50,0%	29,3%	37,5%	66,7%	16,7%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	62,5%		50,0%	75,0%	80,0%		100,0%	100,0%		100,0%	61,0%	50,0%	33,3%	62,5%
Ha consumido cantidad y tiempo del que pensaba	50,0%		100,0%	75,0%				100,0%			43,9%	75,0%	66,7%	54,2%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	41,7%		100,0%	50,0%	80,0%			50,0%		100,0%	34,1%	25,0%	66,7%	37,5%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	30,2%		100,0%	100,0%				50,0%			24,4%	62,5%	50,0%	16,7%

Cuadro No. 101 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

MARIHUANA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	96	0	2	4	5	0	2	2	0	2	41	8	6	24
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	33,3%		100,0%	50,0%	80,0%			50,0%			24,4%	25,0%	50,0%	33,3%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	28,1%		100,0%	100,0%				50,0%			26,8%	62,5%	50,0%	4,2%
Descuido de actividades	40,6%		100,0%	100,0%			50,0%	100,0%		50,0%	41,5%	62,5%	33,3%	20,8%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	34,4%		100,0%	75,0%	20,0%		50,0%	50,0%			29,3%	37,5%	50,0%	29,2%
Continuó usando a pesar de esos problemas	32,3%		100,0%	75,0%	20,0%			50,0%			31,7%	50,0%	16,7%	25,0%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	56,3%		100,0%	100,0%	60,0%		50,0%	100,0%		50,0%	56,1%	50,0%	83,3%	37,5%
Continúa usando a pesar de esos problemas	44,8%		100,0%	75,0%	60,0%		50,0%	100,0%		50,0%	48,8%	12,5%	50,0%	29,2%

Cuadro No. 103 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

INHALANTES	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	23	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	0	0	4
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	95,7%			100,0%							94,4%			100,0%
Menor efecto que antes	52,2%										44,4%			100,0%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	47,8%										38,9%			100,0%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	56,5%										61,1%			50,0%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	26,1%										16,7%			75,0%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	73,9%										83,3%			50,0%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	47,8%										50,0%			50,0%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	82,6%			100,0%							77,8%			100,0%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	34,8%			100,0%							22,2%			75,0%

Cuadro No. 103 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

INHALANTES	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	23	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	0	0	4
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	56,5%			100,0%							66,7%			
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	47,8%										50,0%			50,0%
Descuido de actividades	56,5%			100,0%							55,6%			50,0%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	43,5%										38,9%			75,0%
Continuó usando a pesar de esos problemas	34,8%										27,8%			75,0%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	78,3%			100,0%							72,2%			100,0%
Continúa usando a pesar de esos problemas	73,9%			100,0%							66,7%			100,0%

Cuadro No. 105 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

COCAÍNA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	3	4	3
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	70,8%			100,0%							53,8%	100,0%	75,0%	100,0%
Menor efecto que antes	54,2%			100,0%							38,5%	100,0%	75,0%	33,3%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	58,3%			100,0%							38,5%	100,0%	75,0%	66,7%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	41,7%										46,2%	33,3%	25,0%	66,7%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	25,0%										23,1%		50,0%	33,3%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	66,7%			100,0%							53,8%	100,0%	100,0%	33,3%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	45,8%										30,8%	66,7%	75,0%	66,7%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	58,3%										38,5%	100,0%	75,0%	100,0%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	37,5%										23,1%		75,0%	100,0%

Cuadro No. 105 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

COCAÍNA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	3	4	3
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	37,5%										23,1%	100,0%	50,0%	33,3%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	33,3%										38,5%		25,0%	66,7%
Descuido de actividades	45,8%			100,0%							30,8%	33,3%	50,0%	100,0%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	25,0%										23,1%	33,3%	25,0%	33,3%
Continuó usando a pesar de esos problemas	20,8%										15,4%		25,0%	66,7%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	66,7%			100,0%							69,2%	33,3%	50,0%	100,0%
Continúa usando a pesar de esos problemas	50,0%			100,0%							53,8%	33,3%		100,0%

Cuadro No. 107 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

TABACO	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	50	0	4	0	0	0	0	0	0	0	15	6	6	19
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	56,0%		100,0%								66,7%	83,3%	66,7%	26,3%
Menor efecto que antes	46,0%		100,0%								33,3%	100,0%	66,7%	21,1%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	42,0%		100,0%								26,7%	83,3%	66,7%	21,1%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	38,0%		100,0%								46,7%	33,3%	33,3%	21,1%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	40,0%		100,0%								26,7%	66,7%	66,7%	21,1%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	46,0%		100,0%								66,7%	33,3%	50,0%	21,1%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	32,0%		100,0%								33,3%	33,3%	33,3%	15,8%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	34,0%		100,0%								33,3%	50,0%	33,3%	15,8%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	26,0%		75,0%								20,0%	33,3%	50,0%	10,5%

Cuadro No. 107 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

TABACO	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	50	0	4	0	0	0	0	0	0	0	15	6	6	19
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	34,0%		100,0%								26,7%	83,3%	33,3%	10,5%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	20,0%		100,0%								6,7%	33,3%	33,3%	5,3%
Descuido de actividades	24,0%		100,0%								13,3%	16,7%	33,3%	15,8%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	30,0%		100,0%								26,7%	50,0%	16,7%	15,8%
Continuó usando a pesar de esos problemas	30,0%		100,0%								26,7%	50,0%	16,7%	15,8%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	36,0%		100,0%								40,0%	66,7%	16,7%	15,8%
Continúa usando a pesar de esos problemas	26,0%		100,0%								33,3%		33,3%	10,5%

Cuadro No. 109 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

METANFETAMINA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	271	0	1	19	29	0	25	15	0	12	96	15	11	48
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	76,8%			78,9%	82,8%		60,0%	93,3%		91,7%	74,0%	93,3%	81,8%	72,9%
Menor efecto que antes	45,0%			73,7%	10,3%		44,0%	86,7%			45,8%	93,3%	72,7%	31,3%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	41,3%			84,2%	17,2%		40,0%	86,7%			41,7%	86,7%	45,5%	20,8%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	66,8%			73,7%	65,5%		68,0%	80,0%		83,3%	67,7%	66,7%	63,6%	56,3%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	34,7%			68,4%	13,8%		32,0%	80,0%			35,4%	60,0%	63,6%	14,6%
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	77,1%			100,0%	69,0%		92,0%	73,3%		100,0%	76,0%	73,3%	72,7%	66,7%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	39,5%			52,6%	10,3%		36,0%	46,7%			50,0%	53,3%	54,5%	33,3%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	70,5%			89,5%	82,8%		44,0%	73,3%		75,0%	68,8%	73,3%	81,8%	68,8%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	35,1%			47,4%	6,9%		44,0%	73,3%		8,3%	33,3%	60,0%	72,7%	25,0%

Cuadro No. 109 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

METANFETAMINA	General	Colotlán	Lagos de Moreno	Tepatitlán	La Barca	Tamazula	Zapotlán	Autlán	Vallarta	Ameca	Zapopan	Tonalá	Tlaquepa-que	Guadala-jara
	271	0	1	19	29	0	25	15	0	12	96	15	11	48
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	54,6%			63,2%	69,0%		36,0%	46,7%		58,3%	54,2%	73,3%	36,4%	54,2%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	36,9%			73,7%			48,0%	60,0%		16,7%	39,6%	46,7%	36,4%	29,2%
Descuido de actividades	49,8%			89,5%	6,9%		56,0%	86,7%		41,7%	54,2%	60,0%	81,8%	29,2%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	49,4%			21,1%	37,9%		36,0%	46,7%		75,0%	56,3%	53,3%	54,5%	54,2%
Continuó usando a pesar de esos problemas	45,8%			21,1%	13,8%		28,0%	53,3%		41,7%	54,2%	66,7%	63,6%	56,3%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	77,5%			100,0%	72,4%		72,0%	86,7%		91,7%	78,1%	60,0%	81,8%	72,9%
Continúa usando a pesar de esos problemas	74,2%			100,0%	51,7%		84,0%	93,3%		58,3%	77,1%	66,7%	81,8%	66,7%

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ADICCIONES
SISVEA 2017

INDICADOR: Puesto Centinela De Urgencias

Este indicador del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones tiene el objetivo de conocer el porcentaje de personas que acuden a un Servicio Médico de Urgencias que ingresan por algún padecimiento médico o lesión de causa externa.

Se aplica en dos semanas durante el año en los meses de junio y noviembre del 2017.

En este año se registró una participación moderada por los servicios médicos de urgencias, la muestra se analizará en forma numérica y se describirán en proporciones porcentuales a través de las variables que se encuentran en la cédula, la cual fue modificada en marzo del 2017, se aplicó por personal médico de cada una de las Unidades de Urgencias.

El instrumento contiene las siguientes secciones y variables:

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

- Fecha de elaboración del instrumento.
- Edad del paciente.
- Entidad de residencia y municipio de residencia.
- Fecha de nacimiento.
- Edad.
- Sexo y en el caso del femenino se pregunta si hay embarazo.
- Nombre aunque no se utilizará para ningún fin, solo de tipo estadístico.

OCUPACIÓN PRINCIPAL DEL PACIENTE

- Estudiante de tiempo completo.
- Estudiante con actividad laboral.
- Tiene empleo estable en más de 6 meses.
- Tiene menos de 6 meses en el actual empleo.
- Desempleado (busca empleo).
- Desocupado (no busca empleo).
- Hogar.
- Pensionado.
- No aplica.
- Otra.
- No sabe.
- No responde.

GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS

- Primaria.
- Secundaria.
- Escolaridad técnica.
- Bachillerato.
- Licenciatura.
- Maestría / Doctorado / Especialidad.
- No sabe leer ni escribir.
- Sabe leer y escribir.
- No aplica.
- No sabe.
- No responde.

ESTADO CIVIL

- Soltero.
- Casado.
- Unión Libre.

- Separado.
- Divorciado.
- Viudo.
- No aplica.
- No sabe.
- No responde.

La ubicación de la Unidad de Urgencias por Región o Jurisdicción Sanitaria

I Colotlán

II Lagos de Moreno

III Tepatitlán

IV La Barca

V Tamazula de Gordiano

VI Zapotlán el Grande

VII Autlán de Navarro

VIII Puerto Vallarta

IX Ameca

X Zapopan

XI Tonalá

XII Tlaquepaque

XIII Guadalajara

Se utiliza las claves del INEGI de los 32 Estados y 125 municipios de Jalisco.

CONSUMO DE SUSTANCIAS

Se observa si clínicamente el paciente llegó bajo efecto de alguna sustancia o droga y se pregunta si o no. En el caso de que la respuesta sea afirmativa se anotan cuales fueron, dando oportunidad hasta 5 drogas.

Si llegó por **Lesión de Causa Externa** se toman las siguientes variables:

Atropellado, accidente automovilístico, caída, trauma por objeto contundente o persona, aplastamiento, proyectil de arma de fuego, objetos punzocortantes o punzocontundentes, maquinaria, piquete o mordedura, quemaduras por fuego o quemadura química, sustancias líquidas, solidas o gaseosas, corriente eléctrica, asfixia o sofocación, intoxicación o envenenamiento, sustancias, vapor u objetos calientes, congelamiento, sobredosis accidental, sobredosis autoinflingida (suicidio) y envenenamiento suicida.

LUGAR DONDE OCURRE LA LESIÓN

Hogar, escuela, vía pública, sitio de recreación, trabajo, otro y se desconoce.

Si el Ingreso a Urgencias es por **patología de base** se toma los siguientes rubros:

Bronquitis/enfisema/asma, cáncer de tráquea/bronquios/pulmón, enfermedades del corazón, hipertensión, afección neurológica, cirrosis / gastritis, urgencias quirúrgicas, psicosis alcohólica/sustancias (drogas).

Consumo de algún tipo de sustancia(s), droga(s) incluyendo alcohol y tabaco.

PATRÓN DE CONSUMO

Si el paciente refiere consumir alguna sustancia se preguntará en orden cronológico desde la droga de inicio a un total de diez drogas, preguntando consumo durante el último año, edad en que la usó, forma de administración, patrón de consumo actual y el número de veces en el consumo.

Las **formas de administración** se toman las siguientes variables:

Fumada, inhalada, intranasal (esnifada), inyectada, tópica, otras mucosas, ingerida, masticada, otra vía, no sabe o no responde.

Consumo actual es el patrón diario, semanal, mensual y anual, así como el número de veces que la consume.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Cuadro No. 1 PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS POR REGIÓN SANITARIA, GENERAL Y SEXO			
Región Sanitaria	General	Hombres	Mujeres
	432	239	193
Colotlán	28,7%	20,1%	39,4%
Lagos de Moreno	0,9%	1,3%	0,5%
Tepatitlán de Morelos	27,5%	27,6%	27,5%
La Barca	3,9%	3,3%	4,7%
Tamazula	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán	1,9%	2,5%	1,0%
Autlán de Navarro	3,5%	4,2%	2,6%
Puerto Vallarta	0,0%	0,0%	0,0%
Ameca	6,9%	6,7%	7,3%
Zapopan	11,6%	17,6%	4,1%
Tonalá	0,0%	0,0%	0,0%
Tlaquepaque	0,0%	0,0%	0,0%
Guadalajara	15,0%	16,7%	13,0%

Cuadro No. 2 EDAD EN QUE ACUDE A SOLICITAR UN SERVICIO DE URGENCIAS			
Edad	General	Hombres	Mujeres
	432	239	193
5 a 9	2,3%	2,9%	1,6%
10 a 14	2,5%	3,8%	1,0%
15 a 19	10,0%	10,0%	9,8%
20 a 24	16,0%	15,5%	16,6%
25 a 29	12,5%	13,8%	10,9%
30 a 34	9,0%	10,5%	7,3%
35 a 39	7,2%	6,3%	8,3%
40 a 44	8,1%	10,0%	5,7%
45 a 49	6,5%	6,7%	6,2%
50 a 54	7,2%	4,6%	10,4%
55 a 59	4,9%	4,2%	5,7%
60 a 64	3,5%	1,7%	5,7%
65 a >	10,4%	10,0%	10,9%
S/D	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 3 ESTADO DE RESIDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y POR SEXO			
Residencia Estado	General	Hombres	Mujeres
	432	239	193
Baja California Norte	0,2%	0,4%	0,0%
Jalisco	98,6%	98,7%	98,4%
Zacatecas	1,2%	0,8%	1,6%
Otro país	0,0%	0,0%	0,0%

**Cuadro No. 4 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS,
GENERAL Y POR SEXO**

Municipio de Residencia	General	Hombres	Mujeres
	432	239	193
Acatic	0,2%	0,4%	0,0%
Ameca	6,7%	6,3%	7,3%
Arandas	1,4%	2,5%	0,0%
Autlán de Navarro	3,2%	4,2%	2,1%
Bolaños	1,2%	1,7%	0,5%
Cabo Corrientes	0,5%	0,8%	0,0%
Cihuatlán	0,2%	0,0%	0,5%
Zapotlán El Grande	1,4%	1,7%	1,0%
Cocula	0,2%	0,4%	0,0%
Colotlán	18,8%	11,7%	27,5%
El Grullo	0,2%	0,0%	0,5%
Guadalajara	10,9%	12,1%	9,3%
Huejúcar	0,5%	0,8%	0,0%
Huejuquilla el Alto	4,4%	2,5%	6,7%
Ixtlahuacán del Río	0,2%	0,4%	0,0%
Jamay	0,2%	0,0%	0,5%
Mezquitic	0,5%	0,0%	1,0%
Ocotlán	2,5%	2,1%	3,1%
Poncitlán	0,9%	0,8%	1,0%
El Salto	0,5%	0,4%	0,5%
San Juan de los Lagos	0,9%	1,3%	0,5%
Santa María de los Ángeles	0,7%	0,8%	0,5%
Tala	0,2%	0,4%	0,0%
Tamazula de Gordiano	0,2%	0,4%	0,0%
Tepatitlán de Morelos	25,9%	24,7%	27,5%
Tlajomulco de Zúñiga	0,7%	1,3%	0,0%
Tlaquepaque	1,2%	1,7%	0,5%
Totatiche	0,5%	0,4%	0,5%
Villa Guerrero	0,7%	0,8%	0,5%
Zapopan	13,0%	18,0%	6,7%
Municipios de otros Estados	1,4%	1,3%	1,6%

Cuadro No. 5 GRADO MÁXIMO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y POR SEXO

Grado Máximo de Estudios	General	Hombres	Mujeres
	432	239	193
Primaria	27,8%	27,6%	28,0%
Secundaria	27,3%	29,7%	24,4%
Escolaridad Técnica	3,7%	2,5%	5,2%
Bachillerato	19,4%	19,2%	19,7%
Licenciatura	13,4%	13,0%	14,0%
Maestría/doctorado/Especialidad	0,7%	0,4%	1,0%
No sabe leer ni escribir	3,5%	4,2%	2,6%
Sabe leer y escribir	3,0%	1,7%	4,7%
No aplica	0,5%	0,8%	0,0%
No sabe	0,5%	0,4%	0,5%
No responde	0,2%	0,4%	0,0%

Cuadro No. 6 OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y POR SEXO

Ocupación Principal	General	Hombres	Mujeres
	432	239	193
Estudiante de tiempo completo	11,3%	11,7%	10,9%
Estudiante con actividad laboral	5,3%	5,4%	5,2%
Tiene empleo estable > 6 meses	41,4%	53,1%	26,9%
Tiene menos de 6 meses	6,0%	7,5%	4,1%
Desempleado (busca empleo)	3,5%	5,4%	1,0%
Desocupado (no busca empleo)	2,8%	4,2%	1,0%
Hogar	21,5%	0,4%	47,7%
Pensionado	3,7%	5,9%	1,0%
No aplica	1,4%	1,7%	1,0%
Otra	2,5%	4,2%	0,5%
No sabe	0,2%	0,0%	0,5%
No responde	0,2%	0,4%	0,0%

Cuadro No. 7 ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y POR SEXO

	General	Hombres	Mujeres
Estado Civil	432	239	193
Soltero	41,0%	47,7%	32,6%
Casado	37,0%	32,6%	42,5%
Unión Libre	12,5%	11,3%	14,0%
Separado	3,5%	2,9%	4,1%
Divorciado	1,6%	2,1%	1,0%
Viudo	3,9%	2,5%	5,7%
No responde	0,5%	0,8%	0,0%

Cuadro No. 8 INGRESO BAJO EFECTO DE DROGAS DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y POR SEXO

Ingreso Bajo Efecto de Drogas	Hombre	Hombres	Mujeres
	432	239	193
Si	6,0%	7,9%	3,6%
No	94,0%	92,1%	96,4%

Cuadro No. 9 TIPO DE DROGAS ASOCIADAS AL INGRESO EN LOS PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS

Cuales Drogas	Hombre	Hombres	Mujeres
	26	19	7
Alcohol	61,5%	57,9%	71,4%
Marihuana	11,5%	15,8%	0,0%
Alucinógenos	3,8%	0,0%	14,3%
Cocaína	3,8%	5,3%	0,0%
Barbitúricos	3,8%	5,3%	0,0%
Metanfetamina/Cristal	11,5%	10,5%	14,3%
Refractil ofteno	3,8%	5,3%	0,0%

MOTIVO DE INGRESO A URGENCIAS

Cuadro No. 10 MOTIVO DE CONSULTA A UNA UNIDAD DE URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y SEXO			
Causa	General	Hombres	Mujeres
Lesión de Causa Externa	164	117	57
Patología de Base	221	106	115
Otras	47	16	31

Cuadro No. 11 MOTIVO DE CONSULTA A UNA UNIDAD DE URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y SEXO			
Causa	General	Hombres	Mujeres
	26	19	7
Lesión de Causa Externa	37.9%	48.9%	29.5%
Patología de Base	51.2%	44.3%	59.5%
Otras	10.9%	6.7%	16%

Cuadro No. 12 MOTIVOS DE INGRESO POR LESIÓN DE CAUSA EXTERNA A UNA UNIDAD DE URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y SEXO			
	General	Hombres	Mujeres
Lesión	164	117	57
Atropellado	6,7%	6,8%	6,4%
Accidente Automovilístico	6,1%	6,8%	4,3%
Caída	32,9%	31,6%	36,2%
Trauma por Objeto Contundente o Persona	18,3%	22,2%	8,5%
Aplastamiento	2,4%	3,4%	0,0%
Objeto Punzo Cortante o Punzo Contundente	16,5%	16,2%	17,0%
Maquinaria	3,0%	3,4%	2,1%
Piquete o mordedura	7,9%	6,8%	10,6%
Quemadura por fuego o química	1,2%	0,9%	2,1%
Asfixia o sofocación	1,2%	0,0%	4,3%
Intoxicación o envenenamiento	1,8%	0,9%	4,3%
Sobredosis accidental	0,6%	0,0%	2,1%
Sobredosis autoinflingida (suicidio)	0,6%	0,0%	2,1%
Envenenamiento suicida	0,6%	0,9%	0,0%

Cuadro No. 13 LUGAR DONDE OCURRIÓ LA LESIÓN DE CAUSA EXTERNA EN URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y SEXO			
	General	Hombres	Mujeres
Lugar donde ocurrió la lesión	164	117	57
Hogar	33,5%	23,9%	57,4%
Escuela	3,0%	3,4%	2,1%
Vía Pública	37,8%	41,9%	27,7%
Sitio de recreación	3,7%	5,1%	0,0%
Trabajo	18,3%	22,2%	8,5%
Otros	3,0%	2,6%	4,3%
Se desconoce	0,6%	0,9%	0,0%

Cuadro No. 14 INGRESO POR PATOLOGÍA DE BASE EN URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y SEXO			
Ingreso por Patología de Base	General	Hombres	Mujeres
	221	106	115
Bronquitis/ enfisema/ asma	4,4%	4,2%	4,7%
Cáncer de tráquea / Bronquios/ Pulmón	0,7%	0,8%	0,5%
Enfermedades del corazón	2,1%	2,1%	2,1%
Hipertensión arterial	7,6%	5,4%	10,4%
Afección neurológica	3,0%	3,3%	2,6%
Cirrosis/ gastritis	9,3%	9,6%	8,8%
Urgencias quirúrgicas	3,7%	3,8%	3,6%
Psicosis alcohólica/ sustancias (drogas)	1,2%	1,3%	1,0%
Afección gineco/obstétrica	4,6%	0,0%	10,4%
Afección osteo/muscular	5,8%	5,0%	6,7%
Diabetes mellitus	3,5%	4,6%	2,1%
Otras	5,3%	4,2%	6,7%

CONSUMO DE SUSTANCIAS PACIENTES QUE ACUDEN A URGENCIAS

Cuadro No. 15 CONSUMO REGULAR DE DROGAS POR PACIENTES QUE ACUDEN A URGENCIAS MÉDICAS, GENERAL Y POR SEXO

Consume sustancias	General	Hombres	Mujeres
	432	226	193
Si	38,4%	55,2%	17,6%
No	61,6%	44,8%	82,4%

Cuadro No. 16 DROGAS DE MAYOR CONSUMO POR PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, GENERAL POR SEXO

Historial de Consumo de Drogas	General	Hombres	Mujeres
Alcohol	70,5%	72,7%	61,8%
Marihuana	13,3%	15,2%	5,9%
Inhalantes	0,6%	0,0%	2,9%
Alucinógenos	0,6%	0,8%	0,0%
Cocaína	3,6%	4,5%	0,0%
Anfetaminas	0,6%	0,8%	0,0%
Anticolinérgicos	0,6%	0,8%	0,0%
Tabaco	57,2%	56,8%	58,8%
Metanfetamina/Cristal	4,8%	5,3%	2,9%

**SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES EN JALISCO
RESULTADOS SISVEA 2017**

Indicador: Servicio Médico Forense

En el **2017** se modificó las cédulas de los diferentes indicadores del SISVEA, por lo que se presentará en esta ocasión, con información en cuadros, donde se describirá el contenido de la misma lo cual abarca lo siguiente:

La información se obtiene de tres **FUENTES:**

- ✓ **Libros de Trabajo Social.**
- ✓ **Libros de registro de las autopsias por parte del médico forense.**
- ✓ **Las alcoholimetrías del informe del Instituto de Ciencias Forenses.**

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

- ✓ La fecha de elaboración.
- ✓ La fecha de nacimiento del fallecido.
- ✓ Edad del mismo al momento de perder la vida.
- ✓ Nombre del difunto, y si no se conoce o tiene registro, se dejará como anónimo.

SEXO

*En caso de ser femenino se pregunta si falleció en estado grávido.

La entidad y el municipio de residencia.

DATOS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE

Toda la información se obtiene del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ubicado en Tlaquepaque Jalisco.

CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO

- ✓ Fecha de defunción
- ✓ Causa de la muerte
- ✓ Causa directa y básica de la muerte: para ello se utilizó la codificación del CIE X
- ✓ Lugar en el que ocurrió la muerte: En tránsito, hogar, vía pública, escuela, sitio de recreación, trabajo, otro, se desconoce

PRESUNCIÓN DE LA MUERTE

- ✓ Accidente
- ✓ Homicidio
- ✓ Suicidio
- ✓ Muerte no violenta

DATOS DE QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA

- ✓ Se obtiene la información solo si la muerte se presentó bajo el efecto de alguna sustancia, droga y/o psicotrópico
- ✓ Si es afirmativa se buscan cinco principales sustancias, y si existe confirmación laboratorial de las drogas encontradas.
- ✓ Se describirá el número total de muertes y se detallarán las producidas bajo el efecto de alguna droga.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Son los cadáveres mayores de 5 años y con información completa.

INFORMACIÓN GENERAL

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Cuadro No. 1 DISTRIBUCIÓN GENERAL SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE		
Causa	Número	Porcentaje
Accidente	1,119	36.7
Homicidio	1,136	37.3
Suicidio	377	11.0
No violenta	411	13.5
Total	3,043	100

Cuadro No. 2 INFORMACIÓN COMPLETA DEL CADÁVER SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
Anónimo	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
	3,043	1,119	1,136	377	411
Si	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
No	99,9%	99,7%	99,9%	100,0%	100,0%

Cuadro No. 3 EDAD DEL FALLECIDO SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Edad del cadáver	3,043	1,119	1,136	377	411
5 a 9	0,8%	1,4%	0,4%	0,0%	0,5%
10 a 14	1,7%	2,3%	1,1%	1,9%	1,2%
15 a 19	6,8%	7,7%	6,4%	10,6%	1,7%
20 a 24	10,8%	8,2%	15,0%	15,1%	2,7%
25 a 29	11,9%	10,5%	14,9%	15,4%	4,4%
30 a 34	12,4%	9,6%	17,5%	12,7%	5,4%
35 a 39	10,3%	7,4%	13,4%	13,3%	6,6%
40 a 44	8,8%	7,7%	9,8%	10,9%	7,5%
45 a 49	7,7%	8,4%	7,6%	5,8%	7,5%
50 a 54	5,9%	6,6%	4,1%	4,0%	10,7%
55 a 59	5,9%	7,5%	3,4%	3,2%	11,2%
60 a 64	4,5%	4,8%	2,1%	2,7%	12,2%
65 a 69	3,5%	3,8%	1,6%	1,9%	9,5%
70 a >	9,0%	14,0%	2,6%	2,7%	19,0%

Cuadro No. 4 GÉNERO DEL CADÁVER POR PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
Sexo	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
	3,043	1,119	1,136	377	411
Masculino	83,7%	79,6%	91,4%	80,1%	76,9%
Femenino	16,3%	20,4%	8,6%	19,9%	23,1%

Cuadro No. 5 CADÁVERES DEL SEXO FEMENINO SEGÚN ESTADO GRÁVIDO Y PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Embarazo	496	228	98	74	95
Si	0,8%	0,9%	0,0%	1,3%	1,1%
No	99,2%	99,1%	100,0%	98,7%	98,9%

Cuadro No. 6 ESTADO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Estado de Residencia	3,043	1,119	1,136	377	411
Aguascalientes	0,3%	0,4%	0,1%	0,3%	0,2%
Baja California Sur	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Campeche	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Coahuila	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%
Colima	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,0%
Chiapas	0,2%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%
Chihuahua	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Ciudad de México	0,3%	0,4%	0,1%	0,0%	0,7%
Durango	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%
Guanajuato	0,3%	0,6%	0,0%	0,3%	0,2%
Guerrero	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Hidalgo	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,5%
Jalisco	95,1%	93,4%	96,1%	97,6%	94,4%
Estado de México	0,3%	0,4%	0,3%	0,0%	0,0%
Michoacán	1,0%	1,5%	0,6%	0,0%	1,2%
Morelos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nayarit	0,5%	0,9%	0,4%	0,0%	0,0%
Nuevo León	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Oaxaca	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%
Puebla	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Querétaro	0,2%	0,1%	0,3%	0,0%	0,2%
San Luis Potosí	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Sinaloa	0,4%	0,0%	0,7%	0,0%	0,7%
Sonora	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Tabasco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tamaulipas	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlaxcala	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veracruz	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%
Yucatán	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacatecas	0,3%	0,2%	0,3%	0,5%	0,2%
Otro país	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,7%

Cuadro No. 7 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de residencia	3,043	1,119	1,136	377	411
Acatic	0,2%	0,4%	0,0%	0,5%	0,0%
Acatlán de Juárez	0,3%	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%
Ahualulco del Mercado	0,3%	0,7%	0,2%	0,0%	0,0%
Amacueca	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%
Amatitán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Ameca	0,5%	0,9%	0,1%	0,3%	0,7%
Arandas	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
El Arenal	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Atenguillo	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Atotonilco el Alto	0,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Atoyac	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Ayotlán	0,1%	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%
La Barca	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Bolaños	0,1%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%
Casimiro Castillo	0,2%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%
Cihuatlán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán El Grande	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%
Cocula	0,3%	0,4%	0,2%	0,3%	0,2%
Colotlán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuautitlán de García Barragán	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuautla	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuquío	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Chapala	0,9%	1,1%	0,8%	0,5%	0,7%
Chimaltitlán	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Degollado	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Ejutla	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Encarnación de Díaz	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Etzatlán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
El Grullo	0,2%	0,0%	0,2%	0,5%	0,2%
Guadalajara	26,8%	24,5%	28,3%	22,8%	33,1%
Hostotipaquillo	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Ixtlahuacán de los Membrillos	0,7%	1,2%	0,4%	0,8%	0,2%

Cuadro No. 7 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de residencia	3,043	1,119	1,136	377	411
Ixtlahuacán del Río	0,5%	1,0%	0,3%	0,5%	0,0%
Jalostotitlán	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Jesús María	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Jocotepec	1,1%	0,6%	1,6%	1,6%	0,7%
Juanacatlán	0,4%	0,4%	0,7%	0,0%	0,2%
Juchitlán	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Lagos de Moreno	0,2%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Magdalena	0,2%	0,3%	0,1%	0,0%	0,5%
Mascota	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Mexicacán	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Mezquitic	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Ocotlán	0,4%	0,9%	0,0%	0,0%	0,2%
Ojuelos de Jalisco	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Pihuamo	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Puerto Vallarta	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,0%
Quitupan	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
El Salto	3,9%	4,2%	3,0%	5,0%	4,4%
San Juan de los Lagos	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
San Marcos	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Bolaños	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
San Martín de Hidalgo	0,2%	0,4%	0,0%	0,3%	0,2%
San Miguel el Alto	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Gómez Farías	0,2%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%
Santa María de los Ángeles	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Sayula	0,2%	0,4%	0,0%	0,3%	0,0%
Tala	0,3%	0,4%	0,4%	0,0%	0,2%
Tamazula de Gordiano	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Tapalpa	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%
Tecolotlán	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%
Tenamaxtlán	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Teocaltiche	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocuitatlán de Corona	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 7 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de residencia	3,043	1,119	1,136	377	411
Tepatitlán de Morelos	0,3%	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%
Tequila	0,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Teuchitlán	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Tizapán el Alto	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,0%
Tlajomulco de Zúñiga	10,8%	8,5%	10,9%	17,0%	10,9%
Tlaquepaque	12,2%	11,3%	13,9%	10,3%	11,4%
Tolimán	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%
Tomatlán	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Tonalá	9,5%	8,3%	10,6%	11,7%	7,5%
Tonaya	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Tototlán	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Tuxcueca	0,1%	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%
Tuxpan	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
San Gabriel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Corona	0,4%	0,6%	0,3%	0,0%	0,5%
Yahualica de González Gallo	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Zacoalco de Torres	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,5%
Zapopan	19,1%	16,8%	21,0%	21,2%	18,0%
Zapotlanejo	0,9%	1,2%	0,5%	0,8%	1,2%
Municipios de otros Estados	4,9%	6,6%	3,9%	2,4%	5,6%

CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO

Cuadro No. 8 CAUSA DIRECTA SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Causa Directa	3,043	1,119	1,136	377	411
Otras, Sepsis especificadas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Sepsis, no especificada	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	2,9%
Meningitis viral	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Anemia nutricional, no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Miocarditis reumática aguda	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	6,2%	0,2%	0,1%	0,0%	45,0%
Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
Insuficiencia cardíaca, no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Hemorragia subaracnoidea, no especificada	2,2%	5,3%	0,2%	0,0%	1,2%
Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%
Hemorragia intraencefálica, no especificada	0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	2,7%
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	1,5%
Neumonía, no especificada	2,5%	0,7%	0,0%	0,0%	16,3%
Edema pulmonar	1,4%	0,0%	0,1%	1,3%	9,2%
Insuficiencia respiratoria, no especificada	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Úlcera gástrica, aguda con hemorragia	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%
Apendicitis aguda con absceso peritoneal	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Invaginación	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
Peritonitis aguda	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Peritonitis, no especificada	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%
Pancreatitis aguda, no especificada	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%
Enfermedad renal crónica, no especificada	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Choque hipovolémico	0,6%	0,1%	0,3%	0,0%	3,4%

Cuadro No. 8 CAUSA DIRECTA SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Causa Directa	3,043	1,119	1,136	377	411
Choque séptico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Otros síntomas y signos generales especificados	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%
Herida de otras partes de la cabeza	14,6%	0,7%	36,3%	6,4%	0,2%
Traumatismo de la cabeza, no especificado	18,4%	39,7%	9,6%	1,1%	0,7%
Herida que compromete la laringe y la tráquea	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%
Herida de cuello, parte no especificada	1,6%	0,1%	4,0%	0,5%	0,0%
Fractura de otras partes del cuello	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Amputación traumática a nivel del cuello	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Contusión del tórax	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%
Herida de otras partes del tórax	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Herida del tórax, parte no especificada	9,0%	0,3%	23,5%	0,8%	0,0%
Aplastamiento del tórax	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Herida de la región lumbosacra y de la pelvis	0,2%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%
Herida de la pared abdominal	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Heridas múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen	2,0%	0,0%	5,4%	0,0%	0,0%
Herida de la cadera	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Herida del muslo	0,1%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
Traumatismo de la arteria femoral	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Heridas que afectan la cabeza con el cuello	0,1%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
Heridas que afectan el tórax con el abdomen, la región lumbosacra y la pelvis	0,6%	0,0%	1,2%	0,0%	1,0%
Heridas que afectan otras combinaciones de las regiones del cuerpo	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,2%
Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo	0,7%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte	12,1%	32,6%	0,2%	0,0%	0,0%
Herida de región no especificada del cuerpo	0,8%	0,4%	1,8%	0,0%	0,0%
Cuerpo extraño en las vías respiratorias, parte no especificada	2,0%	3,9%	0,4%	0,5%	2,4%
Quemadura de región del cuerpo y grado no especificados	2,1%	5,4%	0,4%	0,0%	0,0%
Quemadura de tercer grado, región del cuerpo no especificada	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras drogas y sustancias biológicas, y las no especificadas	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Efecto tóxico del monóxido de carbono	0,5%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Efecto tóxico de sustancia no especificada	1,5%	0,5%	0,2%	10,1%	0,0%
Asfixia	16,8%	5,5%	13,2%	79,0%	0,2%

Cuadro No. 8 CAUSA DIRECTA SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Causa Directa	3,043	1,119	1,136	377	411
Edema angioneurótico	0,1%	0,1%	0,2%	0,0%	0,2%
Choque durante o resultante de un procedimiento, no clasificado en otra parte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%

Cuadro No. 9 LUGAR DEL SUCESO SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Lugar en que ocurre	3,043	1,119	1,136	377	411
En tránsito	19,2%	49,4%	1,7%	1,3%	1,7%
Hogar	24,4%	14,7%	8,3%	86,5%	38,4%
Vía Pública	36,0%	7,6%	78,6%	4,8%	24,6%
Escuela	0,3%	0,3%	0,5%	0,0%	0,2%
Sitio de recreación	1,4%	2,7%	0,7%	0,5%	0,7%
Trabajo	2,5%	5,9%	0,4%	0,5%	0,5%
Otro	15,8%	19,0%	9,7%	6,4%	32,8%
Se desconoce	0,3%	0,4%	0,1%	0,0%	1,0%

Cuadro No. 10 MES DEL SUCESO SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Mes del año	3,043	1,119	1,136	377	411
Enero	9,9%	11,2%	8,5%	9,3%	10,9%
Febrero	6,6%	7,3%	5,8%	7,7%	5,8%
Marzo	8,2%	8,1%	7,0%	9,0%	10,7%
Abril	7,9%	9,5%	5,8%	9,5%	8,0%
Mayo	9,2%	10,6%	8,3%	8,5%	8,5%
Junio	7,5%	6,6%	8,1%	8,0%	7,8%
Julio	8,0%	7,2%	8,5%	8,8%	7,8%
Agosto	8,5%	6,6%	11,2%	7,4%	7,5%
Septiembre	7,9%	7,1%	7,9%	9,8%	8,3%
Octubre	9,1%	9,5%	9,4%	7,7%	8,5%
Noviembre	8,2%	7,3%	9,8%	6,6%	7,8%
Diciembre	8,9%	8,8%	9,7%	7,7%	8,3%

Cuadro No. 11 NÚMERO DE CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS POR PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
Muerte Bajo Drogas	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Si	228	119	64	30	15
No	2,815	1,000	1,072	347	396

Cuadro No. 12 PORCENTAJE DE CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Muerte Bajo Drogas	228	119	64	30	15
Si	7,5%	10,6%	5,6%	8,0%	3,6%
No	92,5%	89,4%	94,4%	92,0%	96,4%

Cuadro No. 13 TIPO DE DROGAS REGISTRADAS EN CADÁVERES SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Tipo de Drogas	228	119	64	30	15
Alcohol	88,2%	84,0%	96,9%	93,3%	73,3%
Marihuana	3,5%	5,0%	1,6%	0,0%	6,7%
Inhalables	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Alucinógenos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Heroína	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Opio, Morfina	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cocaína	0,9%	0,0%	3,1%	0,0%	0,0%
Tranquilizantes	13,6%	15,1%	12,5%	6,7%	20,0%
Barbitúricos	1,3%	0,8%	1,6%	0,0%	6,7%
Anfetaminas	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Anticolinérgicos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tabaco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Antidepresivos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras drogas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pasta Base, Basuco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Metanfetaminas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Flunitracepam	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Crack	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Refractil ofteno	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

INFORMACIÓN EN CADÁVERES *POSITIVOS* A DROGAS

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Cuadro No. 14 NÚMERO DE CASOS POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Número	228	119	64	30	15

Cuadro No. 15 EDAD DEL FALLECIDO SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Edad del cadáver	228	119	64	30	15
5 a 9	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
10 a 14	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
15 a 19	7,5%	7,6%	9,4%	6,7%	0,0%
20 a 24	11,0%	7,6%	15,6%	13,3%	13,3%
25 a 29	11,0%	7,6%	17,2%	13,3%	6,7%
30 a 34	16,7%	15,1%	15,6%	33,3%	0,0%
35 a 39	11,4%	5,9%	17,2%	20,0%	13,3%
40 a 44	7,5%	5,9%	9,4%	6,7%	13,3%
45 a 49	7,5%	8,4%	7,8%	0,0%	13,3%
50 a 54	7,5%	11,8%	3,1%	3,3%	0,0%
55 a 59	3,9%	5,0%	3,1%	0,0%	6,7%
60 a 64	4,4%	6,7%	0,0%	0,0%	13,3%
65 a 69	4,4%	5,0%	1,6%	3,3%	13,3%
70 a >	6,6%	11,8%	0,0%	0,0%	6,7%

Cuadro No. 16 GÉNERO DEL CADÁVER POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Sexo	228	119	64	30	15
Masculino	87,3%	82,4%	95,3%	90,0%	86,7%
Femenino	12,7%	17,6%	4,7%	10,0%	13,3%

Cuadro No. 17 CADÁVERES DEL GÉNERO FEMENINO POSITIVOS A DROGAS SEGÚN EMBARAZO Y PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Embarazo	29	21	3	3	2
Si	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
No	100%	100%	100%	100%	100%

Cuadro No. 18 ESTADO DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Estado de Residencia	228	119	64	30	15
Colima	0,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Chiapas	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Durango	0,9%	0,0%	1,6%	0,0%	6,7%
Guanajuato	0,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Jalisco	95,6%	95,0%	95,3%	100,0%	93,3%
Estado de México	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Michoacán	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Veracruz	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Otro país	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

**Cuadro No. 19 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO POSITIVO A DROGAS SEGÚN
PRESUNCIÓN DE LA MUERTE**

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de residencia	228	119	64	30	15
Ahualulco del Mercado	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Ameca	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Atotonilco el Alto	0,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán El Grande	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Cocula	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuquío	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Chapala	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Chimaltitlán	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Chiquilistlán	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Degollado	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ejutla	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Encarnación de Díaz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Etzatlán	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
El Grullo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guachinango	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guadalajara	23,2%	20,2%	25,0%	26,7%	33,3%
Hostotipaquillo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejúcar	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huejuquilla el Alto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
La Huerta	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ixtlahuacán de los Membrillos	1,3%	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Ixtlahuacán del Río	0,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Jalostotitlán	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Jesús María	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Jocotepec	3,1%	1,7%	3,1%	10,0%	0,0%
Juanacatlán	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Mexxicacán	0,4%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%
El Salto	4,4%	5,9%	3,1%	0,0%	6,7%
Gómez Farías	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Tala	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%

**Cuadro No. 19 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO POSITIVO A DROGAS SEGÚN
PRESUNCIÓN DE LA MUERTE**

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de residencia	228	119	64	30	15
Tizapán el Alto	0,4%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%
Tlajomulco de Zúñiga	15,4%	11,8%	17,2%	26,7%	13,3%
Tlaquepaque	11,0%	10,1%	14,1%	6,7%	13,3%
Tolimán	0,4%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%
Tonalá	10,1%	10,1%	15,6%	0,0%	6,7%
San Gabriel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Corona	0,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapopan	15,4%	16,0%	14,1%	13,3%	20,0%
Zapotlanejo	2,2%	1,7%	1,6%	6,7%	0,0%
San Ignacio Cerro Gordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Municipios de otros Estados	4,4%	5,0%	4,7%	0,0%	6,7%
Sin Dato	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%

CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO EN CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS

Cuadro No. 20 CAUSA DIRECTA EN POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Causa Directa	228	119	64	30	15
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	26,7%
Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%
Hemorragia subaracnoidea, no especificada	3,1%	5,0%	0,0%	0,0%	6,7%
Hemorragia intraencefálica, no especificada	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%
Neumonía, no especificada	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%
Edema pulmonar	1,8%	0,0%	0,0%	6,7%	13,3%
Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	13,3%
Herida de otras partes de la cabeza	12,3%	0,8%	40,6%	3,3%	0,0%
Traumatismo de la cabeza, no especificado	27,2%	47,1%	7,8%	0,0%	6,7%
Herida de cuello, parte no especificada	0,9%	0,8%	1,6%	0,0%	0,0%
Contusión del tórax	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Herida del tórax, parte no especificada	9,6%	0,8%	31,3%	3,3%	0,0%
Herida de la región lumbosacra y de la pelvis	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen	1,3%	0,0%	4,7%	0,0%	0,0%
Traumatismo de la arteria femoral	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte	17,5%	33,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Traumatismos múltiples, no especificados	1,3%	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Herida de región no especificada del cuerpo	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuerpo extraño en las vías respiratorias, parte no especificada	1,3%	1,7%	0,0%	3,3%	0,0%
Quemadura de región del cuerpo y grado no especificados	0,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Efecto tóxico del monóxido de carbono	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Efecto tóxico de sustancia no especificada	1,3%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%
Asfixia	14,0%	3,4%	9,4%	73,3%	0,0%

Cuadro No. 21 CAUSA BÁSICA EN POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Causa básica	228	119	64	30	15
Infarto agudo del miocardio	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	26,7%
Embolia pulmonar	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%
Hemorragia subaracnoidea	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	13,3%
Neumonía, organismo no especificado	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%
Edema pulmonar	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	13,3%
Úlcera gástrica, aguda con hemorragia	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	13,3%
Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	2,6%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta, accidente no de tránsito	4,8%	9,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	26,8%	50,4%	0,0%	0,0%	6,7%
Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	0,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Caída en o desde escalera o escalones	5,3%	10,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Caída no especificada	4,8%	9,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Caída no especificada, área industrial y de la construcción	0,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Golpe contra o golpeado por otros objetos	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Contacto traumático con herramientas manuales sin motor	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina	0,9%	0,8%	1,6%	0,0%	0,0%
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	2,6%	4,2%	0,0%	3,3%	0,0%
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	0,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Exposición a factores no especificados, calles y carreteras	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, vivienda	2,2%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%
Lesión auto infligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	9,2%	0,0%	0,0%	70,0%	0,0%
Lesión auto infligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	0,4%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%
Lesión auto infligida intencionalmente por disparo de arma corta	0,4%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%
Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, vivienda	1,3%	0,0%	4,7%	0,0%	0,0%
Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, calles y carreteras	0,9%	0,0%	3,1%	0,0%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	0,9%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, vivienda	1,3%	0,0%	3,1%	3,3%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, áreas de deporte y atletismo	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, calles y carreteras	17,1%	0,8%	59,4%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 21 CAUSA BÁSICA EN POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Causa básica	228	119	64	30	15
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, área industrial y de la construcción	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, otro lugar especificado	3,1%	0,0%	10,9%	0,0%	0,0%
Agresión con objeto cortante	1,3%	0,0%	4,7%	0,0%	0,0%
Agresión con objeto romo o sin filo, calles y carreteras	1,8%	0,0%	6,3%	0,0%	0,0%
Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 22 LUGAR DEL SUCESO EN CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Lugar en que ocurre	228	119	64	30	15
En tránsito	31,1%	58,0%	0,0%	3,3%	6,7%
Hogar	21,9%	10,9%	10,9%	86,7%	26,7%
Vía Pública	27,2%	8,4%	73,4%	3,3%	26,7%
Escuela	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sitio de recreación	1,3%	0,8%	3,1%	0,0%	0,0%
Trabajo	2,2%	3,4%	1,6%	0,0%	0,0%
Otro	16,2%	18,5%	10,9%	6,7%	40,0%
Se desconoce	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 23 MES DEL SUCESO EN CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Mes del año	228	119	64	30	15
Enero	20,2%	20,2%	17,2%	23,3%	26,7%
Febrero	12,3%	13,4%	10,9%	10,0%	13,3%
Marzo	21,9%	21,0%	20,3%	30,0%	20,0%
Abril	10,5%	11,8%	6,3%	16,7%	6,7%
Mayo	11,0%	8,4%	17,2%	6,7%	13,3%
Junio	8,8%	9,2%	10,9%	0,0%	13,3%
Julio	6,1%	7,6%	6,3%	0,0%	6,7%
Agosto	1,8%	0,8%	4,7%	0,0%	0,0%
Septiembre	3,1%	3,4%	1,6%	6,7%	0,0%
Octubre	3,1%	3,4%	3,1%	3,3%	0,0%
Noviembre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Diciembre	1,3%	0,8%	1,6%	3,3%	0,0%

DATOS DE QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA

Cuadro No. 24 TIPO DE DROGAS ENCONTRADAS EN CADÁVERES SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Tipo de Drogas	228	119	64	30	15
Alcohol	88,2%	84,0%	96,9%	93,3%	73,3%
Marihuana	3,5%	5,0%	1,6%	0,0%	6,7%
Cocaína	0,9%	0,0%	3,1%	0,0%	0,0%
Tranquilizantes	13,6%	15,1%	12,5%	6,7%	20,0%
Barbitúricos	1,3%	0,8%	1,6%	0,0%	6,7%
Anfetaminas	0,4%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
Total	107,9%	105,0%	117,2%	100,0%	106,7%

INFORMACIÓN DE CADÁVERES *NEGATIVOS A DROGAS*

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Cuadro No. 25 NÚMERO DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Número	2,815	1,000	1,072	347	396

Cuadro No. 26 CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS CON INFORMACIÓN COMPLETA SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Anónimo	2,815	1,000	1,072	347	396
Si	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
No	99,9%	99,7%	99,9%	100,0%	100,0%

Cuadro No. 27 GÉNERO DE LOS CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS Y PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Sexo	2,815	1,000	1,072	347	396
Masculino	83,4%	79,3%	91,1%	79,3%	76,5%
Femenino	16,6%	20,7%	8,9%	20,7%	23,5%

Cuadro No. 28 CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS DEL SEXO FEMENINO SEGÚN ESTADO GRÁVIDO Y PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Embarazo	2,815	10,00	1,072	347	396
Si	0,9%	1,0%	0,0%	1,4%	1,1%
No	99,1%	99,0%	100,0%	98,6%	98,9%

Cuadro No. 29 EDAD DE LOS CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS Y PRESUNCIÓN DE LA MUERTE

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Edad del cadáver	2,815	1,000	1,072	347	396
5 a 9	0,8%	1,5%	0,5%	0,0%	0,5%
10 a 14	1,8%	2,5%	1,2%	2,0%	1,3%
15 a 19	6,7%	7,7%	6,3%	11,0%	1,8%
20 a 24	10,8%	8,3%	14,9%	15,3%	2,3%
25 a 29	12,0%	10,9%	14,7%	15,6%	4,3%
30 a 34	12,0%	8,9%	17,6%	11,0%	5,6%
35 a 39	10,2%	7,6%	13,2%	12,7%	6,3%
40 a 44	9,0%	7,9%	9,8%	11,2%	7,3%
45 a 49	7,7%	8,4%	7,6%	6,3%	7,3%
50 a 54	5,8%	6,0%	4,2%	4,0%	11,1%
55 a 59	6,1%	7,8%	3,5%	3,5%	11,4%
60 a 64	4,5%	4,6%	2,2%	2,9%	12,1%
65 a 69	3,4%	3,6%	1,6%	1,7%	9,3%
70 a >	9,2%	14,3%	2,8%	2,9%	19,4%

**Cuadro No. 30 ESTADO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE**

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Estado de Residencia	2,815	1,000	1,072	347	396
Aguascalientes	0,3%	0,5%	0,1%	0,3%	0,3%
Baja California Norte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Baja California Sur	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Campeche	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Coahuila	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%
Colima	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,0%
Chiapas	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
Chihuahua	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Ciudad de México	0,3%	0,4%	0,1%	0,0%	0,8%
Durango	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Guanajuato	0,2%	0,5%	0,0%	0,3%	0,3%
Guerrero	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Hidalgo	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,5%
Jalisco	95,0%	93,2%	96,2%	97,4%	94,4%
Estado de México	0,2%	0,4%	0,3%	0,0%	0,0%
Michoacán	1,0%	1,7%	0,6%	0,0%	1,3%
Morelos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nayarit	0,5%	1,0%	0,4%	0,0%	0,0%
Nuevo León	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Oaxaca	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%
Puebla	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Querétaro	0,2%	0,1%	0,3%	0,0%	0,3%
Quintana Roo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
San Luis Potosí	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Sinaloa	0,4%	0,0%	0,7%	0,0%	0,8%
Sonora	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Tabasco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tamaulipas	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Tlaxcala	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veracruz	0,1%	0,2%	0,0%	0,3%	0,3%
Yucatán	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Zacatecas	0,3%	0,2%	0,3%	0,6%	0,3%
Otro país	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,8%

Cuadro No. 31 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de residencia	2,815	1,000	1,072	347	396
Acatic	0,2%	0,4%	0,0%	0,6%	0,0%
Acatlán de Juárez	0,3%	0,7%	0,2%	0,0%	0,0%
Ahualulco del Mercado	0,3%	0,7%	0,2%	0,0%	0,0%
Amacueca	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,3%
Amatitán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Ameca	0,5%	0,9%	0,1%	0,3%	0,8%
San Juanito de Escobedo	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Arandas	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
El Arenal	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Atenguillo	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Atotonilco el Alto	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Atoyac	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Ayotlán	0,1%	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%
La Barca	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Bolaños	0,1%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%
Casimiro Castillo	0,2%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%
Cihuatlán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Zapotlán El Grande	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%
Cocula	0,3%	0,4%	0,2%	0,3%	0,3%
Colotlán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuautilán de García Barragán	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuautla	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuquío	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Chapala	0,9%	1,1%	0,8%	0,6%	0,8%
Chimaltitlán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Degollado	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Ejutla	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

**Cuadro No. 31 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE**

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de residencia	2,815	1,000	1,072	347	396
Encarnación de Díaz	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Etzatlán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
El Grullo	0,2%	0,0%	0,2%	0,6%	0,3%
Guadalajara	27,1%	25,0%	28,5%	22,5%	33,1%
Hostotipaquillo	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Ixtlahuacán de los Membrillos	0,6%	1,0%	0,4%	0,9%	0,3%
Ixtlahuacán del Río	0,5%	0,9%	0,3%	0,6%	0,0%
Jalostotitlán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Jocotepec	1,0%	0,5%	1,5%	0,9%	0,8%
Juanacatlán	0,4%	0,4%	0,7%	0,0%	0,3%
Juchitlán	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Lagos de Moreno	0,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Magdalena	0,2%	0,3%	0,1%	0,0%	0,5%
Mascota	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Mezquitic	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Ocotlán	0,4%	1,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Ojuelos de Jalisco	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Puerto Vallarta	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,0%
Villa Purificación	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Quitupan	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
El Salto	3,8%	4,0%	3,0%	5,5%	4,3%
San Marcos	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
San Martín de Bolaños	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
San Martín de Hidalgo	0,2%	0,5%	0,0%	0,3%	0,3%
San Miguel el Alto	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Gómez Farías	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
Sayula	0,2%	0,4%	0,0%	0,3%	0,0%
Tala	0,3%	0,4%	0,4%	0,0%	0,3%
Talpa de Allende	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tamazula de Gordiano	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro No. 31 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de residencia	2,815	1,000	1,072	347	396
Tapalpa	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%
Tecalitlán	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tecolotlán	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,3%
Teocaltiche	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Teocuitatlán de Corona	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Tepatitlán de Morelos	0,3%	0,7%	0,2%	0,0%	0,0%
Tequila	0,2%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Tizapán el Alto	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Tlajomulco de Zúñiga	10,4%	8,1%	10,5%	16,1%	10,9%
Tlaquepaque	12,3%	11,5%	13,9%	10,7%	11,4%
Tolimán	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Tomatlán	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Tonalá	9,4%	8,1%	10,3%	12,7%	7,6%
Tonaya	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Tototlán	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Tuxcueca	0,1%	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%
Tuxpan	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
Valle de Juárez	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
San Gabriel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Villa Corona	0,4%	0,5%	0,3%	0,0%	0,5%
Zacoalco de Torres	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%	0,5%
Zapopan	19,4%	16,9%	21,4%	21,9%	17,9%
Zapotlanejo	0,8%	1,1%	0,5%	0,3%	1,3%
Municipios de otros Estados	5,0%	6,8%	3,8%	2,6%	5,6%

Cuadro No. 32 CAUSA DIRECTA EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Causa Directa	2,815	1,000	1,072	347	396
Otras Sepsis especificadas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Sepsis, no especificada	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	3,0%
Meningitis viral	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Anemia nutricional, no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Miocarditis reumática aguda	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	6,5%	0,2%	0,1%	0,0%	45,7%
Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Insuficiencia cardíaca, no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Hemorragia subaracnoidea, no especificada	2,1%	5,3%	0,2%	0,0%	1,0%
Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%
Hemorragia intraencefálica, no especificada	0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	2,5%
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	1,5%
Neumonía, no especificada	2,6%	0,8%	0,0%	0,0%	16,2%
Edema pulmonar	1,4%	0,0%	0,1%	0,9%	9,1%
Insuficiencia respiratoria, no especificada	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Úlcera gástrica, aguda con hemorragia	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Apendicitis aguda con absceso peritoneal	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Invaginación	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
Peritonitis aguda	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Peritonitis, no especificada	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%
Pancreatitis aguda, no especificada	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
Hemorragia gastrointestinal, no especificada	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%
Enfermedad renal crónica, no especificada	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Choque hipovolémico	0,6%	0,1%	0,3%	0,0%	3,5%
Choque séptico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Otros síntomas y signos generales especificados	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%
Herida de otras partes de la cabeza	14,8%	0,7%	36,0%	6,6%	0,3%
Traumatismo de la cabeza, no especificado	17,7%	38,8%	9,7%	1,2%	0,5%

Herida que compromete la laringe y la tráquea	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%
Herida de cuello, parte no especificada	1,7%	0,0%	4,2%	0,6%	0,0%
Fractura de otras partes del cuello	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Amputación traumática a nivel del cuello	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Contusión del tórax	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%
Herida de otras partes del tórax	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Herida del tórax, parte no especificada	8,9%	0,2%	23,0%	0,6%	0,0%
Aplastamiento del tórax	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Herida de la región lumbosacra y de la pelvis	0,2%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%
Herida de la pared abdominal	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Heridas múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen	2,1%	0,0%	5,4%	0,0%	0,0%
Herida de la cadera	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Herida del muslo	0,1%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
Heridas que afectan la cabeza con el cuello	0,1%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
Heridas que afectan el tórax con el abdomen, la región lumbosacra y la pelvis	0,6%	0,0%	1,3%	0,0%	1,0%
Heridas que afectan otras combinaciones de las regiones del cuerpo	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,3%
Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo	0,7%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte	11,6%	32,5%	0,2%	0,0%	0,0%
Herida de región no especificada del cuerpo	0,9%	0,3%	2,0%	0,0%	0,0%
Cuerpo extraño en las vías respiratorias, parte no especificada	2,0%	4,2%	0,4%	0,3%	2,5%
Quemadura de región del cuerpo y grado no especificados	2,2%	5,8%	0,4%	0,0%	0,0%
Quemadura de tercer grado, región del cuerpo no especificada	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras drogas y sustancias biológicas, y las no especificadas	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Efecto tóxico del monóxido de carbono	0,5%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Efecto tóxico de sustancia no especificada	1,5%	0,6%	0,2%	10,1%	0,0%
Asfixia	17,0%	5,7%	13,4%	79,5%	0,3%
Edema angioneurótico	0,1%	0,1%	0,2%	0,0%	0,3%
Choque durante o resultante de un procedimiento, no clasificado en otra parte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%

Cuadro No. 33 CAUSA BÁSICA EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE

	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Causa básica	2,815	1,000	1,072	347	396
Otras Sepsis	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Meningitis viral	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Enfermedad por VIH, resultante en anomalías inmunológicas y hematológicas, no clasificadas en otra parte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Tumor maligno secundario del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Tumor benigno del retroperitoneo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Otras anemias nutricionales	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%
Anemia nutricional, no especificada	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Desnutrición proteico calórica severa, no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Miocarditis reumática aguda	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva)	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
Infarto agudo del miocardio	6,2%	0,0%	0,1%	0,0%	43,7%
Embolia pulmonar	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%
Hemorragia subaracnoidea	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	4,8%
Hemorragia subaracnoidea, no especificada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Disección de aorta (cualquier parte)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Ruptura de aneurisma de la aorta abdominal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Aneurisma y disección de arteria del miembro superior	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Embolia y trombosis arteriales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Neumonía, organismo no especificado	2,3%	0,0%	0,1%	0,0%	15,9%
Edema pulmonar	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,8%
Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Úlcera gástrica, aguda con hemorragia	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Apendicitis aguda con absceso peritoneal	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%
Invaginación	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%

Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%
Perforación del intestino (no traumática)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Cirrosis hepática alcohólica	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%
Pancreatitis aguda	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Enfermedad renal crónica	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Traumatismo superficial del tórax	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,5%
Traumatismo de órganos intraabdominales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel de la cadera y del muslo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	4,4%	11,6%	0,5%	0,0%	0,8%
Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta, accidente no de tránsito	1,8%	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	1,2%	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	12,5%	34,6%	0,4%	0,0%	0,3%
Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	0,6%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros accidentes de transporte aéreo especificados	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe, vivienda	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Caída en o desde escalera o escalones	3,9%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	0,4%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Caída no especificada	2,4%	6,3%	0,3%	0,0%	0,3%
Caída no especificada, áreas de deporte y atletismo	0,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Caída no especificada, comercio y área de servicios	0,7%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Caída no especificada, área industrial y de la construcción	0,3%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae	0,2%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%
Golpe contra o golpeado por otros objetos	0,2%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%
Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Contacto traumático con herramientas manuales sin motor	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina	0,6%	1,5%	0,0%	0,3%	0,0%
Ahogamiento y sumersión no especificados	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	0,3%	0,8%	0,1%	0,0%	0,0%
Inhalación de contenidos gástricos, vivienda	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	1,5%
Inhalación de contenidos gástricos, calles y carreteras	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	2,8%	7,2%	0,3%	0,0%	1,0%
Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas	0,4%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas, área industrial y de la construcción	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción, calles y carreteras	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción, área industrial y de la construcción	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Exposición a ignición de material altamente inflamable, áreas de deporte y atletismo	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	2,2%	5,3%	0,7%	0,0%	0,0%
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados, área industrial y de la construcción	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	0,4%	0,6%	0,2%	0,0%	0,5%
Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, área industrial y de la construcción	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Privación de agua, lugar no especificado	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Exposición a factores no especificados, calles y carreteras	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, vivienda	1,5%	0,0%	0,0%	11,8%	0,0%
Lesión auto infligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	9,7%	0,0%	0,0%	78,7%	0,0%
Lesión auto infligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Lesión auto infligida intencionalmente por disparo de arma corta	0,4%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%
Lesión auto infligida intencionalmente por objeto cortante	0,1%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%
Lesión auto infligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	0,1%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%
Lesión auto infligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	0,4%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%
Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, vivienda	0,9%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%
Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, calles y carreteras	3,9%	0,0%	10,3%	0,0%	0,0%
Agresión por ahogamiento y sumersión	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	0,5%	0,8%	0,7%	0,0%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, vivienda	1,7%	0,0%	3,5%	3,2%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas	0,2%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, áreas de deporte y atletismo	0,2%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, calles y carreteras	20,1%	0,0%	52,5%	0,6%	0,0%

Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, área industrial y de la construcción	0,1%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, otro lugar especificado	2,5%	0,0%	6,5%	0,3%	0,0%
Agresión con objeto cortante	3,5%	0,0%	9,2%	0,0%	0,0%
Agresión con objeto romo o sin filo	0,5%	0,4%	0,8%	0,0%	0,5%
Agresión con objeto romo o sin filo, áreas de deporte y atletismo	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Agresión con objeto romo o sin filo, calles y carreteras	2,9%	0,0%	7,6%	0,0%	0,0%
Agresión con objeto romo o sin filo, lugar no especificado	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Agresión con fuerza corporal	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Efectos adversos de drogas o medicamentos no especificados	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Incidente durante operación quirúrgica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%

Cuadro No. 34 LUGAR DEL SUCESO EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Lugar en que ocurre	2,815	1,000	1,072	347	396
En tránsito	18,2%	48,4%	1,8%	1,2%	1,5%
Hogar	24,6%	15,2%	8,1%	86,5%	38,9%
Vía Pública	36,8%	7,5%	78,9%	4,9%	24,5%
Escuela	0,4%	0,3%	0,6%	0,0%	0,3%
Sitio de recreación	1,4%	2,9%	0,6%	0,6%	0,8%
Trabajo	2,5%	6,2%	0,4%	0,6%	0,5%
Otro	15,8%	19,1%	9,6%	6,3%	32,6%
Se desconoce	0,3%	0,4%	0,1%	0,0%	1,0%

Cuadro No. 35 MES DEL SUCESO EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRESUNCIÓN DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Mes del año	2,815	1,000	1,072	347	396
Enero	9,1%	10,1%	8,0%	8,1%	10,4%
Febrero	6,1%	6,6%	5,5%	7,5%	5,6%
Marzo	7,1%	6,6%	6,3%	7,2%	10,4%
Abril	7,7%	9,2%	5,8%	8,9%	8,1%
Mayo	9,1%	10,9%	7,7%	8,6%	8,3%
Junio	7,4%	6,3%	7,9%	8,6%	7,6%
Julio	8,1%	7,2%	8,6%	9,5%	7,8%
Agosto	9,1%	7,3%	11,6%	8,1%	7,8%
Septiembre	8,3%	7,6%	8,3%	10,1%	8,6%
Octubre	9,6%	10,2%	9,8%	8,1%	8,8%
Noviembre	8,9%	8,2%	10,4%	7,2%	8,1%
Diciembre	9,6%	9,8%	10,2%	8,1%	8,6%

CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS ADICTIVAS

Alcohol:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Alcohol Etílico o Etanol.

Especies:

Destilados y fermentados: Vino, Tequila, Brandy, Whisky, Vodka, Cerveza, Cooler, Ron, Alcohol puro, Pulque, Charanda, Sotol,

Nombres Comunes:

Alipuses, caballos, caballito, chabelas, chelas, cheves, chupes, chupirules, cubas, copas, cuete, guachicoles, heladas, helodias, jaibol, michelada, michela, pajaretes, pedo, pegue, pisto, salpicón, tequilas, tecailas, wino, yarda.

Marihuana:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central (Alucinógeno).

Compuesto Activo:

Delta 9 Tetrahidrocannabinol (9THC)

Especies:

Cannabis Sativa, Cannabis Erratic, Cannabis Índica, Cannabis Rudelaris.

Nombres Populares:

Cannabis. Caña, chora, churro, grass (yerba), federal, hachich, hash, hashís, hoja verde, joint (enganche), juana, juanita, marijuana, Mery Jane, mota, mostaza naconha, pasto, pot, pura federal, quemando las patas a judas, reefer (rizador), tabaco federal, toque, vaisa, yesca, yerba, yerba buena, weed, (maleza), sikeak, jerry, tonco, tronco, eferveciente, clorotina, black dan, gardor, café, hiloraina, zick zack, silexico.

Otros: Spice

Inhalantes y Solventes:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Adhesivos:

Compuestos Activos:

Acetato de Etileno, Acetona, Epoxi, Hexano, Estireno-Butadieno, Gasolina, Poliestireno, Tetracloroetileno, Tolueno, Toluol, Tricloroetileno.

Producto:

Pegamentos: Tolueno, acetato de etilo y acetonas.

Cementos especiales: Tricloroetileno y tetracloroetileno.

Pegamentos de uso general: Mucilago de dextrina, Cola de nitrocelulosa, cola de acetato de polivinilo, mucilago de goma arábica.

Cola Plástica: Acetato de Polivinilo, epoxi, cola de nitrocelulosa y poliestireno.

Cola para papel: Cola de dextrina y goma de almidón.

Adhesivo de contacto: Látex de neopreno y hexano.

Cola para porcelana: Acetato de polivinilo y nitrato de celulosa.

Cola para zapatos: Hexano, gasolina y nitrato de celulosa.

Cola para cuero: Resina, tolueno, Hexano, cola de nitrocelulosa, cola de poliestireno y acetato de polivinilo.

Cola para modelos: Acetona, acetatos, tulol, alcanfor.

Cola para papel de pared: Resina, estireno-butadieno.

Nombres Comunes.

Chemo (bolsa), globo, inflado, soplado

Aerosoles:

Compuestos Activos:

Butano, Dimetil-Éter, Fluorocarbonos, Hidrocarburos, Hidrofluorocarbonados, Propano, Tricloroetano.

Productos:

Sprays de Pintura: Butano, propano, fluorocarburos, tolueno e hidrocarburos.

Sprays de cabello: Butano, propano, clorofluorocarbonos.

Sprays analgésicos: Clorofluorocarbonados.

Sprays para el asma: Clorofluorocarbonados.

Sprays para telas: Butano y tricloroetano.

Limpiadores de computadoras: Dimetil éter e hidrofluorocarbonados.

Nombres Comunes:

Aerosol, Aire, Comprimidos, Spray, Saint.

Anestésicos:

Compuestos Activos: Cloroformo, Cloruro de Etilo, Enflurano, Éter, Halotano, Óxido Nitroso.

Solventes y Gases.

Compuestos Activos:

Acetona, Acetato de Etilo, Acetato de Metilo, Bromoclorodifluoroetano, Butano, Cloruro de Metilo, Destilados del Tricloroetano, Isopropano, Tolueno.

Producto:

Removedor de barniz de uñas: Acetona y acetato de etilo.

Removedor de pinturas: Tolueno, cloruro de metilo, acetona, acetato de metilo.

Líquido Corrector: tricloroetileno y tricloroetano.

Gas líquido de encendedor: Butano e isopropano.

Extintor de fuego: Bromoclorodifluorometano.

Aguarrás

Activo: tonzol.

Agua de Celeste.

Gasolina y diesel.

Limpiadores:

Compuestos Activos:

Clorohidrocarburos, Destilados del Petróleo, Tetracloroetileno, Tricloroetileno, Tricloroetano, Xileno.

Productos:

Desmanchadores: Xileno, destilados del petróleo y clorohidrocarburos.

Lavado en seco: tetracloroetileno y tricloroetileno.

Petróleo.

Nombres Comunes:

Activo, celeste, chemo, estopa, mona, toncho, vaina, vainilla,

Alucinógenos:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Antihistamínicos:

Compuestos Activos:

Astemizol, Bromfeniramina, Clemastina, Clorferinamina, Cromoglicato, Feniramina, Loratadina, Pirlamina, Terfenadina.

Otros:

Dietilamida del ácido lisérgico, Dietilriptamina, Dimetilriptamina, Dimetoxianfetamina, Fenciclidina, Feniletilamina (mezcalina), Psilocibina, Psilocina, Bufotenina.

Nombres Comunes:

Ácidos, mezcal, hongos, zetas.

Heroína:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

3-6 Diacetylmorfina.

Nombres comunes.

Chiva, Arpón, Arponazo

Opio o Morfina y Derivados:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Morfina y Opio.

Derivados de la Morfina:

Compuestos Activos:

Alfentanil, Buprenorfina, Butorfanol, Codeína, Dextropropoxifeno, Fentanil, Hidromorfina, Meperidina, Metadona, Nalbufina, Oximorfina, Pentazocina, Propoxifen, Tramadol y Difenoxilato.

Principio Activo.

Desomorfina

Nombres comunes:

Krokodil, Cocodrilo, heroína de los pobres, heroína de los zombis.



Tranquilizantes:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Benzodiazepinas:

Compuestos Activos:

Acción Prolongada:

Clordiazepóxido, Diazepam, Flunitrazepam, Clonazepam, Pralidoxima, Clorazepato, Pralidoxima y Halazepam.

Acción Intermedia:

Oxazepam, Lorazepam, Temesepam, Alprazolam.

Acción Corta:

Midazolam, Triazolam.

Barbitúricos:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Amobarbital, Apobarbital, Fenobarbital, Secobarbital, Talbutal, Tiopental.

Otros Compuestos Activos:

Hidrato de Cloral, Etclorvinol, Etinamato, Etomidato, Glutemida, Meprobamato, Metiprilon, Paraldehido.

Gamahidroxitirato.

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo.

Gamahidroxitirato.

Nombre Común.

Éxtasis líquido, súper g, punto g, viola fácil,



Anfetaminas:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Metilfenidato, Benzedrina.

Sustancias Anoréxicas:

Compuestos Activos:

Anfepramona, Atropina, Benzetamina, Bromelina, Clobenzorex, Dextrofenfluramina, Dietilpropion, Fendimetrazina, Fenfluramina, Femproporex, Fentermina, Mazindol, Metilfenidato, norpseudoefedrina, Propilhexedrina.

Nombres Comunes:

Anfetas, anitas, fetas,

Anticolinérgicos:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Aloína, Atropina, Belladona, Boldo, Datura, Difenoxilato y Mandrágora.

Antiespasmódicos:

Compuestos Activos:

Bromuro, Butilioscina, Clidinio, Diclloverina, Etomidolina, Floroglucinol y Fenoverine, Hioscina, Metamizol, Pargeverina, Pinaverio, Pipenzolato, Prifinio, Ropifenazona, Trimebutina.

Antiparkinsonianos:

Compuestos Activos:

Biperideno, Bromocriptina, Carbidopa, Dopamina, Levodopa, Pergolida y Trihexifenidilo.

Cocaína:

Efecto.

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Clorhidrato de Cocaína, Sulfato de Cocaína.

Nombres Comunes.

Blanca nieves, Coca, Grapa, La Reyna, Nieve, Micha, Michela, Pase, Perico, Raya, Papel, Plástico.

Otros: Aticus, famous stars and straps, filinoica, chacha(r), AVC, antomina, pauder power, bang

Tabaco:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Nicotina.

Antidepresivos:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Antidepresivos tricíclicos y otras sustancias:

Compuesto Activo:

Ademetionina, Amitriptilina, Amoxapina, Citalopram, Clomipramina, Esipramina, Fluoxetina, Fluvoxamina, Hipericum, Imipramina, Litio, Maprotilina, Meclobemida, Mianserina, Nefazodona, Nortriptilina, Paroxetina, Sertralina, Sulpiride, Taneptina, Enlafxina.

Iminoestilbenos:

Compuesto Activo:

Carbamacepina.

Fenitoínas:

Compuesto Activo:

Fenitoina.

Valproíco:

Compuesto Activo:

Valproico Ácido.

Pasta Base: (Basuco)

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Benzoilmetilecgonina.

Nombres Comunes:

Basuco, Baserola, Base Libre, Bazoka, Free Base, Pasta.

Metanfetaminas (Cristales):

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Metilendioximetanfetamina (MDMA)

Nombres Comunes:

Cristal, Ectacy, Éxtasis, Ex, Metas, Meth, Tachas,

Otras presentaciones. Angelitos, Carita Feliz, Bart, Batman, Corona, Coronilla, Estrellas, Estrellitas, Simson, Versache, Maseratis, sirulax, asteroides, torofina, anaxle, felica, xt, general X, globos blancos, Bloggo, omega, grino, ruedas, teamina, Cristalín, Bordín, UnderWhigle, purific, Bang, Catalenon, Dragones etc.

Flunitracepam:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Flunitracepam.

Nombres Comunes:

Rho, Reyna, Rohypnol, Roofies, Roche II.

Crack:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Benzoilmetilecgonina.

Nombres Comunes:

Crack, Coca, Roca, Piedra.

Refractyl Ofteno:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo: Ciclopentolato

Antimuscarínico.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abstemio:

(Del lat. abstemius; de abs priv. y del lat. tenum, vino) adj. Que se abstiene del vino y en general de todo licor alcohólico. Enóforo.

Abstinencia:

(Del lat. abstinentia), f. A., Abstinenz; F. e In., Abstinente. It., abstieneza. Privación voluntaria de la satisfacción de apetitos. (Fenómenos o síntomas de). Fenómenos producidos por la cesación más o menos brusca de una sustancia de uso habitual como el alcohol, la morfina, etc.

Abuso:

Hábito desadaptativo diferente al que se produce en el caso de dependencia, se caracteriza por el uso continuo de un fármaco a pesar de que el sujeto está consciente de tener un problema causado o desencadenado por su consumo y pone en peligro su integridad psicofísica.

Abuso:

(Del lat. abusus) m. Uso exagerado de una sustancia o de un medicamento, que puede convertirse en causa nociva, como abuso de alcohol, tabaco, de los vinos espirituosos, etc.

Abuso de una Droga:

Es el consumo de una droga en forma excesiva, persistente o esporádica, incompatible o sin relación con la terapéutica médica habitual.

Acusma:

(Del gr. Akousma). F. Alucinación acústica; ruidos subjetivos. Acúfeno, fonema.

Adaptación:

(Del lat. ad. A y aptare, acomodar) F. A., Anpassung; F. e In., adaptation; It., Adattamento; P., adaptacao). Ajustamiento de un organismo al ambiente. Disminución de la frecuencia de impulsos de la actividad refleja cuando se repiten varias veces a estímulos sensoriales.

Adolescencia:

(Del lat. adolescentia), f. A., Adoleszenz; F. e In., adolescente. It., adolescenza; P., adolescencia. Época que sigue a la infancia y que se extiende desde los primeros signos de la pubertad hasta que el cuerpo ha adquirido toda su madurez física.

Adormidera:

Planta papaverácea (Papaver somniferum) cuyas cápsulas sin madurar, suministran el opio. De las semillas se obtiene un aceite fijo.

Adrenalina:

F., Adrenalín; F., adrénaline; In. Adrenalin; It. Y P., adrenalina. Principio activo de la médula de las cápsulas suprarrenales. En su forma pura es un polvo cristalino, $C_6H_3(OH)CHOHCH_3NHCH_8$, o Dioxifeniletanolametilamina. Se emplea generalmente el clorhidrato. Obra esencialmente excitando las terminaciones nerviosas del simpático en todos los órganos; inyectado en las venas aumenta la presión arterial y refuerza la acción cardíaca: dilata la pupila y los bronquios e inhibe los movimientos intestinales y las contracciones del útero. Localmente tiene acción hemostática e isquemante poderosa. Sinónimos: Adrenina, adnefrina, epinefrina, paranéfrica, supracapsulina, suprarrenina, suprarrenalita, etc.

Adrenérgico:

Adj. A., adrenergisch; F., adrénérgique; In., adrenergic; It., adrenérgico; P., adrenérgico. Activado o transmitido por la adrenalina; se aplica a las fibras nerviosas y algunas drogas de abuso de tipo excitativo.

Adicción:

Es la necesidad que desarrolla un organismo de una situación, un objeto, o de consumir una sustancia para experimentar sus efectos y de cuya presencia física depende para seguir funcionando.

Adicción a Drogas:

Estado de intoxicación periódica o crónica producido por el consumo repetido de una sustancia (natural o sintética).

Adicto:

Persona adicta, dependiente de una o más sustancias.

Alcohol:

Es un fármaco depresor, como tal inhibe y retarda las acciones del sistema nervioso central.

Alcohol etílico o etanol:

Es un depresor primario del Sistema Nervioso Central.

Alcaloide:

(De álcali) y del gr. eidos, aspecto). Sustancias orgánicas de origen vegetal, que poseen propiedades básicas y que forman ácidos sales cristalizables. Desde el punto de vista químico son derivados de la piridina, quinoleína, pirimidina, y en su mayoría, compuestos cuaternarios. El término se aplica también a las sustancias obtenidas por síntesis.

Alcoholemia:

(De alcohol y del gr. Haima, sangre) Presencia de alcohol en la sangre.

Alcohólisis:

F. lisis o desintegración del alcohol.

Alcoholización:

f: A., Alkoholisierung; F., alcoholisation. Tratamiento por la aplicación o inyección de alcohol, especialmente en las neuralgias o síndrome de supresión.

Alcoholofilia o alcoholomanía:

(De alcohol y del gr. philía amistad, o manía, locura). Apetito morboso por las bebidas alcohólicas.

Alcohólico:

Persona que sufre de alcoholismo o síndrome de dependencia del alcohol.

Alcoholismo:

Síndrome de dependencia del alcohol. Enfermedad crónica que consiste en el desorden de la conducta caracterizada por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas, hasta el punto en que se excede de lo que está socialmente aceptado y llega a interferir con la salud del bebedor, así como con sus relaciones interpersonales o con su capacidad para el trabajo.

Alucinación:

(Del lat. *alucinatio, onis*). F. A., Halluzination. Error mental en la percepción de los sentidos no fundado en una realidad objetiva, percepción imaginaria (táctil, visual, auditiva, olfatoria o gustativa) sin causa exterior. Percepción sin estímulo externo que puede ocurrir en todos los campos sensoriales: auditivo, visual, olfatorio, gustativo y táctil (ver, oír, gustar, y tocar cosas que no existen en la realidad).

Alucinógenos:

También llamados psicométicos, psicoticométicos, psicodislépticos y psicogenéticos. Son sustancias que en el cerebro del sujeto crean alucinaciones, visiones y otras imágenes que no existen en la realidad (LSD, mezcalina, marihuana).

Alucinosis:

f. A., Halluzinose, F., hallucinose, In., hallucinosis. It. Allucinosi, P., alucinose. Psicosis caracterizada por alucinaciones, delirio alucinatorio crónico, síndrome generalmente múltiple, observado sobre todo en el alcoholismo, en el que las alucinaciones se asocian con ideas de persecución. Cuadro observado tras haber tomado sustancias alucinógenas (marihuana, LSD, morfina, cocaína, etc.) o como resultado de una autointoxicación (uremia, exicosis, etc.).

Analgésico:

Droga que alivia el dolor.

Anfetamina:

Sustancia estimulante del sistema nervioso central (SNC). Las sales más comunes derivadas de esta droga son: el sulfato de anfetamina, el sulfato de dextroanfetamina y el hidrocloreuro de metanfetamina (todas son estimulantes del SNC).

Anfetaminas:

Pertenecen al grupo de los estimulantes del sistema nervioso. Por lo tanto, aceleran la actividad mental y producen estados de excitación. Además, reducen el apetito. Por ello, las anfetaminas se usan a veces como medicamentos para tratar la obesidad y algunos casos de depresión mental menor.

Amanita:

Género de hongos que comprende algunas especies muy venenosas como la Amanita Muscaria, A. Phalloides, etc.

Amanitina:

f. Nombre de algunos principios tóxicos obtenidos de hongos del género Amanita, especialmente de uno idéntico a la colina.

Amanitohemolisina:

Glúsido altamente hemolítico que se encuentra en los hongos del género Amanita.

Amanitotoxina:

F. Principio venenoso o toxina de la Amanita Phalloides, Difiere de la phallina en que es más resistente al calor y a la acción de la pepsina y de la pancreatina.

Amapola:

Planta anual de la familia de las papaveráceas (*Papaver rhoeas*) cuyos pétalos se emplean en infusión como diaforéticos y ligeramente calmantes. Es una de las cuatro flores béquicas.

Amina:

F. A., Amin. F, e In., amine. Miembro de un grupo de compuestos químicos formados del amoniaco por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por el radical NH₂. Se denominan monoamina, diaminas, triaminas, según sean uno, dos o tres átomos sustituidos.

Anestésico:

(Adj. A., Narkosemitte). Insensible al tacto o al dolor. m. Agente o sustancia que produce anestesia.

Ansia:

(Del lat. anxia. F. de anxius, angustiado). f. Congoja, aflicción.

Ansiedad:

Sensación de temor, depresión o inquietud que surge de anticipar un peligro cuyo origen se desconoce y no se comprende. La angustia se distingue del miedo porque este último sí tiene una causa conocida: se tiene miedo a los animales, a estar solo, a ciertas personas, etc.

Ansiolítico:

Psicofármaco utilizado para reducir la ansiedad.

Ansiolíticos o Timolépticos:

En el individuo normal producen mejoría en los estados depresivo-patológicos sin ser estimulantes. Eso lo hace diferente de los neurolépticos, de los sedantes y los tranquilizantes. Desarrollan más selectivamente y de manera directa, un efecto regulador sobre el humor (benzodiazepinas, meprobamatos, clordiazepóxido, metacualona).

Antidepresores:

Tienen también una función establecida en el tratamiento de los trastornos graves de ansiedad, incluso en síndrome del pánico y la agorafobia, así como la enfermedad obsesiva-compulsiva. Los primeros antidepresores que mostraron eficacia fueron imipramina, amitriptilina, sus derivados y otros compuestos semejantes. Está bien establecida su eficacia para aliviar la depresión mayor y está creciendo su apoyo en su empleo en otros trastornos psiquiátricos.

Antipsicóticos, Neurolépticos:

Tranquilizantes mayores (reserpina, fenotiazina, haloperidol) tienen las siguientes características: Crean un estado de diferencia o desinterés psicoafectivo. No poseen empleados en dosis usuales, una verdadera acción narcótica. Son eficaces en los estados de excitación, agitación psicótica y ansiedad. Reducen la impulsividad y la agresividad. Enmiendan los procesos psicotrónicos de las psicosis aguda, crónica y experimental. Producen manifestaciones de origen vegetativo y extrapiramidal. Su acción dominante sería extracortical. No producen dependencia.

Barbitúricos:

Pertenecen al grupo de medicamentos popularmente conocidos como “pastillas para dormir”. Se trata de sustancias cuya función principal es la de deprimir las funciones del sistema nervioso central. Los barbitúricos se producen en forma sintética. Los barbitúricos deprimen con carácter reversible la actividad de todos los tejidos excitables. El sistema nervioso central es particularmente sensible, e incluso cuando se administran en concentraciones anestésicas, son débiles los efectos directos sobre los tejidos periféricos excitables. Sin embargo en caso de intoxicación aguda por barbitúricos sobreviene déficit en las funciones cardiovasculares y periféricas de otras clases.

Barbiturismo:

M. A., Barbiturismus. Intoxicación aguda o crónica por los barbitúricos.

Benzodiacepinas:

Familia de psicofármacos llamados también "tranquilizantes menores", que se prescriben con frecuencia en casos de ansiedad e insomnio.

Cafeína:

Sustancia estimulante que se encuentra en el café, el té y los refrescos de cola. Es probablemente la droga más popular del mundo.

Cafeísmo:

Estado morbooso o intoxicación por abuso de café.

Canabina o cannabina:

Nombre de una resina, de un alcaloide hipnótico de un glucósido de la Cannabis Indica.

Canabinol:

Esencia, derivada de cannabis; parece ser el principio más activo del cáñamo y el componente más eficaz del hachís.

Cannabinomanía:

Canabismo, consumo habitual de cannabis.

Cannabinismo:

Estado morboso o intoxicación producida por el abuso de cannabis, marihuana o hachís.

Cannabis sativa:

Variedad de cáñamo de cuyas hojas se obtiene la marihuana. Su resina recibe el nombre de “hachís” o “hashish”.

Catecolaminas:

Nombre genérico de las aminas derivadas del catecol o 1,2 bencenodiol, las más importantes son la adrenalina y noradrenalina y su predecesor la DOPA (dehidrofenilalanina) de acción simpaticomimética.

Cocaína:

Droga estimulante que proviene de una planta cultivada en algunos países de América del Sur, principalmente en Perú y Bolivia eritropsilon coca. Esta planta requiere un clima templado y húmedo. Alcanza una altura de cerca de un metro y medio. Las hojas son lisas y de forma oval y crecen en grupos de siete en cada tallo.

Codeína:

Se obtiene en su mayor parte de la morfina. Su poder adictivo es mucho menor que el de las drogas anteriores y debe tomarse en grandes cantidades y durante mucho tiempo para causar dependencia. Puede ingerirse o inyectarse. Se presenta en forma de polvo blanco o de tabletas. Como medicamento, la codeína se emplea extensamente en forma de jarabes y tabletas para suprimir la tos. También se usa para aliviar el dolor, aunque sus efectos analgésicos son diez veces menores que los de la morfina.

Consumo de sustancias psicoactivas:

Rubro genérico que agrupa diversos patrones de uso y abuso de estas sustancias, ya sean medicamentos o tóxicos naturales, químicos o sintéticos.

Crack:

Droga estimulante derivada del clorhidrato de cocaína que habitualmente se fuma.

Craving:

Se refiere al anhelo fuerte, intenso e irreprímible (la mayor parte de las veces), de consumir psicotrópicos u otras sustancias. Esta condición exhibe la pérdida del control sobre el consumo.

Delirio:

Trastorno de las facultades mentales, con alteración de la moral o sin ella, que se manifiesta por lenguaje incoherente, excitación nerviosa e insomnio.

Delirio tóxico:

Estado de confusión agudo con alucinaciones, delirios, agitación y paranoia, provocado por la ingestión de una o más sustancias.

Delirium tremens:

Trastorno mental caracterizado principalmente por la incapacidad para percibir la realidad; confusión, alucinaciones, angustia, temblor generalizado, sudación excesiva, deshidratación y en ocasiones, convulsiones. Se presenta en los alcohólicos crónicos de uno a tres días después de que dejan de beber abruptamente.

Demencia:

Estado de alineación caracterizado por la pérdida o disminución de la mente, de ordinario en correspondencia con lesiones anatómicas de naturaleza destructiva, focales o difusas.

Dependencia cruzada:

La capacidad farmacológica de un agente o clase de sustancias para suprimir las manifestaciones del síndrome de abstinencia, de otras sustancias o clases y mantener el estado físico del dependiente.

Dependencia Física:

Es un estado de adaptación biológica que se manifiesta por trastornos fisiológicos más o menos intensos cuando se suspende bruscamente la droga.

Dependencia Psíquica:

Equivalente al término habituación. Uso compulsivo de la droga sin desarrollo de dependencia física, pero que implica también un grave peligro para el individuo.

Depresión Mental:

Trastorno caracterizado por disminución del tono afectivo, tristeza o melancolía, hipotimia.

Depresor:

Droga psicoactiva que inhibe las funciones del Sistema Nervioso Central (SNC). El grupo de sustancias depresoras incluye, entre otros, fármacos tales como el alcohol, los barbitúricos y una enorme variedad de sedantes sintéticos y somníferos.

Destoxicación o Desintoxicación:

Reducción de las propiedades tóxicas de los venenos o tóxicos.

Diagnóstico:

Parte de la medicina que tiene por objeto la identificación de una enfermedad fundándose en los síntomas de ésta.

Dosificación:

Determinación y regulación de las dosis.

Dosimetría:

Determinación exacta y sistemática de las dosis.

Dosis:

Cantidad determinada de un medicamento o agente terapéutico.

Depresores:

Disminuyen las reacciones del Sistema Nervioso Central (barbitúricos o alcohol).

Doping:

Uso o manejo de sustancias que artificialmente proveen a un individuo la mejoría e incremento de su capacidad física o psicológica a efecto de potenciar su condición atlética.

Droga ilegal o ilícita:

Es todo fármaco, adictivo o no, que puede causar daño al organismo y al psiquismo y que ha sido incluido en las listas de sustancias prohibidas que la legislación de cada país ha elaborado para los fines de proteger al individuo y a la sociedad.

Droga lícita:

Es cualquier fármaco no incluido en la lista de las sustancias que han sido declaradas ilegales por la legislación de cada país. Las más importantes son los psicofármacos medicinales sujetos a reglamentación, la nicotina contenida en el tabaco, y el etanol (alcohol etílico) de las bebidas alcohólicas.

Droga sintética:

Droga que no tiene un origen vegetal, que ha sido sintetizada en el laboratorio.

Droga:

Desde el punto de vista legal, en México son todas las sustancias que la legislación comprende bajo los términos “estupefacientes y psicotrópicos”.

Droga de impacto:

Se entiende como la droga que el paciente identifica con más capacidad de producirle efectos negativos (problemas), ya sea en el área de salud, familiar, legal o laboral, que motiva principalmente la demanda de tratamiento.

Droga de inicio:

De acuerdo con la información aportada por el propio paciente, se refiere a la primera droga consumida.

Drogadicción:

Uso compulsivo de sustancias químicas dañinas al individuo, a la comunidad o a ambos.

Drogas Parasimpaticomiméticas:

Producen efectos similares a los que crea la estimulación de los nervios parasimpáticos.

Drogas Parasimpaticolíticas:

Provocan efectos similares a los producidos por la interrupción de la transmisión en un nervio parasimpático, desarrollando una acción destructiva sobre las fibras del nervio parasimpático o bloqueando la transmisión de los impulsos de éste.

Drogas Psicoanalépticas o Psicotónicas:

Sustancias químicas (estimulantes) que se caracterizan por acelerar las reacciones del Sistema Nervioso Central (anfetaminas).

Drogas Simpaticolíticas:

Bloqueadores de la transmisión de impulsos de las fibras posganglionares a los órganos efectores o tejidos, inhibiendo la contracción del músculo liso y la secreción glandular.

Drogas Simpaticomiméticas:

Producen efectos que semejan los impulsos transmitidos por las fibras posganglionares del Sistema Nervioso Simpático.

Esquizofrenia:

Grupo de trastornos psicóticos caracterizados por desórdenes del pensamiento, del humor y la conducta. Los trastornos del pensamiento pueden llevar a la mala interpretación de la realidad, a los delirios y alucinaciones. La esquizofrenia es la más típica de las psicosis. (En lenguaje popular, “locura”).

Estimulantes:

Drogas que aceleran la actividad mental y que por lo tanto, producen estados de excitación.

Estupefaciente:

Droga psicoactiva narcótica y analgésica que provoca adicción.

Éxtasis (tacha):

Droga sintética de efecto estimulante, de estructura química similar a la anfetamina (de las llamadas drogas “de diseño”).

Farmacodependencia:

Es el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces, para evitar el malestar producido por la privación.

Fármacos o Drogas:

Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más de sus funciones.

Flashback:

Trastorno que se presenta posterior al consumo de alucinógenos y como consecuencia del mismo, pero sin requerir nueva administración.

Gamahidroxitirato:

GHB, o gamma-hidroxitirato, es un componente normal del metabolismo de los mamíferos; Se encuentran en forma natural en cada célula del cuerpo humano y es considerado como un nutriente. Es un precursor del ácido gama-hidroxitirico.

Hábito:

(Del lat. habitus). Costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de un mismo acto.

Habitación:

Adaptación gradual a un estímulo o medio. Aumento de la tolerancia a una droga desarrollada por su repetida administración.

Hashís, hashish:

Del árabe. Hasis, hierva. Preparación de hojas y sumidades de la cannabis sativa, excitante o sedante del Sistema Nervioso, según las dosis. A dosis moderadas y asociada con café o té, produce una excitación manifiesta de las funciones cerebrales, y en algunos casos genésicos. Resina de la planta de la marihuana (Cannabis sativa).

Heroína:

Es un derivado de la morfina que se produce también mediante procedimientos químicos relativamente sencillos. Sus efectos son de cuatro a diez veces más poderosos que los de la morfina. En su forma pura, es un polvo cristalino blanco tan fino que desaparece al frotarse contra la piel.

Hidrocarburos:

Se refiere a las combinaciones que resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de los hidrocarburos alifáticos o de cadenas laterales de los cíclicos, por uno o más grupos hidroxílicos. A grandes dosis es un veneno narcótico que produce intoxicación con incoordinación muscular, delirio y coma.

Hipnótico:

Droga que produce sueño.

Ice:

Droga sintética de efecto estimulante de estructura química similar a la anfetamina. (De las llamadas drogas “de diseño”).

Inhalables:

Forman un grupo especial de los depresores del Sistema Nervioso, constituidos por una serie de sustancias químicas diversas, caracterizados todos por tratarse de gases, líquidos volátiles y aerosoles, que al ser inhalados y absorbidos por vía pulmonar, producen alteraciones de la conciencia, de la percepción, cognición, volición, y debido a la intoxicación primero y después del daño cerebral, son causa de problemas conductuales. (Entre éstas se incluyen pegamentos, lacas, thinner, cementos, gasolina, acetona, etc.).

Intoxicación:

Es un estado mórbido resultante de la presencia de toxinas en el organismo.

Kirsch:

Licor alcohólico obtenido por la fermentación y destilación de las cerezas.

Krocodil:

Droga sintética de fabricación casera, extraída de la codeína, en el proceso se obtiene desomorfina. Se utiliza en forma inyectada y causa efecto depresor y endurecimiento de los tejidos con tinte verdoso.

LSD: (dietilamida del ácido lisérgico).

Droga sintética psicodisléptica o alucinógena de producción y distribución ilegal. Se deriva de un hongo llamado cornezuelo del centeno. Comúnmente se prepara como un líquido, sin color, sin olor y sin sabor, también se encuentra como polvo, en pequeñas píldoras blancas o de color, como tabletas o cápsulas.

Mal Viaje:

En el argot de los usuarios, se refiere a la mala experiencia dada por el uso de algún determinado psicotrópico.

Marihuana:

Es una droga alucinógena que se puede presentar en diversas formas, se obtiene de una planta llamada cannabis, que tiene las variedades sativa e indica, conocido también como cáñamo indio o simplemente cáñamo. Esta planta se cultiva y también crece silvestre. La altura de la planta varía entre uno y tres o más metros. Las hojas son largas, estrechas y aserradas. Adoptan la forma de abanico. Cada abanico suele tener cinco o siete hojas, pero llega a poseer desde tres hasta quince. Estas hojas son lustrosas y pegajosas y su superficie superior está cubierta por vellos cortos.

Metadona:

Droga sintética adictiva que se utiliza en el tratamiento de la adicción a la heroína.

Metanfetamina:

Droga derivada de las anfetaminas que produce efectos subjetivos semejantes a los causados por la cocaína. La metanfetamina intravenosa o fumada es causa de un síndrome de abuso y dependencia semejante a la que produce la cocaína.

Mezcalina:

Sustancia alucinógena. Es el ingrediente activo obtenido de los capullos de un cacto llamado peyote. El peyote crece principalmente en México. Los capullos pueden masticarse, o bien ser molidos en forma de polvo. Este polvo se coloca en cápsulas para ser ingerido o se usa para fabricar un líquido de color café que se bebe. Los capullos tienen un fuerte sabor amargo.

Morfina:

Prototipo de las drogas opiáceas de efecto analgésico que produce euforia con somnolencia placentera y que posee un alto potencial adictivo. Se extrae del opio mediante un sencillo procedimiento químico.

Narcóticos:

Este término se aplica a las llamadas drogas fuertes que producen un estado de euforia, tranquilidad, modorra, inconsciencia o sueño (morfina, codeína, heroína).

Neuroadaptación:

Es el proceso bioquímico que las neuronas del sistema nervioso central realizan ante la presencia frecuente de una droga psicoactiva, de tal modo que alteran su propia fisiología y por tanto su reactividad a esa sustancia. La tolerancia es la manifestación clínica de esta “adaptación” al fármaco; si el consumo continúa, es frecuente y en dosis elevadas, se presenta el otro fenómeno central de la adicción: el síndrome de abstinencia o de supresión. Tolerancia y síndrome de supresión son, así, la expresión clínica de la neuroadaptación.

Nicotina (tabaco):

Tiene importancia médica considerable por su toxicidad, su presencia en el tabaco y su capacidad para producir dependencia en quienes la consumen. La nicotina es uno de los pocos alcaloides líquidos naturales. Puede ocurrir envenenamiento con nicotina como consecuencia de ingestión accidental en aspersiones insecticidas, en las cuales se encuentra esta sustancia como agente eficaz, lo mismo que en niños que ingieren productos del tabaco.

Opiáceos:

Drogas derivadas del opio que tienen la propiedad común de suprimir el dolor, producir euforia con somnolencia placentera y causar dependencia. Son sustancias de alto potencial adictivo.

Opio:

Líquido resinoso de la cápsula de la amapola o *Papaver somniferum* (planta de opio). El opio cuyo principal ingrediente activo es la morfina, contiene sustancias psicoactivas que pueden extraerse en forma pura, como la codeína. De la morfina se sintetiza la heroína.

Patrón de consumo:

Se refiere a las características del modo o forma con que el consultante mantiene el consumo o uso de un determinado tipo de droga(s) y el orden consecutivo de las diferentes sustancias consumidas desde su inicio.

PCP (Polvo de ángel):

Fenciclidina. Sustancia sintética alucinógena originalmente utilizada como anestésico en veterinaria.

Peyote:

Cactácea originaria de determinadas áreas de México y América Central, del cual se obtiene la mezcalina.

Prevención:

Conjunto de acciones que permiten evitar y detener la historia natural de cualquier enfermedad.

Poliusuario:

Persona que consume dos o más tipos de drogas.

Psicopatológico:

Término que se aplica a las manifestaciones de los trastornos mentales.

Psicosis:

Trastorno mental en el que la capacidad individual para pensar, responder emocionalmente, recordar, comunicarse, interpretar la realidad y conducirse de manera adecuada se encuentra deteriorada. Suele cursar con delirios y alucinaciones.

Psicotrópico:

Sustancia que altera el funcionamiento mental (pensamiento, juicio, razonamiento, memoria, etc.).

Psilocibina:

Ingrediente activo de la seta *Psilocybe mexicana*. Sustancia psicodisléptica o alucinógena de efectos similares a los de la LSD.

Sedación:

Estado de disminución de las actividades funcionales, de la irritabilidad o del dolor, provocado por una sustancia sedante.

Sedante, sedativo:

Que tiene virtud de calmar o sosegar los dolores o la excitación nerviosa. Proviene del latín *sedare*, que significa calmar o “apaciguar”.

Síndrome de abstinencia:

Conjunto de trastornos físicos y psicológicos que presenta el individuo que ha desarrollado dependencia de una droga cuando suspende su consumo bruscamente o cuando lo disminuye en forma significativa.

Síndrome amotivacional:

Son signos y síntomas clínicos asociados al uso de sustancias, tales como apatía, pérdida de la efectividad, disminución para desarrollar planes a largo plazo, poca tolerancia a la frustración, se altera la capacidad de concentración y dificultad para continuar con rutinas elementales.

Tabaquismo:

Es una enfermedad ocasionada por el consumo de tabaco en donde se afectan todo el organismo, con repercusiones en el área física, mental y social.

THC (Delta-9-tetrahidrocannabinol):

Principal ingrediente activo de la cannabis sativa, a las que se atribuye la mayor parte de las acciones psicoactivas de la planta.

Tolerancia:

Adaptación del organismo a los efectos de la droga; esto implica la necesidad de aumentar la dosis para seguir obteniendo resultados de igual magnitud.

Toxicomanía:

Es una condición que se caracteriza por el envenenamiento del Sistema Nervioso Central, recurrente o continuo, que no responde a motivo médico o terapéutico alguno, sino a los que busca el propio individuo.

Tranquilizantes:

Los ansiolíticos y sedantes, en particular las benzodiazepinas se usan para el tratamiento farmacológico de los trastornos de la ansiedad.

Tratamiento:

Sistema y métodos que se emplean para curar las enfermedades o problemas.

Uso de una droga:

Es el hecho de introducir en un organismo vivo una sustancia mediante prescripción y conforme a la práctica médica.

Uso recreacional:

Consumo de sustancias usualmente referido a las de tipo ilegal bajo circunstancias sociales, a efecto de producir relajación; no necesariamente debe considerarse tal uso como sinónimo de dependencia.

Veneno o tóxico:

Toda sustancia natural o sintética (química) que al ser introducida al organismo por cualquier vía (oral, intramuscular, etc.) causa daños que pueden ser parciales o totales.

Volátil:

Característica de una sustancia que se evapora.

Lic. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y Presidente del
Consejo Estatal Contra las Adicciones.

Dr. Alfonso Petersen Farah

Secretario de Salud y Coordinador del
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

Dr. Gustavo Iglesias Robles.

Secretario Técnico del Consejo
Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

Dr. Luis Javier Robles Arellano.

Coordinador General del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco.

Dra. Gloria Gómez Sandoval.

Coordinadora de Enlace del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco.

LTS. María Patricia Carlín Sánchez.

Capturista y Diseño en Comunicación Visual del SISVEA.

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández.

Proceso de Análisis Estadístico

Edición: Junio del 2018